

Prescription and the cost of laboratory tests for patients admitted to two hospitals of Kashan University of Medical Sciences in the Covid 19 pandemic

Razieh Eghtesadi¹, Meghdad Rahati^{1*}, Esmail Fakharian¹, shima sahrae¹

1. Utilization management and cost conscious care committee(UM3C), Trauma Research Center, Kashan University of Medical Sciences and Health Services, Kashan, Iran

Received: 6 January 2022

Accepted for publication: 27 August 2022

[EPub a head of print- 5 September 2022]

Payesh: 2022; 21(4): 367-375

Abstract

Objective (s): Laboratory tests, despite their essential role in the diagnosis and management of many diseases, are often costly. Therefore, this study investigated the prescription and the cost of tests for patients admitted to two hospitals of Kashan University of Medical Sciences in the Covid 19 pandemic.

Methods: This was a cross-sectional study on a sample of patients with Covid-19 that admitted to two hospitals of Kashan University of Medical Sciences (a teaching hospital and a general hospital). We collected the data on prescription and laboratory tests and analyzed the data using the statistical tests.

Results: The results showed that 42 types of tests were prescribed in the first and third peaks of the Covid 19 pandemic in the two hospitals. Cr, BUN, K, Na tests were the most prescribed tests, and Troponin and CRP were the most expensive tests. There were no significant differences in prescribing and cost of tests in the general hospital, but in the teaching hospital there were significant differences in prescribing and cost of tests in the first and third peaks ($P= 0.003$).

Conclusion: Due to unknown nature of Covid 19 disease and the high incidence of the disease at the beginning of the pandemic, a definite decision for laboratory tests was not possible. However, the findings indicate that many of tests were requested for most patients at regular intervals, while it was more desirable that these were prescribed on a case-by-case basis.

Keywords: Laboratory tests - COVID-19 pandemic

* Corresponding author: Trauma Research Center, Kashan University of Medical Sciences and Health Services, Kashan, Iran
E-mail: mrahati90@yahoo.com

بررسی وضعیت تجویز و هزینه آزمایش های بیماران بستری در بحران کووید ۱۹؛ مقایسه دو بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

راضیه اقتصادی^۱، مقداد راحتی^{۱*}، اسماعیل فخاریان^۱، شیما صحرائی^۱

۱. کمیته مدیریت مصرف و مراقبت با هزینه کرد هوشمند، مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۰/۱۶

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۶/۵

انشر الکترونیک پیش از انتشار- ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

نشریه پایش: ۲۷۵-۲۶۷ (۴): ۲۱؛ ۱۴۰۱

چکیده

مقدمه: خدمات آزمایشگاهی علیرغم نقش اساسی که در تشخیص و مدیریت بسیاری از آسیب‌شناسی‌ها دارد، معمولاً بعنوان یکی از کانون‌های هزینه‌ی بخش سلامت مدنظر قرار می‌گیرند. لذا این مطالعه به بررسی وضعیت تجویز و هزینه آزمایشات بیماران بستری در دو بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در همه‌گیری کووید ۱۹ پرداخت.

روش کار: پژوهش حاضر کاربردی و مقطعی بود. جامعه آماری، بیماران مبتلا به کووید ۱۹ بستری در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کاشان (یک مرکز آموزشی درمانی و یک بیمارستان درمانی) در بازه زمانی اسفند ۱۳۹۸ تا اسفند ۱۳۹۹ بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی و از آزمون T زوجی انجام گرفت.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد در پیک اول و سوم کووید ۱۹ در دو بیمارستان، ۴۲ نوع آزمایش تجویز شده است. بیشترین تجویزها مربوط به آزمایشات Cr، BUN، K، Na و بیشترین هزینه‌ها مربوط به آزمایشات Troponin و CRP بوده است. در بیمارستان درمانی تفاوت معنی‌داری در تجویز و هزینه آزمایشات در پیک اول و سوم مشاهده نشد، اما در مرکز آموزشی درمانی تفاوت معنی‌داری در تجویز آزمایشات در پیک اول و سوم وجود داشت (Pvalue=۰/۰۰۳).

نتیجه‌گیری: با توجه به ناشناخته بودن بیماری کووید ۱۹ و ابتلای زیاد مردم منطقه کاشان در شروع همه‌گیری، تصمیم‌گیری قطعی در مورد لزوم انجام تست‌های آزمایشگاهی امکان‌پذیر نبود. اما یافته‌ها بر این موضوع دلالت دارد که تعدادی از آزمایشات برای اکثر بیماران در فاصله زمانی مشخص درخواست شده است، در حالی که مطلوب‌تر آن بود که تجویز این آزمایشات موردی، با توجه ویژه به شرایط بالینی بیماران و از طریق هم‌اندیشی و تشکیل کمیته علمی انجام می‌گرفت.

واژگان کلیدی: تجویز آزمایشات، هزینه آزمایشات، همه‌گیری کووید ۱۹

کد اخلاق: IR.KAUMS.MEDNT.REC.1399.137

* نویسنده پاسخگو: کاشان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، مرکز تحقیقات تروما، کمیته مدیریت مصرف و مراقبت با هزینه کرد هوشمند
E-mail: mrahati90@yahoo.com

مقدمه

با گذشت کمتر از یک دهه از آخرین شیوع سندرم تنفسی خاورمیانه در سال ۲۰۱۲، ویروس جدیدی در چین پدیدار شد که در سراسر جهان شیوع پیدا کرد. این همه‌گیری که به عنوان بیماری کرونا و ویروس جدید ۲۰۱۹ توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شد، با علائم سندرم حاد تنفسی شناخته می‌شود [۱]. بیماری‌های ناشی از ویروس‌های تنفسی سومین عامل شایع مهم مرگ و میر در جهان به شمار می‌روند و تبدیل به چالشی مهم در بهداشت جهانی شده‌اند [۲]. همه‌گیری بیماری‌ها علاوه بر فشار قابل توجهی که به سیستم مراقبت بهداشتی و درمان وارد می‌کند و منجر به مرگ و بروز ناتوانی در میلیون‌ها نفر در سراسر جهان می‌شود، می‌تواند در نظام اجتماعی و اقتصادی ایجاد اختلال نماید، به طوری که ناشناخته بودن بیماری و عوارض آن، نبود داری موثر و فقدان پروتکل جامع تشخیصی و درمانی منجر به هزینه‌های گزاف به نظام سلامت و جامعه می‌شود [۳-۲]. هزینه‌های مراقبت درمانی در همه‌گیری بیماری‌ها شامل هزینه‌های بستری، داروها، خدمات آزمایشگاهی، تصویربرداری و وسایل حفاظت فردی است [۴].

در این بین خدمات آزمایشگاهی علیرغم نقش اساسی که در تشخیص و مدیریت بسیاری از آسیب‌شناسی‌های انسانی دارد و ۶۰ تا ۷۰ درصد از اطلاعات عینی مراقبت از بیمار از نتایج تست‌های آزمایشگاهی بدست می‌آید [۷-۵] معمولاً بعنوان یکی از کانون‌های هزینه‌ی بخش سلامت مدنظر قرار می‌گیرند [۸-۹]. در این خصوص می‌توان به هزینه پاتولوژی بیماری‌ها در طب ملی انگلیس اشاره نمود که سالانه بالغ بر ۴ میلیون دلار (۴ درصد کل بودجه طب ملی انگلیس) می‌باشد [۱۱-۱۰] و یا تعداد آزمایش‌های بالینی در آمریکای شمالی ارزش ۸۶ میلیون دلاری را نشان می‌دهد [۱۳-۱۲]. مطالعات نشان می‌دهد که آزمایشات تجویزی توسط کادر درمان از سال ۱۹۷۳ چند برابر شده است [۹] که در بین آن‌ها آزمایشات غیرمقتضی وجود دارد و طیف آن بسیار متغیر است، بطوریکه در آزمایشات خون‌شناسی و بیوشیمی از ۱۱ تا ۷۰ درصد، ادرار و میکروبیولوژی از ۵ تا ۹۵ درصد، آنزیم‌های قلبی و آزمایشات تیروئیدی از ۱۷ تا ۵۵ درصد متغیر است [۱۴]. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳ تا ۵۶ درصد از آزمایشات بیش از حد تکرار می‌شوند [۱۵]. بطوریکه در بحبوحه بحران کووید-۱۹ و رکود اقتصادی پیشرو، انتظار می‌رود رشد جهانی هزینه‌های آزمایشگاهی طی پنج

سال آینده افزایش یابد [۱۶]. باید به این نکته توجه داشت که همیشه آزمایش بیشتر، بهتر نیست و تجویز بیش از حد آزمایش برای بیمار و سیستم سلامت مضر است [۱۸-۱۷]. لذا با توجه به اینکه ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بالینی و بیماران از عواقب مراقبت‌های غیرضرور، از جمله آسیب احتمالی مستقیم به بیماران و آسیب غیرمستقیم ناشی از کمبود ظرفیت مراقبت‌ها برای تشخیص و درمان به موقع آگاه هستند [۱۹] تصمیم‌گیری برای انجام آزمایش باید مبتنی بر عوامل بالینی و اپیدمیولوژیک بوده و با ارزیابی احتمال ابتلا به عفونت مرتبط باشد [۲۰].

در این راستا با توجه به افزایش خدمات غیرمقتضی در نظام سلامت و به تبع آن افزایش هزینه‌ها و از آنجا که استفاده نامناسب از مراقبت‌های سلامت یک نگرانی رو به رشد برای بیش از یک دهه بوده است و حتی جنبش بین‌المللی انتخاب خردمندانه، که اکنون ۲۰ کشور را در پنج قاره در بر می‌گیرد، شاهدهی بر این نگرانی است [۲۱] و از طرفی بعلت اینکه کادر بهداشتی و درمانی در زمان همه‌گیری‌ها مجبور به انجام کار با حجم زیاد و تحت فشار شدید هستند، تجویز زیاد آزمایشات می‌تواند منجر به بروز خطای زیاد در خدمات آزمایشگاهی شود، همانطور که اکنون در بسیاری از نقاط جهان اتفاق افتاده است [۲۲] ما در مطالعه‌ی حاضر به بررسی وضعیت تجویز و هزینه آزمایشات در دو بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در بحران کووید ۱۹ پرداختیم.

مواد و روش کار

پژوهش حاضر کاربردی - مقطعی بود که در دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. جامعه مورد مطالعه بیماران بستری مبتلا به کووید ۱۹ در دو بیمارستان عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی و بیمارستان سیدالشهدا) بود. داده‌های جمع‌آوری شده مربوط به آزمایشات تجویزی بیماران و هزینه‌های آن‌ها در پیک اول (اسفند سال ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹) و پیک سوم (سال ۱۳۹۹) همه‌گیری بود. از آنجا که این دو بیمارستان در پیک دوم همه‌گیری کووید ۱۹ در وضعیت سفید قرار داشتند و بیمار بستری نداشتند، پیک دوم در مطالعه آورده نشد. متغیرهای مورد بررسی برای گردآوری داده‌ها شامل نام آزمایش، تعداد آزمایش، تعداد بیمار، سرانه آزمایش و هزینه آزمایش بود. داده‌ها از طریق نرم‌افزار اطلاعات بیمارستانی (Hospital Information System) جمع‌آوری شد. از آماره‌های توصیفی

شامل میانگین، انحراف معیار و جداول توزیع فراوانی و از آزمون T زوجی برای بررسی معنی داری تجویز و هزینه آزمایشات در پیک اول و سوم در دو بیمارستان مورد مطالعه استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Excel و SPSSv21 استفاده شد. این پژوهش با کد اخلاق IR.KAUMS.MEDNT.REC.1399.137 از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان مورد تایید قرار گرفت. در این مطالعه موضوعات اخلاقی همچون رضایت آگاهانه از مشارکت کنندگان و محرمانه نگهداشتن اطلاعات رعایت شد.

یافته‌ها

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در مرکز آموزشی درمانی در پیک اول ۲۸۷۷ بیمار با میانگین سن ۵۷/۲۴ و میانگین مدت زمان بستری ۶/۱۱ روز پذیرش شدند و در پیک سوم تعداد مراجعین به ۵۰۱۷ نفر افزایش یافته و میانگین سن ۵۸/۵۶ و میانگین مدت زمان بستری ۵/۹ روز بوده است. در بیمارستان درمانی در پیک اول ۲۵۲ بیمار با میانگین سن ۶۴/۶۷ و میانگین مدت زمان بستری ۵/۷۵ روز پذیرش شدند و در پیک سوم تعداد مراجعین به ۷۱۳ نفر افزایش یافته و میانگین سن ۶۳/۱ و میانگین مدت زمان بستری ۵/۶ روز بوده است. مشخصات بیماران به تفکیک هر بیمارستان در جدول شماره ۱ آمده است. یافته‌ها نشان می‌دهد در پیک اول و سوم در دو بیمارستان، ۴۲ آزمایش توسط پزشکان تجویز شده که شامل موارد ذیل می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد در مرکز آموزشی درمانی در پیک اول ۳۸/۷۷ آزمایش به ازای هر بیمار و در پیک سوم ۲۳/۳ آزمایش به ازای هر بیمار تجویز شده است. در بیمارستان درمانی در پیک اول ۹/۰۷ آزمایش به ازای هر بیمار و در پیک سوم ۱۱/۴۷ آزمایش به ازای هر بیمار تجویز شده است. اطلاعات تکمیلی در مورد تعداد آزمایش، تعداد بیمار، سرانه و هزینه

آزمایش به تفکیک پیک اول و سوم در جدول شماره ۲ آمده است. در ادامه، با توجه به حجم بالای داده‌ها، اطلاعات مربوط به ۹ آزمایش پرتکرار و پرهزینه آورده شده است که به تفکیک دو بیمارستان در پیک اول و سوم در جداول شماره ۳، ۴ و ۵ آورده شده است. با توجه به یافته‌ها، بیشترین آزمایشات انجام شده در پیک اول و سوم در مجموع دو بیمارستان مربوط به آزمایشات Cr، Na، K، BUN می‌باشد. بیشترین هزینه آزمایشات در پیک اول و سوم در مجموع دو بیمارستان مربوط به آزمایشات Troponin و CRP می‌باشد. در بیمارستان درمانی در پیک سوم، بیشترین تجویز پزشکان مربوط به آزمایش C.B.C و سپس Na، K، BUN، Cr و بیشترین میزان هزینه در پیک اول و سوم مربوط به آزمایشات CRP و C.B.C می‌باشد. برای تحلیل داده‌های گردآوری شده در خصوص تجویز و هزینه آزمایشات در پیک اول و سوم در دو بیمارستان از آزمون T زوجی استفاده گردید. نتایج تحلیل در جداول شماره ۶ و ۷ و ۸ آمده است. در بیمارستان درمانی تفاوت معنی داری در تجویز آزمایشات در پیک اول و سوم مشاهده نشد (Pvalue=۰/۶۶۴) اما تفاوت معنی داری در تجویز آزمایشات در مرکز آموزشی درمانی در پیک اول و سوم وجود داشت (Pvalue=۰/۰۰۳). همچنین تفاوت معنی داری در تجویز آزمایشات در پیک اول بین مرکز آموزشی درمانی و بیمارستان درمانی وجود نداشت (Pvalue=۰/۱۳۳) و تفاوت معنی داری در تجویز آزمایشات در پیک سوم بین دو مرکز مشاهده نشد (Pvalue=۰/۴۴۵). همانطور که جدول شماره ۷ نشان می‌دهد تفاوت معنی داری در هزینه آزمایشات در پیک اول و سوم در بیمارستان درمانی وجود نداشت (Pvalue=۰/۴۸)، اما تفاوت معنی داری در هزینه آزمایشات در مرکز آموزشی درمانی در پیک اول و سوم وجود نداشت (Pvalue=۰/۲).

C.B.C	Amylase	Mg	ESRhr	PCR
ALT	Fibrinogen	Ca	CRP	گلبول قرمز متراکم
AST	Alb	BUN	Lipase	
ALP	FBS	Cr	Bili.TD	
PTT	B.S	Na	Blood Culture No1	
PT	Hb A1C	k	Blood Culture No3	
VBG	PBS	D-Dimer	Blood Culture No2	
A.B.G	F.F.P	CPK	Ferritin	
TG	LDH	TPro	IgM	
TSH	Troponin I	Phos	IgG	

جدول ۱: مشخصات بیماران بستری در پیک اول و سوم کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی کاشان

بیمارستان	پیک اول			پیک سوم		
	تعداد بیمار بستری	میانگین سن بیماران بستری (سال)	میانگین مدت زمان بستری (روز)	تعداد بیمار بستری	میانگین سن بیماران بستری (سال)	میانگین مدت زمان بستری (روز)
مرکز آموزشی درمانی	۲۸۷۷	۵۷/۲۴	۶/۱۱	۵۰۱۷	۵۸/۵۶	۵/۹
بیمارستان درمانی	۲۵۲	۶۴/۶۷	۵/۷۵	۷۱۳	۶۳/۱	۵/۶

جدول ۲: تعداد و هزینه آزمایشات در پیک اول و سوم کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی کاشان

بیمارستان	پیک اول			پیک سوم		
	تعداد آزمایش	سرنانه آزمایش	هزینه آزمایش	تعداد آزمایش	سرنانه آزمایش	هزینه آزمایش
مرکز آموزشی درمانی	۱۱۷۶۷۹	۳۰۳۵	۴۸۳۹۸۵۹۰۷۰	۳۰۶۹۵۷	۱۳۱۹۳	۱۶۸۹۸۷۳۴۷۶۵
بیمارستان درمانی	۱۰۸۳۹	۱۱۹۵	۵۵۶۸۳۵۲۳۷	۲۷۸۵۰	۲۴۲۹	۲۲۷۴۰۴۱۳۵۱
جمع کل	۱۲۸۵۱۸	۴۲۳۰	۵۰۳۹۶۶۹۴۳۰۷	۳۴۸۰۷	۵۶۲۲	۱۹۱۷۲۷۷۶۱۱۶

جدول ۳: تعداد و هزینه آزمایشات (پرتکرار و پرهزینه) در پیک اول و سوم کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی کاشان

نام آزمایش	پیک اول			پیک سوم		
	تعداد آزمایش	سرنانه آزمایش	هزینه آزمایش	تعداد آزمایش	سرنانه آزمایش	هزینه آزمایش
Troponin	۴۱۰۰	۲۱۱۵	۶۵۰۸۶۲۵۱۴	۱۰۳۶۹	۶۸۰۶	۱۲۱۰۸۰۸۲۲۸
CRP	۶۸۹۶	۳۳۷۱	۶۴۹۳۱۴۲۷۳	۱۸۲۰۷	۱۰۱۷۴	۱۴۴۹۵۱۵۰۲۲
C.B.C	۱۱۶۲۵	۳۳۷۶	۴۵۷۷۹۳۰۱۳	۲۷۳۴۱	۱۴۰۳۸	۸۵۳۰۶۸۳۴۹
k	۱۵۶۵۱	۳۲۷۹	۴۱۹۴۵۷۵۶	۳۱۰۶۰	۱۴۱۲۳	۶۶۲۰۱۴۹۴۳
Na	۱۵۳۱۰	۳۲۸۱	۴۱۰۵۰۱۱۴۵	۳۰۳۲۹	۱۳۸۶۰	۶۴۳۰۶۳۰۱۰
A.B.G	۲۳۷۶	۵۵۴	۲۶۳۹۱۴۵۰	۳۲۹۸	۱۶۳۲	۳۶۴۲۴۰۹۲۷
Cr	۱۵۵۰۹	۳۳۳۴	۳۶۱۴۰۵۷۷۴	۳۰۱۵۴	۱۴۰۱۹	۶۹۲۴۵۵۰۸۸
BUN	۱۵۴۵۷	۳۳۳۴	۲۸۷۸۷۸۹۶۳	۳۰۱۲۷	۱۴۰۱۱	۴۴۷۵۷۸۶۴۲
Mg	۶۲۲۹	۱۷۷۲	۲۶۱۸۶۸۷۶۶	۱۶۶۸۹	۸۷۶۵	۵۳۷۸۵۷۵۶۲

جدول ۴: تعداد و هزینه آزمایشات (پرتکرار و پرهزینه) در پیک اول و سوم کووید ۱۹ مرکز آموزشی درمانی

نام آزمایش	پیک اول			پیک سوم		
	تعداد آزمایش	سرنانه آزمایش	هزینه آزمایش	تعداد آزمایش	سرنانه آزمایش	هزینه آزمایش
Troponin	۴۰۴۴	۲۰۷۵	۳۷۷۱۸۹۵۸	۹۴۹۶	۶۱۲۱	۱۹۵۳۹۸۵۹۶
CRP	۴۶۱۶	۳۰۳۵	۸۸۸۱۵۴۳۸	۱۶۸۷۰	۹۳۵۲	۱۲۷۶۱۴۳۲۷۶
C.B.C	۱۰۵۳۹	۲۹۷۴	۴۰۰۵۵۸۵۷۵	۲۴۹۹۷	۱۳۰۸۲	۷۳۱۵۳۰۴۴۹
k	۱۴۴۵۶	۲۸۸۵	۷۸۹۳۸۰۳۸	۲۸۷۲۵	۱۳۱۹۳	۵۸۱۲۹۷۳۷۲
Na	۱۴۱۲۱	۲۸۸۷	۷۰۰۹۶۴۱۳	۲۸۰۸۰	۱۲۹۳۱	۵۶۶۴۱۳۲۰۵
A.B.G	۲۱۲۱	۴۸۹	۱۳۹۰۳۷۵۷	۲۹۲۳	۱۵۴۰	۲۸۹۰۸۵۵۹۸
Cr	۱۴۳۶۶	۲۹۳۹	۳۲۸۶۴۲۳۴۲	۲۷۷۲۵	۱۳۰۶۸	۶۲۱۳۸۱۵۴۲
BUN	۱۴۳۱۳	۲۹۳۹	۶۱۴۵۶۷۲۶	۲۷۷۰۰	۱۳۰۶۰	۳۹۰۴۹۶۳۷۷
Mg	۵۸۲۷	۱۶۶۱	۲۴۰۶۴۴۴۰۲	۵۷۴۸	۸۳۰۱	۴۸۹۵۸۰۸۲۰

جدول ۵: تعداد و هزینه آزمایشات (پرتکرار و پرهزینه) در پیک اول و سوم کووید ۱۹ بیمارستان درمانی

نام آزمایش	پیک اول			پیک سوم			هر	سرانه آزمایش	تعداد بیمار	تعداد آزمایش	درصد هزینه	هر	سرانه آزمایش	تعداد بیمار	تعداد آزمایش	درصد هزینه	
	تعداد آزمایش	تعداد بیمار	تعداد آزمایش	تعداد بیمار	تعداد آزمایش	تعداد بیمار											
Troponin	۵۶	۴۰	۱/۴۰	۱۳۱۴۳۵۵۶	۱۳۱۴۳۵۵۶	۱۳۱۴۳۵۵۶	۱/۴۰	۴۰	۱۳۱۴۳۵۵۶	۱۳۱۴۳۵۵۶	۱۳۱۴۳۵۵۶	۱/۴۰	۴۰	۱۳۱۴۳۵۵۶	۱۳۱۴۳۵۵۶	۱۳۱۴۳۵۵۶	۱۳۱۴۳۵۵۶
CRP	۴۸۰	۳۳۶	۱/۴۳	۶۰۴۹۸۸۳۵	۶۰۴۹۸۸۳۵	۶۰۴۹۸۸۳۵	۱/۴۳	۳۳۶	۶۰۴۹۸۸۳۵	۶۰۴۹۸۸۳۵	۶۰۴۹۸۸۳۵	۱/۴۳	۳۳۶	۶۰۴۹۸۸۳۵	۶۰۴۹۸۸۳۵	۶۰۴۹۸۸۳۵	۶۰۴۹۸۸۳۵
C.B.C	۱۰۸۶	۴۰۲	۲/۷۰	۵۷۲۳۴۴۳۸	۵۷۲۳۴۴۳۸	۵۷۲۳۴۴۳۸	۲/۷۰	۴۰۲	۵۷۲۳۴۴۳۸	۵۷۲۳۴۴۳۸	۵۷۲۳۴۴۳۸	۲/۷۰	۴۰۲	۵۷۲۳۴۴۳۸	۵۷۲۳۴۴۳۸	۵۷۲۳۴۴۳۸	۵۷۲۳۴۴۳۸
k	۱۱۹۵	۳۹۴	۳/۰۳	۴۰۶۰۷۷۱۸	۴۰۶۰۷۷۱۸	۴۰۶۰۷۷۱۸	۳/۰۳	۳۹۴	۴۰۶۰۷۷۱۸	۴۰۶۰۷۷۱۸	۴۰۶۰۷۷۱۸	۳/۰۳	۳۹۴	۴۰۶۰۷۷۱۸	۴۰۶۰۷۷۱۸	۴۰۶۰۷۷۱۸	۴۰۶۰۷۷۱۸
Na	۱۱۸۹	۳۹۴	۳/۰۲	۴۰۴۰۴۷۳۲	۴۰۴۰۴۷۳۲	۴۰۴۰۴۷۳۲	۳/۰۲	۳۹۴	۴۰۴۰۴۷۳۲	۴۰۴۰۴۷۳۲	۴۰۴۰۴۷۳۲	۳/۰۲	۳۹۴	۴۰۴۰۴۷۳۲	۴۰۴۰۴۷۳۲	۴۰۴۰۴۷۳۲	۴۰۴۰۴۷۳۲
A.B. G	۲۵۵	۶۵	۳/۹۲	۵۰۰۱۰۷۹۳	۵۰۰۱۰۷۹۳	۵۰۰۱۰۷۹۳	۳/۹۲	۶۵	۵۰۰۱۰۷۹۳	۵۰۰۱۰۷۹۳	۵۰۰۱۰۷۹۳	۳/۹۲	۶۵	۵۰۰۱۰۷۹۳	۵۰۰۱۰۷۹۳	۵۰۰۱۰۷۹۳	۵۰۰۱۰۷۹۳
Cr	۱۱۴۳	۳۹۵	۲/۸۹	۳۲۷۶۳۴۳۲	۳۲۷۶۳۴۳۲	۳۲۷۶۳۴۳۲	۲/۸۹	۳۹۵	۳۲۷۶۳۴۳۲	۳۲۷۶۳۴۳۲	۳۲۷۶۳۴۳۲	۲/۸۹	۳۹۵	۳۲۷۶۳۴۳۲	۳۲۷۶۳۴۳۲	۳۲۷۶۳۴۳۲	۳۲۷۶۳۴۳۲
BUN	۱۱۴۴	۳۹۵	۲/۹	۲۶۴۲۲۳۳۷	۲۶۴۲۲۳۳۷	۲۶۴۲۲۳۳۷	۲/۹	۳۹۵	۲۶۴۲۲۳۳۷	۲۶۴۲۲۳۳۷	۲۶۴۲۲۳۳۷	۲/۹	۳۹۵	۲۶۴۲۲۳۳۷	۲۶۴۲۲۳۳۷	۲۶۴۲۲۳۳۷	۲۶۴۲۲۳۳۷
Mg	۴۰۲	۱۱۱	۳/۶۲	۲۱۲۲۴۳۴۴	۲۱۲۲۴۳۴۴	۲۱۲۲۴۳۴۴	۳/۶۲	۱۱۱	۲۱۲۲۴۳۴۴	۲۱۲۲۴۳۴۴	۲۱۲۲۴۳۴۴	۳/۶۲	۱۱۱	۲۱۲۲۴۳۴۴	۲۱۲۲۴۳۴۴	۲۱۲۲۴۳۴۴	۲۱۲۲۴۳۴۴

جدول ۶: مقایسه آزمایشات پیک اول و سوم در هر بیمارستان

نام بیمارستان	مقایسه زوجی			معنی داری
	انحراف استاندارد	خطای میانگین	فاصله اطمینان ۹۵٪ پایین بالا	
بیمارستان درمانی (پیک اول و سوم)	۰/۸۰۰۰۵	۰/۱۲۲۴۵	-۰/۱۹۵۲۷	۰/۶۶۴
مرکز آموزشی درمانی (پیک اول و سوم)	۱/۱۰۷۲۴	۰/۱۷۰۸۵	-۰/۱۹۹۴۸	۰/۰۰۳

جدول ۷: مقایسه تجویز آزمایشات پیک اول و سوم در دو بیمارستان

نام بیمارستان	آزمون نمونه های مستقل			معنی داری
	انحراف استاندارد	خطای میانگین	فاصله اطمینان ۹۵٪ پایین بالا	
مرکز آموزشی درمانی و بیمارستان درمانی (پیک اول)	-۰/۲۸۶۹۰	۰/۳۲۲۲۴	-۱/۰۲۷۹۵	۰/۱۰۷
مرکز آموزشی درمانی و بیمارستان درمانی (پیک سوم)	۰/۱۰۳۵۷	۰/۱۷۶۶۲	-۰/۲۴۷۷۸	۰/۳۵۳

جدول ۸: مقایسه هزینه آزمایشات پیک اول و سوم در هر بیمارستان

نام بیمارستان	مقایسه زوجی			معنی داری
	انحراف استاندارد	خطای میانگین	فاصله اطمینان ۹۵٪ پایین بالا	
بیمارستان درمانی (پیک اول و سوم)	-۴۰۸۸۵۸۵۹	۱۳۵۵۹۰۶۰۹	-۸۳۱۳۸۸۶۸	۰/۴۸
مرکز آموزشی درمانی (پیک اول و سوم)	-۲۸۷۱۱۶۰۸۷	۷۶۹۸۵۴۹۳۵	-۵۲۷۰۱۹۷۷۴	۰/۲۰

بحث و نتیجه گیری

شده است، بطوریکه QT interval prolongation به عنوان عارضه داروهای هیدروکسی کلروکین و کلترامطرخ شده است. در این راستا برای مدیریت اختلالات الکترولیتی در بیماران مبتلا به کوید ۱۹، کنترل سطح خونی K در پیشگیری از بروز این عارضه مهم است و حدود ۴ میلی اکی والان در لیتر توصیه شده است [۲۴-۲۵]. در این مطالعه نیز جهت این امر، تست های Na و K به ازای هر بیمار ۴/۷ بار در پیک اول و ۲/۲ بار در پیک سوم درخواست شده است. اما باید توجه داشت که این تست ها با توجه به

ما در این مطالعه به بررسی وضعیت تجویز و هزینه آزمایشات در بحران کووید ۱۹ و مقایسه دو بیمارستان جنرال دانشگاه علوم پزشکی کاشان پرداختیم که با توجه به حجم بالای آزمایشات، در این قسمت به بررسی لزوم انجام تست های پرهزینه و پرتکرار پرداختیم. علایم گوارشی از جمله تهوع و استفراغ در بیماران مبتلا به کووید ۱۹ شیوع ۳۹/۶ درصدی دارد [۲۳]. همچنین تهوع و استفراغ از عوارض داروهای مورد استفاده در درمان کووید مطرخ

توجه به مدت زمان نسبتاً کوتاه بستری و عدم امکان تغییر قابل توجه در یافته‌های این آزمایش، سؤال این است که آیا انجام آن واقعاً ضرورت داشته و یا دارد؟ پاسخ این سؤال را می‌توان در مطالعات سایر محققین مشاهده نمود. در مطالعه میدانی و همکاران (۱۳۹۶) به ازای هر بیمار ۱/۸ آزمایش CBC درخواست شده و از این تعداد ۶/۱ درصد از این موارد غیر مقتضی تشخیص داده شده است. در مطالعه بلوم گاردن و همکاران (۲۰۱۶) از مجموع ۱۲۲ تست CBC درخواست شده در ۲۸۰ ویزیت، ۲۰ درصد موارد غیر ضروری بوده است [۲۸].

آزمایش منیزیم در راهنمای کشوری تشخیص و درمان کووید ۱۹ (نسخه هشتم) آزمایش روتین محسوب می‌شود [۲۵]. هر دو داروی کلترا و هیدروکسی کلروکین که در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ و فروردین ماه سال ۱۳۹۹ جز پروتکل درمانی بودند منجر به عارضه هایپومنیزمی شده اند و به طولانی شدن فاصله QT منجر شده اند. در دستورالعمل کشوری کووید ۱۹ حفظ سطح خونی Mg در حدود ۳ میلی اکی والان در لیتر توصیه شده است [۲۴]. در این مطالعه تست Mg به ازای هر بیمار ۳/۵۲ بار در پیک اول و ۱/۹ بار در پیک سوم درخواست شده است. این آزمایش نیز با توجه به تعداد بالای درخواست آن از آزمایشات نسبتاً پرهزینه بود (۵ درصد هزینه - ها پیک اول و ۴ درصد پیک سوم) که تجویز آن بایستی بنا به ضرورت باشد و از موارد غیر ضرور اجتناب شود. در این راستا در مطالعه میدانی و همکاران (۱۳۹۶) نیز اشاره شده که ۷۹ درصد موارد منیزیم درخواستی غیر مقتضی بوده است [۲۶].

در راهنمای کشوری تشخیص و درمان بیماری کووید ۱۹ (نسخه هشتم) آزمایش Troponin به عنوان آزمایش روتین معرفی نشده است ولی به عنوان فاکتور مشخص کننده پیش‌آگهی بیماری معرفی شده است. در این دستورالعمل احساس درد و فشار در قفسه سینه از علائم بیماری و از معیارهای ورود به فاز تنفسی محسوب شده است. پزشک جهت افزایش حساسیت تشخیص، چک شدن دو نوبت تروپونین به فاصله حداقل ۶ ساعت را دستور می‌دهد [۲۵]. در این مطالعه تست Troponin به ازای هر بیمار ۱/۹۴ بار در پیک اول و ۱/۵۲ بار در پیک سوم درخواست شده است. از آنجا که این آزمایش از پرهزینه‌ترین آزمایشات می‌باشد (۱۲ درصد هزینه‌ها پیک اول و ۹ درصد پیک سوم) تجویز آن بایستی بنا به ضرورت باشد و از موارد غیر ضرور اجتناب شود. CRP مثبت، یک یافته ارزشمند در ابتلا به این بیماری می‌باشد و توصیه شده بیماران علامت‌داری که تب و

تعداد بالای درخواست آن‌ها از آزمایشات پرهزینه می‌باشد (۱۶ درصد هزینه‌ها پیک اول و ۱۰ درصد پیک سوم) و درخواست هر روزه آن بدون در نظر گرفتن شرایط بالینی بیمار بایستی انجام گیرد تا از موارد غیر مقتضی جلوگیری شود. همانطور که در مطالعه میدانی و همکاران (۱۳۹۶) نیز اشاره شده، به ازای هر بیمار ۱/۶ مرتبه آزمایش سدیم و ۱/۷ مرتبه پتاسیم درخواست شده و ۱۲/۵ درصد سدیم و ۱۴/۱ درصد پتاسیم غیر مقتضی بوده است [۲۶]. در مطالعه لویدراکر و همکاران (۱۹۸۷) نیز از ۲۹۴ تست سدیم و پتاسیم درخواست شده، ۱۰۱ مورد سدیم و ۹۰ مورد پتاسیم به منظور غربالگری بوده، از این تعداد تنها یک مورد سدیم و دو مورد پتاسیم غیر طبیعی بوده است که این اختلال الکترولیتی تاثیری بر روند بیماری نداشته است [۲۷].

نارسایی کلیوی به عنوان عارضه‌ی بیماری کووید ۱۹ و درمان آنتی بیوتیکی این بیماری مطرح است و در صورت شک به نارسایی کلیوی انجام آزمایشات BUN و Cr الزامی است [۲۵]. همانطور که یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تست‌های BUN و Cr به ازای هر بیمار ۴/۶ بار در پیک اول و ۲/۱ بار در پیک سوم درخواست شده است. این آزمایشات نیز با توجه به تعداد بالای درخواست آن‌ها از آزمایشات پرهزینه می‌باشد (۱۲ درصد هزینه‌ها پیک اول و ۸ درصد پیک سوم)، که تجویز آن‌ها بایستی بنا به ضرورت باشد و از موارد غیر ضرور اجتناب شود. در این خصوص می‌توان به مطالعه میدانی و همکاران (۱۳۹۶) اشاره نمود که ایشان بیان کرده اند میانگین درخواست تست‌های BUN و Cr به ازای هر بیمار ۱/۷ بار بوده و ۱۴/۷ درصد موارد غیر مقتضی بوده است [۲۶]. در مطالعه لویدراکر و همکاران (۱۹۸۷) نیز نشان داده شده که از ۲۹۴ مورد تست BUN، ۱۲۱ مورد برای غربالگری و بدون یافته بالینی مرتبط انجام شده و تنها ۳ مورد غیر طبیعی بوده است [۲۷].

از آزمایشات روتین (آزمایشاتی که درخواست آن در روز اول بستری توصیه شده است و تکرار آن بر اساس نیاز فرد، صلاح دید پزشک و متناسب با بیماری زمینه‌ای مجاز است) در راهنمای کشوری تشخیص و درمان کووید ۱۹ (نسخه هشتم) می‌توان به آزمایش CBC اشاره نمود [۲۵]. همانطور که یافته‌ها نشان می‌دهد این آزمایش به ازای هر بیمار ۳/۴ بار در پیک اول و ۱/۹ بار در پیک سوم درخواست شده است. علیرغم هزینه نسبتاً کم، تعداد زیاد انجام این آزمایش، آن را به یکی از آزمایشات پرهزینه تبدیل کرده است (۸ درصد کل هزینه‌ها در پیک اول و ۶ درصد در پیک سوم). با

یک نمونه‌ای شامل ۱۵۰۰ بیمار، بهره‌برداری از خدمات آزمایشگاهی را به وسیله پزشکان مختلف که به طور همزمان یک بیمار را درمان کرده اند در طول یک دوره هشت ماهه بررسی نموده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که برای ۲۸ درصد بیماران، یک تست را بیشتر از یک پزشک دستور داده بود و ۱۴ درصد تست‌ها به فاصله ۵ روز تکرار شده است.

هیچ گونه تعارض منافی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.

سهم نویسندگان

راضیه اقتصادی: طراحی پژوهش، تحلیل داده‌ها، نگارش و اصلاح مقاله

مقداد راحتی: طراحی پژوهش، جمع آوری داده‌ها، تحلیل داده‌ها، نگارش و اصلاح مقاله

اسماعیل فخاریان: طراحی پژوهش، نگارش و اصلاح مقاله

شیما صحرایی: طراحی پژوهش، جمع آوری داده‌ها، تحلیل داده‌ها

تشکر و قدردانی

نویسندگان برخورد لازم می‌دانند که از همه مسئولین و کارکنان مرکز آموزشی درمانی بهشتی و بیمارستان سیدالشهداء که در استخراج داده‌های مالی مشارکت داشتند تشکر و قدردانی نمایند.

منابع

- Gorbalenya A, Baker S, Baric R, J. de Groot R, Drosten CH, L. Haagmans B, et al. The species severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. *Nature Microbiology* 2020; 5:536-544
- Barratt R, Shaban RZ, Gilbert GL. Clinician perceptions of respiratory infection risk; a rationale for research into mask use in routine practice. *Infection, Disease & Health* 2019; 24:169-176
- Doshmangir L, Mahbub Ahari A, Qolipour K, Azami-Aghdash S, Kalankesh L, Doshmangir P, et al. East Asia's Strategies for Effective Response to COVID-19: Lessons Learned for Iran. *Management Strategies in Health System* 2020; 4: 370-373 [In Persian]
- Choi WS, J. Cowling B, Noh J, Young Song J, Wie S-H, Lee JS. Disease burden of 2013-2014 seasonal influenza in adults in Korea. *Public Library of Science since One* 2017; 12:1-11

تنگی نفس ندارند و در آزمایشات CRP مثبت دارند پیگیری شوند [۲۴]. این آزمایش از فاکتورهای پیش بینی‌کننده‌ی پیشرفت بیماری بوده و از معیارهای ترخیص بیمار، افت ۵۰ درصد مقدار CRP نسبت به قبل می‌باشد. این آزمایش روتین محسوب می‌شود [۲۵]. در این مطالعه تست CRP به ازای هر بیمار ۲/۰۵ بار در پیک اول و ۱/۷۹ بار در پیک سوم درخواست شده است. از آنجا که این آزمایش از پرهزینه‌ترین آزمایشات می‌باشد (۱۲ درصد هزینه‌ها پیک اول و ۱۱ درصد پیک سوم) تجویز آن بایستی بنا به ضرورت باشد و از موارد غیرضرور اجتناب شود. تقریباً همه آزمایشات در مرکز آموزشی درمانی بهشتی نسبت به بیمارستان سیدالشهدا دفعات بیشتری درخواست شده است و این روند در پیک اول بحران کوید ۱۹ شدیدتر بود و سپس سیر منطقی‌تری به خود گرفت و تقریباً کاهش قابل توجهی را در تمام موارد داشت. با توجه به این که بیمارستان شهید بهشتی مرکز اصلی ارجاع بیماران کوید بود و بیمارستان آموزشی است، واکنشی هیجانی در بدو مواجهه با بیماری کوید ۱۹ داشت، اما در ادامه بحران با تشکیل کمیته علمی کوید ۱۹ در هر دو بیمارستان و هم‌اندیشی پزشکان معالج با یکدیگر و همچنین افزایش تجربه آنان، از تجویز موارد غیرضروری کاسته شد. همانطور که در مطالعه برنگر (۱۹۹۵) نیز اشاره شده است. ایشان در

- G, Plebani M. A modern and pragmatic Lippi definition of laboratory medicine. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine* 2020; 58:1171
- Lippi G, Plebani M. Laboratory abnormalities in patients with COVID-2019 infection. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine* 2020; 58:1131-1134
- Holland LL, Smith LL, Blick KE. Reducing laboratory turnaround time outliers can reduce emergency department patient length of stay: an 11-hospital study. *American Journal of Clinical Pathology* 2005; 124:672-674
- Fryer AA, Smellie WS. Managing demand for laboratory tests: a laboratory toolkit. *Journal of Clinical Pathology* 2013; 66:62-72
- Pager NM, Franzon D, Longhurst CA, Wood M, Shin AY, Adams ES, Widen E, Cornfield DN. Embedding time-limited laboratory orders within computerized provider order entry reduces laboratory utilization. *Pediatric Critical Care Medicine* 2013; 14:413-9

10. Driskell OJ, Holland D, Hanna FW, Jones PW, Pemberton RJ, Tran M, Fryer AA. Inappropriate requesting of glycated hemoglobin (Hb A1c) is widespread: assessment of prevalence, impact of national guidance, and practice-to-practice variability. *Clinical Chemistry* 2012; 58:906-15
11. Kwok J, Jones B. Unnecessary repeat requesting of tests: An audit in a government hospital immunology laboratory. *Journal of Clinical Pathology* 2005; 58:457-462
12. Naugler C and Wyonch R. What the doctor ordered: improving the use and value of laboratory testing. C.D. Howe Institute Commentary. <https://www.cdhowe.org/public-policy-research/what-doctor-ordered-improving-use-and-value-laboratory-testing>, 2021
13. US laboratory market report, Health Industry Distributors Association (HIDA), https://www.hida.org/hida/shop/Shared_Content/Shop/Departments/MarketReports.aspx, 2021
14. Plebani M. Errors in clinical laboratories or errors in laboratory medicine? *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine* 2006; 44:750-759
15. Kiechle FL, Arcenas RC, Rogers LC. Establishing benchmarks and metrics for disruptive technologies, inappropriate and obsolete tests in the clinical laboratory. *Clinica Chimica Acta* 2014; 427:131-136
16. Global Clinical Laboratory Services Industry. Global industry analysts. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/clinical-laboratory-services-market?gclid=Cj0KCQjwr4eYBhDrARIsANPywCjxpeLIqS_yFR9v1cawK21hucd_LrejBNGJuJddBDHJvn60qjXr2XEaAipAEALw_wcB, 2021
17. Sharfstein JM, Becker SJ, Mello MM. Diagnostic Testing for the Novel Coronavirus. *Journal of the American Medical Association (JAMA)* 2020; 323:1437-1438
18. Conroy M, Homsy E, Johns J, Patterson K, Singha A, Story R, Finnegan G, Shively K, Faherty K, Gephart M, Cape K, Exline MC, Ali N, Besecker B. Reducing Unnecessary Laboratory Utilization in the Medical ICU: A Fellow-Driven Quality Improvement Initiative. *Critical care explorations* 2021;3: 1-7
19. Brownlee S, Chalkidou K, Doust J, Elshaug AG, Glasziou P, Heath I, Nagpal S, Saini V, Srivastava D, Chalmers K, Korenstein D. Evidence for overuse of medical services around the world. *Lancet* 2017; 390:156-168
20. World Health Organization. Laboratory testing for coronavirus disease 2019 (COVID-19) in suspected human cases: interim guidance, 2 March 2020. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331329>, 2021
21. Tromp M, Dozzi A, Walsh K. Choosing Wisely Canada: Rural medicine list of recommendations. *Canadian Journal of Rural Medicine* 2021;26:28-30
22. Sheridan C. Coronavirus and the race to distribute reliable diagnostics. *Nature biotechnology* 2020; 38:382
23. Zhang JJ, Dong X, Cao YY, Yuan YD, Yang YB, Yan YQ, Akdis CA, Gao YD. Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China. *Allergy* 2020; 75:1730-1741
24. Comprehensive National Guide for Diagnosis and Treatment of covid-19 (First Edition). Ministry of Health and Medical Education: Tehran; <https://web.ssu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub28/09.pdf>, 2021
25. Comprehensive National Guide for Diagnosis and Treatment of covid-19 (Eighth Edition). Ministry of Health and Medical Education: Tehran; http://treatment.sbm.ac.ir/uploads/noskhe_8_.pdf, 2021
26. Meidani Z, Farzandipour M, Farrokhian A, Haghghat M. A review on laboratory tests' utilization: A trigger for cutting costs and quality improvement in health care settings. *Medical Journal of The Islamic Republic of Iran* 2016; 30:1-10
27. Rucker L, Hubbell FA, Akin BV, Frye E. Electrolyte, blood urea nitrogen and glucose level screening in medical admissions. Impact on patient management. *Western Journal of Medicine* 1987; 147:287-91
28. Bloomgarden Z, Sidel VW. Evaluation of utilization of laboratory tests in a hospital emergency room. *American Journal of Public Health* 1980; 70:525-8
29. Branger P, Van Oers R, Van der Wouden J, Van der L. Laboratory services utilization: a survey of repeat investigations in ambulatory care. *The Netherlands journal of medicine* 1995; 47: 208-13