

The role of primary health care workers in response to the COVID-19: A study based on the WHO guideline

Mandana Mehdizad¹, Tahereh Ashktorab², Farid Zayeri³, Fardin Mehrabian⁴, Ehsan Zarei¹, Abbas Daneshkohan^{1*}

1. Department of Health Management and Policy, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2. Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Tehran Islamic Azad University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3. Proteomics Research Center and Department of Biostatistics, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4. Department of Health Education and Promotion, School of Health, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

Received: 24 June 2024

Accepted for publication: 16 November 2024

[EPub a head of print-6 September 2025]

Payesh: 2025; 24(4): 547- 561

Abstract

Objective(s): The ability of health systems to respond to complex challenges such as the current pandemic depends on the capacity of healthcare workers to fulfill their roles. The objective of this study was to ascertain the role of primary health care (PHC) workers in Rasht City (north of Iran) in response to the COVID-19, based on the World Health Organization (WHO) guidance document.

Methods: The descriptive cross-sectional study was conducted with the participation of 297 PHC workers. Data were collected using a 29-item questionnaire which was developed by the research team from the guideline of the World Health Organization on health workforce policy and management in response to the COVID-19 pandemic. The validity of the questionnaire was tested and confirmed by face and content validity. Reliability was confirmed by test-retest and Cronbach's alpha coefficients. Data were analyzed using SPSS-26 software.

Results: Most PHC workers (98.6%) stated that they had taught preventive measures such as hand hygiene, respiratory etiquette and physical distancing to the clients; 92.9% had continued to provide other essential health services other than COVID-19; 46.5% of them were not provided with personal protective equipment (PPE) appropriate to their role and hazard exposure. Those who stated that have to collect and report too much data assessed their role status lower than those who said the task was appropriate.

Conclusion: To improve performance and provide more comprehensive health services, PHC workers need to be provided with the necessary supplies and equipment, especially PPE. Necessary measures should also be taken to provide training tailored to these workers needs and to determine the standard amount of data required for programs management.

Keywords: Primary Health Care, COVID-19, World Health Organization

* Corresponding author: School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
E-mail: daneshkohan@sbmu.ac.ir

نقش کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه شهرستان رشت در پاسخ به کووید-۱۹: مطالعه‌ای بر اساس سند راهنمای سازمان سلامت جهان

ماندانا مهدی‌زاد^۱، طاهره اشک‌تراب^۲، فرید زابری^۳، فردین مهربابیان^۴، احسان زارعی^۱، عباس دانش‌کهن^{۱*}

۱. گروه مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
۲. گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران
۳. مرکز تحقیقات پروتئومیکس و گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
۴. گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۴/۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۸/۲۶

انشر الکترونیک پیش از انتشار - ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

نشریه پایش: ۵۶۱-۵۴۷ (۴): ۲۴-۱۴۰۴

چکیده

مقدمه: توانایی نظام‌های سلامت برای پاسخگویی به چالش‌های پیچیده مانند همه‌گیری کووید-۱۹ به ظرفیت کارکنان سلامت برای ایفای نقش‌های خود بستگی دارد. هدف از این مطالعه تعیین نقش کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC) در شهرستان رشت (شمال ایران) در واکنش به کووید-۱۹ بر اساس سند راهنمای سازمان سلامت جهان (WHO) بود.

مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی - مقطعی با شرکت ۲۹۷ نفر از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه به صورت تمام‌شماری انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه ۲۹ گویه‌ای استخراج‌شده از سند راهنمای سازمان سلامت جهان بود که توسط تیم پژوهش تهیه شد. روایی این ابزار از طریق روایی صوری و محتوا و پایایی نیز با دو روش آزمون-بازآزمون و آلفای کرونباخ تایید شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و مدل رگرسیون خطی چندگانه در نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۶ استفاده شد.

یافته‌ها: ۹۸/۶ درصد از ارائه‌دهندگان مراقبت‌ها اعلام کردند اقدامات پیشگیرانه مانند بهداشت دست، رعایت آداب تنفسی و فاصله‌گذاری فیزیکی را به مراجعان آموزش می‌دادند. ۹۲/۹ درصد اظهار داشتند که به ارائه سایر خدمات ضروری به غیر از خدمات مربوط به کووید-۱۹ ادامه می‌دادند. ۴۶/۵ درصد گزارش دادند تجهیزات حفاظت فردی بر اساس نقش و میزان مواجهه با خطر به آن‌ها داده نمی‌شد. کارکنانی که حجم داده‌ها را آنقدر زیاد برآورد کردند که مانع از انجام وظایف اصلی‌شان و ارائه مراقبت‌های باکیفیت می‌شد، ایفای نقش خود را ضعیف‌تر از کارکنانی ارزیابی کردند که به نظرشان حجم داده‌ها متناسب بود.

نتیجه‌گیری: به‌منظور بهبود عملکرد کارکنان و ارائه خدمات جامع‌تر لازم است تا تدارکات و تجهیزات موردنیاز آن‌ها مخصوصاً تجهیزات حفاظت فردی فراهم شود. همچنین انجام اقدامات لازم در خصوص ارائه آموزش‌های متناسب با نیاز این کارکنان و تعیین حجم استاندارد از داده‌های موردنیاز برای مدیریت برنامه‌ها نیز ضروری است.

کلید واژه‌ها: مراقبت‌های بهداشتی اولیه، کووید-۱۹، سازمان سلامت جهان

کد اخلاق: IR.SBMU.SME.REC.1402.023

* نویسنده پاسخگو: تهران، بزرگراه شهید چمران، میدان شهید شهریار، بلوار دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت و ایمنی

E-mail: daneshkohan@sbmu.ac.ir

مقدمه

در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹، ۲۷ مورد پنومونی با علت ناشناخته در شهر ووهان، استان هوبی در چین شناسایی شدند که توسط سازمان سلامت جهان کووید-۱۹ نام گذاری [۱] و در ۱۱ مارس ۲۰۲۰، به عنوان یک پاندمی اعلام شد [۲،۳]. به گزارش سازمان سلامت جهان در ایران تا تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۳ (۱۰ اسفند ۱۴۰۱) موارد تاییدشده بیماری ۷،۵۶۷،۷۰۲ نفر و موارد مرگ و میر ناشی از این بیماری ۱۴۴،۸۴۲ نفر بود [۴]. از منظر نظام سلامت، کووید-۱۹ یکی از چالش برانگیزترین رویدادهای قرن بیست و یکم بوده که نیازمند تغییرات به موقع در سیاست‌ها و اقدامات بهداشتی به منظور ایجاد تعادل بین نیاز به ارائه خدمات اضافی برای مدیریت این بیماری و در عین حال حفظ و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی ضروری است [۵،۶]. کارکنان سلامت یک بخش اصلی پاسخ به این پاندمی بودند [۵]. سازمان سلامت جهان منابع انسانی سلامت را سنگ بنای نظام‌های سلامت می‌داند که نقش حیاتی در ایجاد تاب‌آوری جوامع و این نظام‌ها برای پاسخگویی به بلایای ناشی از مخاطرات طبیعی یا انسان‌ساز و همچنین مخاطرات زیست‌محیطی، فناوری و زیست‌شناختی دارد [۷]. در نتیجه کارکنان سلامت کلیدی برای ایجاد سیستم‌های بهداشتی تاب‌آور بوده و برای آمادگی در برابر کووید-۱۹ و پاسخ به آن نقش بسیار مهمی دارند [۸،۹].

از طرفی توجه به نقش مراقبت‌های بهداشتی اولیه در زمینه همه‌گیری کووید-۱۹ و اینکه چگونه توانسته به ایجاد نظام‌های سلامت تاب‌آور کمک کند، مهم است [۱۰]. مراقبت‌های بهداشتی اولیه به نظام‌های سلامت اجازه می‌دهد تا با دنیای پیچیده و به سرعت در حال تغییر سازگار شده و به آن پاسخ دهند و بر ترویج و پیشگیری، پرداختن به عوامل تعیین‌کننده سلامت و رویکرد مردم محور تأکید دارد [۱۱]. نظام‌های سلامتی که بخش اصلی آن‌ها را مراقبت‌های بهداشتی اولیه قوی تشکیل می‌دهد هزینه‌های سلامت پایین‌تری دارند، کیفیت مراقبت‌ها و وضعیت سلامت مردم بهتر، پذیرش‌های غیرضروری بیمارستانی کمتر و عدالت اجتماعی - اقتصادی در آن‌ها بیشتر است [۱۲]. آن‌ها اولین نقطه تماس بین نظام‌های سلامت با افراد و جوامع بوده و از طریق آموزش عمومی، غربالگری بیماران، تشخیص زودهنگام و پیگیری موارد بیماری، مدیریت موارد ساده‌تر و استفاده از تریاژ برای حفظ ظرفیت بیمارستان‌ها باعث ایجاد تعادل بار مراقبت‌ها در سطوح مختلف

نظام‌های سلامت شده که این امر به تاب‌آوری، تطبیق سریع و حفظ خدمات ضروری منجر می‌شود [۱۳،۱۴] و از عوارض و مرگ‌ومیر اضافی ناشی از علل غیر کووید-۱۹ جلوگیری می‌کند [۳]. مراقبت‌های بهداشتی اولیه تکیه‌گاه اصلی نظام‌های سلامت در مواجهه با موقعیت‌های اضطراری از قبیل کووید-۱۹ است. ویژگی‌هایی از قبیل شناخت منطقه تحت پوشش و دسترسی همه مردم به این مراقبت‌ها، کارکردهای متنوعی را در عرصه پاسخ به کووید-۱۹ امکان‌پذیر ساخته‌است از قبیل: ایمن‌سازی گسترده مردم، شناسایی و تریاژ موارد احتمالی بیماری، پیگیری موارد مشکوک و خفیف، کمک به افراد آسیب‌پذیر برای مدیریت اضطرابشان در مورد ویروس و کاهش تقاضا برای خدمات بیمارستانی. این مراقبت‌ها یک راهبرد اساسی هم برای کنترل این پاندمی و هم برای پیشگیری از شدت بیماری افراد مبتلا است [۱۵،۱۶]. در نتیجه کلید کنترل کووید-۱۹ در دست ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی اولیه بوده که می‌توانند از گسترش و انتقال آن جلوگیری کنند [۱۴].

در این راستا سازمان سلامت جهان در سال ۲۰۲۰ سندی با نام "سیاست‌ها و مدیریت نیروی کار سلامت در زمینه پاسخ به همه‌گیری کووید-۱۹" و با هدف ارائه دستورالعمل‌هایی برای سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیرندگان و مدیران سلامت به منظور طراحی، مدیریت و حفظ نیروی کار لازم جهت مدیریت همه‌گیری کووید-۱۹ و حفظ ارائه خدمات بهداشتی ضروری منتشر کرد. این سند مداخلات لازم را در چهار دسته مداخلات مربوط به حمایت از کارکنان سلامت در سطح فردی، مداخلات مربوط به ظرفیت‌سازی و بهینه‌سازی نقش کارکنان سلامت، مداخلات مربوط به محیط سازمانی و مداخلات مربوط به توانمندسازهای سیستمی کارکنان سلامت ارائه کرده‌است. بخش مورد استفاده در مطالعه حاضر قسمت "نقش کارکنان محلی سلامت (بهورزان) و سایر ارائه‌دهندگان جامعه‌محور مراقبت‌ها" از دسته مداخلات مربوط به ظرفیت‌سازی و بهینه‌سازی نقش کارکنان سلامت است. در این بخش نقش‌ها و وظایف بهورزان و مراقبان سلامت در ابعاد پیشگیری، تعیین موارد مشکوک، پیگیری، ردیابی و تسهیل انجام آزمایشات مربوطه، و پیگیری درمان بیماران کووید-۱۹ تعیین شده‌است [۵].

سیاست‌گذاران سلامت در سطوح ملی و استانی باید اقدامات متناسبی برای تقویت نقش کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه در

اندکی در ترجمه فارسی صورت گرفت. در مرحله بعد همانطور که در متن سند ذکر شده این راهنما باید متناسب با شرایط کشوری و محلی مورد استفاده قرار می‌گرفت، در نتیجه موارد استخراج شده در طی جلسه‌ای با شرکت مدیران، کارشناسان مجرب ستادی مراقبت‌های بهداشتی اولیه و تیم پژوهش بررسی و با شرایط سازمانی و محلی متناسب شده و به صورت ۲۹ گویه نوشته شدند.

روایی و پایایی: روایی این پرسشنامه از طریق روایی صوری و روایی محتوا (به روش کیفی) و بررسی پایایی آن نیز با روش آزمون - بازآزمون جهت سنجش تکرارپذیری و آلفای کرونباخ جهت تعیین همسانی درونی مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام روایی صوری ابزار پژوهش از نظرات ۱۰ نفر از بهورزان و مراقبان سلامت مراکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه در مورد هرگونه ابهام، دشواری در درک گویه‌ها و نامفهوم بودن آن‌ها استفاده و اصلاحات لازم انجام شد. در بررسی روایی محتوا، از ۱۰ نفر از متخصصان و صاحب‌نظران خواسته شد که گویه‌های پرسشنامه را بررسی کرده و بازخوردهای لازم را ارائه دهند و بر اساس نظرات این افراد نیز اصلاحات لازم صورت گرفت. پایایی با روش آزمون-بازآزمون، با مشارکت ۱۲ نفر از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه در دو مرحله به فاصله زمانی ۱۰ روز بر روی همان نمونه‌ها بررسی شد و ضریب پایایی درون‌گروهی (ICC) در خصوص همبستگی بین پاسخ‌های دو مرحله آزمون و بازآزمون ۰/۹۴ با $(P < 0/001)$ محاسبه و تایید شد. لازم به ذکر است که این تعداد از افراد از نمونه نهایی حذف شدند. مقدار آلفای کرونباخ نیز جهت تعیین همسانی درونی ۰/۸۹ به دست آمد و مورد تایید قرار گرفت.

در نهایت پرسشنامه‌ای با ۳ بخش و یک پرسش باز طراحی شد: بخش اول شامل ۶ پرسش در مورد اطلاعات دموگرافیک شرکت‌کنندگان یعنی جنسیت، سن، شغل، محل کار، سابقه کاری و تحصیلات بود. در بخش دوم ۲۹ گویه استخراج شده از سند راهنمای سازمان جهانی بهداشت مطرح شد. برای پاسخ به گویه‌ها ۴ گزینه در نظر گرفته شد که بر اساس ماهیت گویه‌ها برخی دارای گزینه‌های "کاملاً مخالفم، مخالفم، موافقم، کاملاً موافقم" و برخی دیگر دارای گزینه‌های "هرگز، به ندرت، معمولاً، همیشه" بودند و نمره گزینه‌ها به ترتیب از ۱ تا ۴ بود. در بخش سوم ۵ پرسش در مورد وضعیت موجود برخی از متغیرهای سازمانی مطرح شد که شامل "آیا بازدیدهای نظارتی از مرکزتان حمایتی است؟"، "به طور کل چند بار در سال از مرکز بهداشت شهرستان برای نظارت به

عرصه کووید-۱۹ انجام دهند [۱۶]. بدیهی است که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای این تقویت تعیین وضعیت موجود است. بررسی وضعیت فعلی ایفای نقش این کارکنان بر اساس الزامات سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان سلامت جهان ضمن تعیین شکاف‌های موجود، فرصت منحصر بفردی برای برنامه‌ریزی در جهت عملکرد اثربخش آن‌ها در مواجهه با کووید-۱۹ و سایر پاندمی‌های مشابه در آینده فراهم می‌سازد. بر اساس جستجوی تیم پژوهش مطالعه مشابهی که الزامات سازمان جهانی بهداشت را در خصوص نقش کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه در مواجهه با کووید-۱۹ بررسی کرده باشد، یافت نشد. این مطالعه با هدف تعیین نقش کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه شهرستان رشت در پاسخ به کووید-۱۹ بر اساس راهنمای سازمان سلامت جهان انجام شد.

مواد و روش کار

طرح، جامعه و محیط پژوهش: این مطالعه توصیفی - مقطعی در بازه زمانی اول شهریور تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ انجام شد. جامعه پژوهش شامل ۲۱۸ بهورز و ۱۳۶ مراقب سلامت (در مجموع ۳۵۴ نفر) از خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شهرستان رشت بودند که به صورت تمام‌شماری وارد مطالعه شدند.

ابزار مورد استفاده: ابزار گردآوری داده‌های این مطالعه یک پرسشنامه بود که توسط تیم پژوهش از سند راهنمای سازمان سلامت جهان با نام "سیاست‌ها و مدیریت نیروی کار سلامت در زمینه پاسخ به همه‌گیری کووید-۱۹" اقتباس و طراحی شد. در این سند دستورالعمل‌هایی برای سیاستگذاران و مدیران سلامت به صورت چهار دسته از مداخلات جهت مدیریت و حفظ نیروی کار به‌منظور مدیریت همه‌گیری کووید-۱۹ و حفظ ارائه خدمات بهداشتی ضروری ارائه شده است [۵]. برای تهیه این پرسشنامه ابتدا قسمت "نقش کارکنان محلی سلامت (بهورزان) و سایر ارائه‌دهندگان جامعه‌محور مراقبت‌ها" از دسته مداخلات مربوط به ظرفیت‌سازی و بهینه‌سازی نقش کارکنان سلامت با دقت مطالعه و الزامات مطرح شده شناسایی و استخراج شدند. متن حاصل توسط یکی از پژوهشگران که در زمینه ترجمه متون انگلیسی به فارسی تجربه و سابقه تدریس در این زمینه را داشت، به فارسی ترجمه شد. سپس توسط یک مترجم دو زبانه به انگلیسی بازترجمه شد. دو نسخه اصلی و بازترجمه شده برای بررسی همسانی در معنی و برطرف کردن ناهمخوانی‌ها مورد بررسی قرار گرفتند و اصلاحات

جمعیت‌شناختی شرکت‌کنندگان در جدول شماره ۱ نشان داده شده‌است. فقط ۱۷ درصد (۵۱ نفر) از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه اعلام کردند که بازدیدهای نظارتی، حمایتی بود. ۳۴ درصد (۱۰۲ نفر) اعلام کردند که در ازای داده‌هایی که به سطوح بالاتر ارسال می‌کردند بازخوردی دریافت نمی‌کردند که به بهبود عملکردشان کمک کند. ۷۱/۳۸ درصد (۲۱۲ نفر) بیان کردند حجم داده‌هایی که جمع‌آوری و گزارش می‌کردند آنقدر زیاد بود که مانع از انجام وظایف اصلی‌شان و ارائه مراقبت‌های باکیفیت می‌شد. ۲۶ درصد (۷۶ نفر) از آن‌ها نیز اعلام کردند که دوره‌های آموزشی که برایشان برگزار می‌شد تأثیر و کاربرد کمی در بهبود انجام وظایف شغلی‌شان داشته‌است (جدول ۲).

یافته‌ها در جدول ۲ نشان داد که ۹۸/۶ درصد از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه اعلام کردند که اقدامات پیشگیرانه از جمله بهداشت دست، رعایت آداب تنفسی (پوشاندن دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه) و فاصله‌گذاری فیزیکی را معمولاً یا همیشه به مراجعان آموزش می‌دادند. ۹۵/۲ درصد اعلام کردند که معمولاً یا همیشه وضعیت سلامت بیماران را بعد از دریافت خدمات پیگیری می‌کردند. ۹۲/۹ درصد اظهار داشتند که معمولاً یا همیشه به ارائه سایر خدمات ضروری (به غیر از کووید-۱۹) ادامه می‌دادند. ۹۱/۲ درصد بیان کردند که افراد دارای تماس نزدیک با بیماران را ردیابی می‌کردند. ۸۶/۵ درصد گزارش دادند که از فناوری‌های تلفن همراه برای آموزش به مردم در مورد علائم، نشانه‌ها و روش‌های انتقال بیماری استفاده می‌کردند. ۸۲/۸ درصد نیز اعلام کردند که برای اصلاح باورهای غلط مردم و مبارزه با بدنام‌سازی و شرمساری خانواده‌های مبتلا به کووید-۱۹ (رفتار نادرست با خانواده‌های مبتلا) اقداماتی انجام می‌دادند. ۴۶/۵ درصد نیز بیان داشتند که تجهیزات حفاظت فردی بر اساس نقش و میزان مواجهه با خطر به آن‌ها داده نمی‌شد. بیشتر ارائه‌دهندگان مراقبت‌ها از مهم‌ترین دلایل کاربردی و مؤثر نبودن دوره‌های آموزشی در بهبود عملکردشان به وجود مشکلاتی در مطالب آموزشی مانند به‌موقع و به‌روز نبودن مطالب، عدم تناسب دوره‌ها با نیازها، کاربردی نبودن مطالب، فضای فیزیکی غیراستاندارد، کمبود نیروی آموزشی و نبود تجهیزات و امکانات آموزشی به‌خصوص برای آموزش برخط اشاره کردند.

به‌منظور بررسی اثر متغیرهای سازمانی با تعدیل اثر متغیرهای دموگرافیک از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد با تعدیل اثر متغیرهای دموگرافیک، حجم داده‌های

مرکز یا خانه بهداشت شما مراجعه می‌کنند؟"، "آیا در مورد داده‌هایی که به سطوح بالاتر ارسال می‌کنید، بازخوردی دریافت می‌کنید که به بهبود عملکردتان کمک کند؟"، "نظرتان در مورد حجم داده‌هایی که جمع‌آوری و گزارش می‌کنید، چیست؟" و "دوره‌های آموزشی که تا کنون برایتان برگزار شده تا چه حد کاربردی و در بهبود عملکردتان مؤثر بوده است؟" بود. به‌علاوه ۱ پرسش باز یعنی "مهم‌ترین دلایل کاربردی و مؤثر نبودن دوره‌های آموزشی که تا کنون برایتان برگزار شده در بهبود انجام وظایف شغلی‌تان را بنویسید." نیز در انتهای این پرسشنامه مطرح شد.

جمع‌آوری داده‌ها: برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ها توسط پژوهشگر در مراکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه توزیع و در حضور وی تکمیل شدند، تا در صورت وجود هر گونه ابهام در مورد گویه‌ها، پاسخ و توضیحات لازم توسط پژوهشگر به مشارکت‌کنندگان داده شود. از بین ۳۴۲ پرسشنامه توزیع‌شده در این مراکز ۲۹۷ پرسشنامه تکمیل شده جمع‌آوری شد که نرخ پاسخگویی حدود ۸۶ درصد بود.

تحلیل داده‌ها: تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۶ انجام شد. برای گزارش آمار توصیفی متغیرهای کمی از میانگین و انحراف معیار و برای متغیرهای کیفی از معیارهای فراوانی و درصد استفاده شد. به‌منظور بررسی اثر متغیرهای سازمانی با تعدیل اثر متغیرهای دموگرافیک از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: اهداف پژوهش به‌طور کامل در ابتدای پرسشنامه ذکر شده و همچنین به‌طور واضح به شرکت‌کنندگان در پژوهش توضیح داده شدند. پاسخ‌دهندگان به‌طور آگاهانه رضایت‌نامه کتبی را جهت تکمیل پرسشنامه امضا کردند و محرمانگی در خصوص اطلاعات شخصی آن‌ها نیز رعایت شد. همچنین نتایج پژوهش در اختیار سازمان‌ها و مراکز مربوطه قرار گرفت. مجوز انجام این پژوهش توسط کمیته اخلاق دانشکده آموزش پزشکی و فناوری‌های یادگیری با کد اخلاق IR.SBMU.SME.REC.1402.023 صادر شد.

یافته‌ها

بیشتر شرکت‌کنندگان در این مطالعه زن (۷۰/۷ درصد)، به‌روز (۵۸/۹ درصد)، از خانه‌های بهداشت (۵۸/۲ درصد) با سابقه کاری بیشتر از ۲۰ سال و دارای مدرک کارشناسی (۴۳/۴ درصد) بودند. میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کاری شرکت‌کنندگان به ترتیب 40.72 ± 7.98 و 16.32 ± 8.42 بود. ویژگی‌های

با کیفیت می‌شود، وضعیت ایفای نقش خود را ضعیف‌تر ارزیابی کردند. علاوه بر این کارکنانی که کاربرد و تأثیر دوره‌های آموزشی که برایشان برگزار می‌شد را در بهبود انجام وظایف شغلی‌شان زیاد ارزیابی کردند، نیز وضعیت ایفای نقش خود را بهتر ارزیابی کردند (جدول ۳).

جمع‌آوری و گزارش‌شده ($\beta = -0/096, P = 0/024$) و کاربرد دوره‌های آموزشی در بهبود عملکرد ($\beta = 0/288, P < 0/001$) تأثیر معنادار در ایفای نقش کارکنان داشتند. کارکنانی که بر این باور بودند که حجم داده‌هایی که جمع‌آوری و گزارش می‌کنند آن‌قدر زیاد است که مانع از انجام وظایف اصلی‌شان و ارائه مراقبت‌های

جدول ۱. توزیع فراوانی واحدهای پژوهش بر حسب متغیرهای جمعیت‌شناختی

متغیرهای دموگرافیک	رده	فراوانی	درصد
جنسیت	مرد	۸۷	۲۹/۲۹
	زن	۲۱۰	۷۰/۷۱
گروه سنی	کمتر از ۳۸ سال	۱۱۲	۳۷/۷۱
	۳۸ تا ۴۷ سال	۱۱۴	۳۸/۳۹
	بیشتر از ۴۷ سال	۷۱	۲۳/۹۰
شغل	بهبور	۱۷۵	۵۸/۹۲
	مراقب سلامت	۱۲۲	۴۱/۰۸
محل کار	خانه بهداشت	۱۷۳	۵۸/۲۵
	مرکز بهداشت روستایی	۱۰	۳/۳۷
	پایگاه سلامت	۴۲	۱۴/۱۴
	مرکز بهداشت شهری - روستایی	۴۱	۱۳/۸۰
سابقه کاری	مرکز بهداشت شهری	۳۱	۱۰/۴۴
	کمتر از ۱۰ سال	۸۷	۲۹/۲۹
	۱۰ تا ۲۰ سال	۱۰۴	۳۵/۰۲
تحصیلات	بیشتر از ۲۰ سال	۱۰۶	۳۵/۶۹
	دیپلم و کمتر از آن	۱۱۲	۳۷/۷۱
	کاردانی	۴۴	۱۴/۸۲
	کارشناسی	۱۲۹	۴۳/۴۳
	کارشناسی ارشد	۱۲	۴/۰۴

جدول ۲. توزیع فراوانی پاسخ‌های کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه به پرسشنامه

دسته	گویه	پاسخ	فراوانی	درصد
متغیرهای سازمانی	آیا بازدیدهای نظارتی حمایتی است؟	خیر	۱۰۱	۳۴/۰۰
		تا حدی	۱۴۵	۴۸/۸۳
	تعداد بازدیدهای نظارتی از مراکز در سال	بلی	۵۱	۱۷/۱۷
		کمتر از ۳ بازدید	۱۰۶	۳۵/۶۹
		۳ تا ۴ بازدید	۹۴	۳۱/۶۴
متغیرهای سازمانی	دریافت بازخورد مؤثر در بهبود عملکرد در مورد داده‌های ارسال شده به سطوح بالاتر	بیشتر از ۴ بازدید	۹۷	۳۲/۶۷
		خیر	۱۰۲	۳۴/۳۴
	حجم داده‌های جمع‌آوری و گزارش‌شده توسط کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه	بلی	۱۹۵	۶۵/۶۶
		زیاد است	۲۱۲	۷۱/۳۸
گویه‌های اصلی	کاربرد دوره‌های آموزشی در بهبود عملکرد کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه	متناسب است	۸۵	۲۸/۶۲
		کم	۷۶	۲۵/۵۹
	راهنماهای پیشگیری و کنترل عفونت در جامعه عملی و قابل اجرا بودند.	زیاد	۲۲۱	۷۴/۴۱
		کاملاً مخالفم	۶	۲/۰۲
گویه‌های اصلی	شرح وظایف شما در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان بیماران مبتلا به کووید-۱۹ و نیز تداوم دیگر مراقبت‌های اساسی سلامت تعیین شده‌بود.	مخالفم	۷۱	۲۳/۹۱
		موافقم	۲۰۸	۷۰/۰۳
	تجهیزات حفاظت فردی بر اساس نقش و میزان مواجهه با خطر به شما داده می‌شد.	کاملاً موافقم	۱۲	۴/۰۴
		کاملاً مخالفم	۵	۱/۶۹
		مخالفم	۶۹	۲۳/۲۳
		موافقم	۲۰۲	۶۸/۰۱
		کاملاً موافقم	۲۱	۷/۰۷
		کاملاً مخالفم	۳۶	۱۲/۱۲

۳۴/۳۴	۱۰۲	مخالفم	
۴۷/۴۸	۱۴۱	موافقم	
۶/۰۶	۱۸	کاملاً موافقم	
۷/۰۷	۲۱	کاملاً مخالفم	
۲۵/۵۹	۷۶	مخالفم	نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به شما آموزش داده شد.
۶۰/۲۷	۱۷۹	موافقم	
۷/۰۷	۲۱	کاملاً موافقم	
۱۳/۸۱	۴۱	کاملاً مخالفم	
۲۵/۲۵	۷۵	مخالفم	به منظور افزایش تمایلات به استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به شما مطالبی آموزش داده شد.
۵۴/۵۵	۱۶۲	موافقم	
۶/۳۹	۱۹	کاملاً موافقم	
۱/۰۱	۳	کاملاً مخالفم	
۸/۷۵	۲۶	مخالفم	
۶۸/۶۹	۲۰۴	موافقم	اعتماد مردم به نظام سلامت را تقویت می کردید.
۲۱/۵۵	۶۴	کاملاً موافقم	
۰/۳۴	۱	کاملاً مخالفم	
۷/۴۱	۲۲	مخالفم	
۷۲/۰۵	۲۱۴	موافقم	از مشارکت مردم در شناسایی، گزارش دهی و پایش موارد بیماری حمایت می کردید.
۲۰/۲۰	۶۰	کاملاً موافقم	
۰/۳۴	۱	کاملاً مخالفم	
۹/۴۳	۲۸	مخالفم	
۷۱/۳۸	۲۱۲	موافقم	از مشارکت جامعه در جمع آوری داده ها و اطلاعات حمایت می کردید.
۱۸/۸۵	۵۶	کاملاً موافقم	
۱/۳۴	۴	کاملاً مخالفم	
۱۷/۵۱	۵۲	مخالفم	از اولویت بندی بیماران و افراد در معرض خطر (تریاز) در سطح جامعه طبق پروتکل های ملی حمایت می کردید.
۶۷/۶۸	۲۰۱	موافقم	
۱۳/۴۷	۴۰	کاملاً موافقم	
۲/۰۲	۶	هرگز	
۱۳/۸۰	۴۱	به ندرت	
۵۴/۲۱	۱۶۱	معمولاً	از داده هایی که جمع آوری می کردید برای بهبود عملکرد خود استفاده می کردید.
۲۹/۹۷	۸۹	همیشه	
۰/۰۰	۰	هرگز	
۱/۳۴	۴	به ندرت	اقدامات پیشگیرانه از جمله بهداشت دست، رعایت آداب تنفسی (پوشاندن دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه) و فاصله گذاری فیزیکی را به مراجعان آموزش می دادید.
۲۴/۲۴	۷۲	معمولاً	
۷۴/۴۲	۲۲۱	همیشه	
۰/۳۴	۱	هرگز	
۲/۳۶	۷	به ندرت	اقدامات مرتبط با پیشگیری و کنترل عفونت مانند نحوه استفاده از ایستگاه های بهداشتی (مثلاً دستگاه های ضد عفونی دست) را به مراجعان آموزش می دادید.
۲۷/۲۷	۸۱	معمولاً	
۷۰/۰۳	۲۰۸	همیشه	
۰/۳۴	۱	هرگز	
۸/۰۸	۳۴	به ندرت	از راهبردهای تغییر رفتار (دادن بازخورد، پایش، ارائه تجربه، حمایت اجتماعی و...) برای بیشتر شدن تأثیر آموزش به مردم (در مورد علائم، نشانه ها و روش های انتقال بیماری) استفاده می کردید.
۳۹/۳۹	۱۱۷	معمولاً	
۵۲/۱۹	۱۵۵	همیشه	
۴/۷۱	۱۴	هرگز	
۲۳/۲۳	۶۹	به ندرت	از مشارکت جامعه (مثلاً شوراهای کمیته های محلی) برای اطلاع رسانی و پیشگیری و کنترل بیماری کووید-۱۹ استفاده می کردید.
۴۵/۵۶	۱۳۵	معمولاً	
۲۶/۶۰	۷۹	همیشه	
۱/۳۴	۴	هرگز	
۱۵/۸۳	۴۷	به ندرت	برای اصلاح باورهای غلط مردم و مبارزه با بدنام سازی و شرمساری خانواده های مبتلا به کووید-۱۹ (رفتار نادرست با خانواده های مبتلا) اقدامی انجام می دادید.
۴۴/۷۸	۱۳۳	معمولاً	
۳۸/۰۵	۱۱۳	همیشه	
۱/۳۴	۴	هرگز	
۱۲/۱۲	۳۶	به ندرت	از فناوری های تلفن همراه برای آموزش به مردم در مورد علائم، نشانه ها و روش های انتقال بیماری استفاده می کردید.
۳۹/۰۶	۱۱۶	معمولاً	

۴۷/۴۸	۱۴۱	همیشه	
۰/۳۴	۱	هرگز	
۱/۳۴	۴	به ندرت	
۲۵/۹۳	۷۷	معمولاً	به جامعه در مورد بیماری کووید-۱۹ آگاهی می دادید.
۷۲/۳۹	۲۱۵	همیشه	
۱/۳۴	۴	هرگز	گویه‌های اصلی
۷/۴۱	۲۲	به ندرت	افراد دارای تماس نزدیک با بیماران را ردیابی می کردید. (برای شناسایی و قرنطینه آن‌ها به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری)
۳۵/۶۹	۱۰۶	معمولاً	
۵۵/۵۶	۱۶۵	همیشه	
۱/۰۱	۳	هرگز	
۴/۷۱	۱۴	به ندرت	آزمایش‌های تشخیص سریع کووید-۱۹ را انجام می دادید (مردم را جهت آزمایشات تشخیص سریع کووید-۱۹ به آزمایشگاه راهنمایی می کردید).
۳۴/۶۸	۱۰۳	معمولاً	
۵۹/۶۰	۱۷۷	همیشه	
۱۳/۱۳	۳۹	هرگز	
۱۳/۸۱	۴۱	به ندرت	جهت جمع‌آوری ایمن نمونه‌ها و انتقال سریع آن‌ها به آزمایشگاه کمک می کردید.
۳۳/۶۷	۱۰۰	معمولاً	
۳۹/۳۹	۱۱۷	همیشه	
۰/۶۷	۲	هرگز	
۴/۰۴	۱۲	به ندرت	در مورد نحوه دسترسی آسان به آزمایش کرونا به مردم اطلاع‌رسانی می کردید.
۳۴/۰۱	۱۰۱	معمولاً	
۶۱/۲۸	۱۸۲	همیشه	
۱/۶۹	۵	هرگز	
۷/۰۷	۲۱	به ندرت	وضعیت بیماران را پایش می کردید تا در صورت نیاز به بستری شدن به ارجاع سریع آن‌ها کمک کنید.
۳۷/۳۷	۱۱۱	معمولاً	
۵۳/۸۷	۱۶۰	همیشه	
۱/۳۴	۴	هرگز	
۴/۷۱	۱۴	به ندرت	در مورد راه‌های تحویل نتایج آزمایش کرونا به مردم اطلاع‌رسانی می کردید.
۳۶/۷۰	۱۰۹	معمولاً	
۵۷/۲۵	۱۷۰	همیشه	
۱/۰۱	۳	هرگز	
۶/۴۰	۱۹	به ندرت	به بیماران در مورد رژیم غذایی آموزش می دادید.
۳۰/۶۴	۹۱	معمولاً	
۶۱/۹۵	۱۸۴	همیشه	
۰/۶۷	۲	هرگز	
۴/۰۴	۱۲	به ندرت	وضعیت سلامت بیماران را بعد از دریافت خدمات پیگیری می کردید.
۳۲/۳۲	۹۶	معمولاً	
۶۲/۹۷	۱۸۷	همیشه	
۹/۷۶	۲۹	هرگز	
۱۴/۸۲	۴۴	به ندرت	برای درمان بیماران مراقبت‌های سیار ارائه می دادید.
۳۵/۳۵	۱۰۵	معمولاً	
۴۰/۰۷	۱۱۹	همیشه	
۱۰/۱۰	۳۰	هرگز	گویه‌های اصلی
۱۷/۱۷	۵۱	به ندرت	با ارائه خدمات مراقبت در منزل به بیماران کمک می کردید.
۳۶/۰۳	۱۰۷	معمولاً	
۳۶/۷۰	۱۰۹	همیشه	
۱۰/۱۰	۳۰	هرگز	
۱۹/۱۹	۵۷	به ندرت	با بازدیدهای معمول از خانه‌ها به بیماران کمک می کردید.
۳۴/۶۸	۱۰۳	معمولاً	
۳۶/۰۳	۱۰۷	همیشه	
۱/۳۴	۴	هرگز	
۵/۷۲	۱۷	به ندرت	ارائه سایر خدمات بهداشتی ضروری (به‌غیر از خدمات مربوط به کرونا) را ادامه می دادید.
۳۵/۳۵	۱۰۵	معمولاً	
۵۷/۵۹	۱۷۱	همیشه	

جدول ۳: نتایج مدل رگرسیون خطی چندگانه برای بررسی اثر متغیرهای سازمانی با تعدیل اثر متغیرهای دموگرافیک

متغیر	رده	ضریب β	خطای معیار	p-Value
جنسیت	زن	-۰/۰۳۷	۰/۰۴۸	۰/۴۴۷
	مرد	رده مرجع		
شغل	مراقب سلامت	- ۰/۴۶۴	۰/۲۵۹	۰/۰۷۴
	بهبود	رده مرجع		
محل کار	مرکز بهداشت روستایی	۰/۲۴۴	۰/۲۹۹	۰/۲۸۷
	پایگاه سلامت	۰/۳۱۵	۰/۲۶۱	۰/۲۲۹
	مرکز بهداشت شهری-روستایی	۰/۲۰۷	۰/۲۶۲	۰/۴۳۰
	مرکز بهداشت شهری	۰/۳۱۰	۰/۲۶۴	۰/۲۴۱
تحصیلات	خانه بهداشت	رده مرجع		
	دانشگاهی	۰/۰۰۶	۰/۰۵۴	۰/۹۱۴
	غیردانشگاهی	رده مرجع		
	بلی	۰/۰۹۷	۰/۰۵۹	۰/۱۰۲
بازدیدهای نظارتی حمایتی است؟	تا حدی	۰/۰۲۵	۰/۰۴۴	۰/۵۷۲
	خیر	رده مرجع		
دریافت بازخورد مؤثر در بهبود عملکرد در مورد داده‌های ارسال شده به سطوح بالاتر نظام سلامت	بلی	۰/۰۷۸	۰/۰۴۴	۰/۰۷۴
	خیر	رده مرجع		
حجم داده‌های جمع‌آوری و گزارش شده	زیاد است	-۰/۰۹۶	۰/۰۴۲	۰/۰۲۴
	متناسب است	رده مرجع		
کاربرد دوره‌های آموزشی در بهبود عملکرد	زیاد است	۰/۲۸۸	۰/۰۴۵	<۰/۰۰۱
	کم است	رده مرجع		
سن	-	<۰/۰۰۱	۰/۰۰۶	۰/۹۷۸
سابقه کاری	-	۰/۰۰۱	۰/۰۰۵	۰/۹۰۲
تعداد بازدیدهای نظارتی	-	-۰/۰۰۵	۰/۰۰۷	۰/۴۹۸

بحث و نتیجه گیری

هند نیز نشان داد که در دوران کووید-۱۹ کاهش قابل توجهی در ارائه خدمات معمول اما ضروری بهداشتی رخ داد [۱۸]. نظام‌های سلامت در سراسر جهان با افزایش تقاضا برای مراقبت از افراد مبتلا به کووید-۱۹ به چالش کشیده شدند [۱۹]. به دلیل محدودیت فضای تخت، کارکنان، تدارکات و تجهیزات، آن‌ها مجبور شدند تا رویه‌ها، غربالگری‌ها و سایر خدمات پیشگیرانه را تعلیق کنند، در نتیجه با چالش‌هایی در ارائه خدمات غیر کووید-۱۹ در طول همه‌گیری مواجه شدند. این تأخیرها و موانع منجر به افزایش مرگ‌ومیر بیش از حد در طول همه‌گیری شد، که احتمالاً بسیاری از آن‌ها تحت شرایط معمول قابل پیشگیری بودند [۲۰]. در نتیجه در طول یک همه‌گیری، ارائه خدمات بهداشتی ضروری و جامع برای جلوگیری از افزایش مرگ و میر ناشی از علل نامرتبط به بیماری همه‌گیر مهم است [۲۱]. در مطالعه حاضر فعالیت‌هایی از قبیل ایجاد آگاهی در جامعه در مورد بیماری کووید-۱۹، آموزش اقدامات پیشگیرانه به مراجعان، کمک به انجام آزمایشات سریع کووید-۱۹، ردیابی تماس، ارجاع و کمک به اصلاح باورهای غلط مردم و مبارزه با بدنام‌سازی و شرمساری خانواده‌های مبتلا از

یافته‌های حاصل از پاسخ‌های بیش از ۹۰ درصد از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه در مطالعه حاضر نشان داد که آن‌ها به ارائه سایر خدمات ضروری به غیر از خدمات مربوط به کووید-۱۹ معمولاً یا همیشه ادامه می‌دادند. درحالی‌که ارائه‌دهندگان مراقبت‌ها ارائه سایر خدمات ضروری به غیر از خدمات مربوط به کووید-۱۹ را ادامه می‌دادند، اما به نظر می‌رسد مراجعات مردم برای دریافت این خدمات کاهش یافته بود. مطالعه رضایر و همکاران نشان داد که همه‌گیری کووید-۱۹ بر عملکرد مراقبت‌های بهداشتی اولیه در ایران تأثیر گذاشته، تعداد خدمات ضروری ارائه‌شده در این دوران کاهش یافته و ارائه‌دهندگان مراقبت‌ها بیشتر وقت خود را صرف ارائه خدمات مربوط به بیماران کووید-۱۹ کردند [۱۶]. مطالعه پیترز و همکاران در ۸ کشور با درآمد کم و متوسط نشان داد که کشورهای لیبریا، مالاوی، بورکینافاسو و گینه بیش از ۹۰ درصد از حجم خدمات مورد انتظار را ارائه کردند و قادر به حفظ خدمات بهداشتی ضروری در طول دوره همه‌گیری بودند، درحالی‌که در بنگلادش، گواتمالا و نیجریه کمبود شدیدی در حجم خدمات مورد انتظار در سطح مراقبت‌های اولیه مشاهده شد [۱۷]. مطالعه‌ای در

پزشکان عمومی اعلام کردند که در مرحله اولیه اپیدمی، یافتن تجهیزات حفاظت فردی دشوار بود [۳۰]. همچنین مطالعه تورال و همکاران در تایلند نیز نشان داد که ناکافی بودن تجهیزات حفاظت فردی در میان پرستاران به علاوه ساعات کاری طولانی خطر ابتلا به کووید-۱۹ را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد [۳۱]. این مشکل در مطالعه جباری و همکاران نیز ذکر شده است [۳۲]. از آنجا که کارکنان سلامت در تماس مستقیم با بیماران بودند، کمبود تجهیزات حفاظت فردی خطر ابتلای آن‌ها را افزایش داده و منجر به انتشار بیشتر بیماری می‌شود، که این امر نگرانی و استرس را در آن‌ها افزایش داده و تأثیر منفی در روحیه و عملکردشان دارد. به گزارش سازمان سلامت جهان کارکنان سلامت باید در مورد نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و دفع آن نیز تحت آموزش و نظارت مناسب قرار گیرند [۳۳،۳۴].

در مطالعه حاضر حدود ۹۰ درصد از کارکنان اظهار داشتند که اقداماتی در جهت تقویت اعتماد مردم به نظام سلامت انجام می‌دادند. مثال‌هایی از این اقدامات شامل استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی، دریافت واکسن کووید-۱۹ ابتدا توسط کارکنان و خانواده‌هایشان بود که جامعه را به استفاده از ماسک، فاصله‌گذاری اجتماعی و دریافت واکسن کووید-۱۹ تشویق می‌کرد. با وجود این اقدامات، به نظر می‌رسد اعتماد عمومی به نظام سلامت در سطح بالایی قرار ندارد. مطالعه زارعی و همکاران در شهرستان رشت نیز نشان داد که میزان اعتماد عمومی به نظام سلامت در سطح نسبتاً متوسطی قرار داشت [۳۵]. تقویت اعتماد جامعه به نظام سلامت عامل مهمی برای اطمینان از رفتار مراقبت‌جویانه مناسب و رعایت توصیه‌های سلامت همگانی در حین همه‌گیری و نیز همه‌گیری‌های آینده است. تنها یک‌ششم از کارکنان رویکرد نظارت را حمایتی ارزیابی کردند و حدود یک‌سوم نیز اعلام کردند که در طول یک سال گذشته کمتر از ۳ بازدید نظارتی از مرکزشان صورت گرفته است. در مطالعه اتیوپی نیز بیشتر کارکنان نظارت را غیرحمایتی، نامنظم و متمرکز بر تکمیل چک‌لیست و عیب‌یابی توصیف کردند [۳۶]. شواهد بین‌المللی نشان می‌دهد که نظارت منظم و نظام‌مند و با اهداف مشخص، توانسته عملکرد کارکنان محلی سلامت را بهبود بخشد [۳۷] و برای حفظ کیفیت مراقبت‌ها، ایجاد انگیزه و بهبود عملکرد آن‌ها بسیار مهم است [۳۷،۳۸]. در مقابل نظارت غیرحمایتی مانعی برای ارائه مراقبت‌های باکیفیت است [۳۹]. در واحدهای محیطی و مراکز ارائه مراقبت‌های

رایج‌ترین فعالیت‌هایی بودند که اکثر ارائه‌دهندگان مراقبت‌ها اظهار داشتند که در دوران کووید-۱۹ معمولاً یا همیشه آن‌ها را انجام می‌دادند. مطالعات مشابه که در هند، بنگلادش، پاکستان، جمهوری سیرالئون، کنیا و اتیوپی انجام شد نیز نشان داد که مواردی از جمله ایجاد آگاهی در جامعه در مورد علائم، نشانه‌ها و روش‌های انتقال بیماری، اقدامات پیشگیرانه مناسب، مقابله با انگ، ردیابی تماس از نقش‌ها و وظایف جدید کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ بودند [۱۸،۲۲]. در مطالعه رحمان و همکاران در ایالات متحده آمریکا، ارجاع، شایع‌ترین رفتار گزارش‌شده توسط ۹۰ درصد از کارکنان محلی سلامت بود [۲۳]. ردیابی تماس نیز یک ابزار ضروری سلامت همگانی برای کنترل شیوع بیماری‌های عفونی بوده که زنجیره‌های انتقال بیماری عفونی را می‌شکند [۲۴]. به طور کلی اقدامات پیشگیرانه، ردیابی تماس و انجام آزمایشات سریع کووید-۱۹ نقش مهمی در کنترل انتشار بیماری ایفا می‌کنند و می‌توانند با غربالگری و شناسایی سریع افراد مبتلا به کاهش موارد ابتلا و نیاز به درمان‌های پرهزینه و بستری در بیمارستان کمک کنند. حدود ۲۷ درصد از ارائه‌دهندگان مراقبت‌ها بیان کردند که از مشارکت جامعه (مثلاً شوراها یا کمیته‌های محلی) برای اطلاع‌رسانی و پیشگیری و کنترل بیماری کووید-۱۹ استفاده نمی‌کردند. مشارکت جامعه یکی از اصول اصلی مراقبت‌های بهداشتی اولیه بوده [۲۵] و برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار بسیار مهم است [۲۶] و همچنین نقش مهمی در به حداکثر رساندن اثربخشی فعالیت‌های مربوط به آمادگی در برابر کووید-۱۹ و پاسخ به آن برای جلوگیری از گسترش این بیماری همه‌گیر و مدیریت آن دارد [۲۵،۲۶]. مشارکت جامعه توانسته به بخش سلامت کمک کند تا در برابر نیازها و چالش‌های جوامع مختلف آماده بوده و به آن‌ها پاسخ دهند [۲۷] و شامل فعالیت‌هایی از قبیل ایجاد اعتماد در جامعه، ارتباطات اجتماعی و تغییر رفتار، ردیابی تماس و غیره می‌شود [۲۸]. یکی از یافته‌های مهم این مطالعه، کمبود تجهیزات حفاظت فردی بود. به بیش از ۴۰ درصد از کارکنان تجهیزات حفاظت فردی بر اساس نقش و میزان مواجهه با خطر به آن‌ها داده نمی‌شد و همچنین حدود یک سوم نیز معتقد بودند که در مورد نحوه استفاده از تجهیزات فردی به آن‌ها آموزش داده نمی‌شد. در مطالعه لوتا و همکاران فقط ۳۰ درصد از کارکنان محلی سلامت برزیل اظهار کردند که تجهیزات حفاظت فردی کافی دریافت کرده‌اند [۲۹]. در مطالعه ورهون و همکاران در فنلاند نیز

[۳۷،۴۳،۴۷]. در مطالعه حاضر از نظر بیش از دو سوم ارائه دهندگان مراقبت ها، دوره های آموزشی که برایشان برگزار می شد کاربرد زیادی داشته و در بهبود انجام وظایف شغلی شان مؤثر بوده است. این کارکنان وضعیت ایفای نقش خود را بهتر از کارکنانی ارزیابی کردند که از نظرشان این دوره ها کاربرد و تأثیر کمی در بهبود عملکردشان داشته است. آموزش های اولیه، مستمر، مبتنی بر دانش و مهارت و باکیفیت بالا برای آماده سازی کارکنان سلامت برای نقش هایشان در ارائه خدمات ضروری و بر عهده گرفتن مسئولیت های جدید ضروری است [۲۲،۴۸،۴۹]. سرمایه گذاری در آموزش کارکنان محلی سلامت به عنوان یک راهبرد مهم برای دستیابی به اهداف مرتبط با سلامت در نظر گرفته شده است [۵۰]. کارکنان محلی سلامت باید به طور دوره ای در مورد کووید-۱۹ با تحقیقات در حال تکامل در مورد این بیماری آموزش ببینند تا انتشار به موقع اطلاعات جدید انجام شود [۲۳]. به منظور بهبود عملکرد کارکنان در نقش ها و وظایف خود و ارائه خدمات جامع تر نیاز است تا بهبود مدیریت زنجیره تأمین و دسترسی کارکنان به تدارکات و تجهیزات مورد نیاز مخصوصاً تجهیزات حفاظت فردی صورت گرفته و آموزش های مناسب به آن ها در مورد نحوه استفاده و تشویق به استفاده از این تجهیزات نیز ارائه شود. علاوه بر این برنامه ریزی برای استفاده بیشتر از پتانسیل نهادهای اجتماعی محلی مانند شوراهای و افراد تأثیرگذار در جهت تحقق اهداف نظام سلامت به ویژه هنگام بروز همه گیری ها از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین طراحی یک ساختار نظارت حمایتی و تدوین دستورالعمل اجرای آن به ویژه در دوران همه گیری ها و بحران های مشابه که کارکنان با انواع مخاطرات و استرس مواجه می شوند، بسیار مهم است. علاوه بر این پیشنهاد می شود تا آموزش های لازم به ناظران و مدیران در مورد نحوه ارائه بازخورد سازنده به کارکنان در مورد عملکردشان و بهبود ایفای نقش ناظر حمایتی ارائه شود. تعیین یک مجموعه حداقلی از داده های مورد نیاز برای مدیریت برنامه ها به منظور تضمین کیفیت داده ها و نیز اجتناب از جمع آوری داده های غیر ضروری و کاهش بار داده ها بر کارکنان اقدام مهم دیگری است که به بهبود عملکرد آنان کمک می کند. علاوه بر این لازم است تا دوره های آموزشی به موقع و به صورت مستمر همراه با مطالب به روز، کاربردی و متناسب با نیازهای کارکنان برگزار شده و از فناوری های تلفن همراه و ابزارهای یادگیری الکترونیکی برای آموزش به کارکنان به ویژه در دوران همه گیری ها استفاده شود. پیشنهاد

بهداشتی اولیه که کارکنان بهداشتی با وجود منابع محدود با مسائل پیچیده ای مواجه بودند، نظارت غیرحمایتی به عنوان یکی از عوامل خطر مشکلات سلامت روانی و استرس در محل کار توانسته تأثیرات مخربی بر رضایتمندی و انگیزش آن ها داشته باشد [۴۰،۴۱]. همچنین در مطالعه حاضر حدود یک سوم از واحدهای پژوهش اعلام کردند که در ازای داده هایی که به سطوح بالاتر ارسال می کردند بازخوردی دریافت نمی کردند که به بهبود عملکردشان کمک کند. مطالعه آگیاپونگ و همکاران در غنا نیز نشان داد که ۱۸/۳ درصد از کارکنان سلامت روان جامعه گزارش دادند که هرگز بازخوردی دریافت نمی کردند [۴۲]. بازخورد منظم از سطوح بالاتر به واحدهای محیطی جمع آوری و گزارش کننده داده ها برای ایجاد فرهنگ تولید و استفاده از داده ها بسیار مهم است [۴۳]. بازخورد سازنده به اصلاح اشتباهات و بهبود عملکرد کارکنان و نیز ایجاد حس ارزش در آنان کمک می کند [۴۴]. مدیران رده بالا باید اطمینان حاصل کنند که سرپرستان دانش، مهارت و توانایی برای ارائه بازخورد ساختارمند و سازنده را دارند تا کیفیت مراقبت ها بهبود یابد و موجب تقویت انگیزه و حفظ و نگهداری کارکنان محلی سلامت شود [۴۵]. بیش از دو سوم از واحدهای پژوهش حجم داده هایی را که جمع آوری و گزارش می کردند آن قدر زیاد توصیف کردند که مانع از انجام وظایف اصلی شان و ارائه مراقبت های باکیفیت می شد. این کارکنان وضعیت ایفای نقش خود را ضعیف تر از کارکنانی ارزیابی کردند که به نظرشان حجم داده هایی که جمع آوری و گزارش می کردند، متناسب بود. این موضوع با مطالعه دانش کهن و همکاران که با عنوان کیفیت داده ها و استفاده از آن ها در مراقبت های بهداشتی اولیه شهرستان رشت (محل انجام پژوهش حاضر) انجام شد، همسو است. در آن مطالعه ۵۹ درصد از ارائه دهندگان مراقبت ها حجم داده هایی که جمع آوری و به سطوح بالاتر ارسال می کردند را بیشتر از مقدار مورد نیاز برای مدیریت برنامه ها می دانستند. بدیهی است با افزایش بار کاری کارکنان به علت جمع آوری و ارسال داده های زیاد فرصت و توان آن ها برای ارائه مراقبت های باکیفیت سلامت کاهش می یابد [۴۶]. سازمان سلامت جهان جمع آوری و استفاده از داده ها را بخش جدایی ناپذیر از رویکردهای بهبود مستمر کیفیت تلقی می کند. در عین حال بر تعیین یک مجموعه حداقلی از داده های مورد نیاز برای مدیریت برنامه ها به منظور تضمین کیفیت داده ها و نیز اجتناب از جمع آوری داده های غیر ضروری و کاهش بار داده ها بر کارکنان تأکید دارد

سهم نویسندگان

ماندانا مهدی‌زاد: اجرای تمامی مراحل مطالعه و تنظیم پیش‌نویس و نگارش نسخه نهایی مقاله
طاهره اشک‌تراب: مشاور علمی و مشارکت در اصلاح نسخه نهایی مقاله

فرید زایری: مشاور آمار و مشارکت در تحلیل داده‌ها
فردین مهرابی‌ان: مشاور علمی و مشارکت در جمع‌آوری داده‌ها
احسان زارعی: مشارکت در اصلاح نسخه نهایی مقاله
عباس دانش‌کهن: استاد راهنما، طراحی مطالعه و نظارت بر اجرای تمامی مراحل آن و اصلاح و تأیید نسخه نهایی مقاله

تشکر و قدردانی

این مقاله بخشی از پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم ماندانا مهدی‌زاد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود. تیم نویسندگان از آقای دکتر خسروی و آقای دکتر آزاد در مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با نظرات ارزشمندشان در روایی ابزار به ما کمک کردند و کلیه افراد و سازمان‌هایی که در انجام پژوهش، گردآوری مطالب و تدوین مقاله همکاری داشته‌اند، تشکر و قدردانی می‌نماید.
هیچ‌گونه تعارض منافی وجود نداشت.

منابع

- declares global emergency: a review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19). *International Journal of Surgery* 2020;76:71-76
- Blandenier E, Habibi Z, Kousi T, Sestito P, Flahault A, Rozanova L. Initial COVID-19 outbreak: an epidemiological and socioeconomic case review of Iran. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2020;17:9593
- World Health Organization (WHO) Regional Office for the Western Pacific, Asia-Pacific Parliamentary Forum on Global Health. Ad hoc virtual meeting on COVID-19: managing the evolving COVID-19 pandemic and preparing primary health care to meet future health needs, virtual meeting, 2 December 2021: meeting report. 2021. Available at: <https://iris.who.int/handle/10665/351112>
- World Health Organization (WHO). World Health Organization coronavirus (COVID-19) dashboard.

می‌شود تا در پژوهش‌های آینده تأثیر مداخلات اجراشده در زمینه نظارت حمایتی و بازخورد سازنده در عملکرد کارکنان و میزان رضایتمندی مصرف‌کنندگان و همچنین تأثیر استفاده از آموزش مجازی بر ارتقای دانش، مهارت و عملکرد کارکنان و کنترل همه‌گیری‌ها مورد بررسی قرار گیرد. از نقاط قوت مطالعه حاضر می‌توان به تمرکز بر مراقبت‌های بهداشتی اولیه اشاره کرد که نقش حیاتی در کنترل بحران‌ها و همه‌گیری‌ها دارند و به احتمال زیاد بیشتر با کمبود منابع، حمایت و پشتیبانی مواجه می‌شوند. همچنین طراحی پژوهش بر اساس الزامات تعیین‌شده نقش کارکنان در سند راهنمای سازمان سلامت جهان برای عرصه کووید-۱۹، و این موضوع که مطالعه حاضر شامل کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی بود، از دیگر نقاط قوت این مطالعه بودند. از محدودیت‌های این مطالعه نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: به دلیل مشغله و بار کاری زیاد و در محیطی‌هایی مثل مراکز بهداشتی و درمانی که در آن ارائه مراقبت‌ها به بیمار انجام می‌شود، احتمال داشت تکمیل پرسشنامه‌ها به طور ناقص انجام شود. به‌منظور کاهش اثر این محدودیت و اطمینان از تکمیل پرسشنامه‌ها، پژوهشگر در تمام طول مدت در مراکز حضور داشت. در این مطالعه فقط از روش‌های کمی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد، درحالی‌که روش‌های کیفی به درک عمیق‌تری از موضوع، شناخت دقیق‌تر مشکلات و موانع و پیدا کردن راه‌حل‌های مربوطه کمک می‌کند.

- (Cited: 1 March 2023) Available at: <https://covid19.who.int/region/emro/country/ir>
- World Health Organization (WHO). Health workforce policy and management in the context of the COVID-19 pandemic response: interim guidance, 3 December 2020. Available at: <https://iris.who.int/handle/10665/337333>
- Walpolo R, Lucas C. Reflective practice: the essential competency for health systems and healthcare practitioners during the COVID-19 pandemic. *Reflective Practice* 2021;22:143-146
- World Health Organization (WHO). Health Topics. defining of health workforce. (Cited: 28 May 2022) Available at: https://www.who.int/health-topics/health-workforce#tab=tab_1
- Pan American Health Organization (PAHO). Impact of COVID-19 on human resources for health and policy response: the case of Belize, Grenada, and

- Jamaica. 2022. Available at: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/56262>
9. World Health Organization (WHO), Pan American Health Organization (PAHO). Impact of COVID-19 on human resources for health and policy response: the case of plurinational state of Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador and Peru: overview of findings from five Latin American countries. 2021. Available at: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/57155>
10. World Health Organization (WHO), United Nations Children's Fund (UNICEF). Primary health care measurement framework and indicators: monitoring health systems through a primary health care lens. 2022. Available at: <https://iris.who.int/handle/10665/352205>
11. World Health Organization (WHO), United Nations Children's Fund (UNICEF). A vision for primary health care in the 21st century: towards universal health coverage and the sustainable development goals. 2018. Available at: <https://iris.who.int/handle/10665/328065>
12. Van Weel C, Kidd MR. Why strengthening primary health care is essential to achieving universal health coverage. *Canadian Medical Association Journal* 2018;190:463-466
13. World Health Organization (WHO). Building health systems resilience for universal health coverage and health security during the COVID-19 pandemic and beyond: WHO position paper. 2021. Available at: <https://iris.who.int/handle/10665/346515>
14. Koolivand A, Amini S. The importance of PHC-based measures in controlling COVID-19 outbreak: implications for global health system. *Ethics, Medicine, and Public Health* 2020;14:100549
15. Sarti TD, Lazarini WS, Fontenelle LF, Almeida A. What is the role of primary health care in the COVID-19 pandemic?. *Epidemiology and Health Services* 2020;29:e2020166.
16. World Health Organization (WHO) Regional Office for the Western Pacific. Role of primary care in the COVID-19 response. 2020. Available at: <https://iris.who.int/handle/10665/331921>
17. Rezapour R, Dorosti AA, Farahbakhsh M, Azami-aghdash S, Iranzad I. The impact of the COVID-19 pandemic on primary health care utilization: an experience from Iran. *BMC Health Services Research* 2022;22:404
18. Peters MA, Ahmed T, Azais V, Amor Fernandez P, Baral P, Drouard S, et al. Resilience of front-line facilities during COVID-19: evidence from cross-sectional rapid surveys in eight low- and middle-income countries. *Health Policy and Planning* 2023;38:789-798
19. Bhaumik S, Moola S, Tyagi J, Nambiar D, Kakoti M. Community health workers for pandemic response: a rapid evidence synthesis. *BMJ Global Health* 2020;5:e002769
20. World Health Organization (WHO). Maintaining essential health services: operational guidance for the COVID-19 context: interim guidance, 1 June 2020. Available at: <https://iris.who.int/handle/10665/332240>
21. World Health Organization (WHO). Learnings from COVID-19 for future respiratory pathogen pandemic preparedness: a summary of the literature. 2023. Available at: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240086531>
22. Kaseje N, Ranganathan M, Magadi M, Oria K, Haines A. The effectiveness of rural community health workers in improving health outcomes during the COVID-19 pandemic: a systematic review. *Global Health Action* 2024;17:2292385
23. Salve S, Raven J, Das P, Srinivasan S, Khaled A, Hayee M, et al. Community health workers and Covid-19: cross-country evidence on their roles, experiences, challenges and adaptive strategies. *PLoS Global Public Health* 2023;3:e0001447
24. Rahman R, Ross A, Pinto R. The critical importance of community health workers as first responders to COVID-19 in USA. *Health Promotion International* 2021;36:1498-1507
25. World Health Organization (WHO). Contact tracing in the context of COVID-19: interim guidance, 10 May 2020. Available at: <https://iris.who.int/handle/10665/332049>
26. Al Siyabi H, Al Mukhaini S, Kanaan M, Al Hatmi S, Al Anquodi Z, Al Kalbani A, et al. Community participation approaches for effective national COVID-19 pandemic preparedness and response: an experience from Oman. *Frontiers in Public Health* 2020;8:616763
27. Sahoo KC, Sahay MR, Dubey S, Nayak S, Negi S, Mahapatra P, et al. Community engagement and involvement in managing the COVID-19 pandemic among urban poor in low-and middle-income countries: a systematic scoping review and stakeholders mapping. *Global Health Action* 2023;16:2133723
28. World Health Organization (WHO) Regional Office for the Western Pacific. Role of community

engagement in situations of extensive community transmission of COVID-19. 2020. Available at: <https://iris.who.int/handle/10665/332172>

29. Gilmore B, Ndejjo R, Tchetchia A, de Claro V, Mago E, Diallo AA, et al. Community engagement for COVID-19 prevention and control: a rapid evidence synthesis. *BMJ Global Health* 2020;5:e003188

30. Lotta G, Nunes J, Fernandez M, Garcia Correa M. The impact of the COVID-19 pandemic in the frontline health workforce: perceptions of vulnerability of Brazil's community health workers. *Health Policy Open* 2022;3:100065

31. Verhoeven V, Tsakitzidis G, Philips H, Van Royen P. Impact of the COVID-19 pandemic on the core functions of primary care: will the cure be worse than the disease? a qualitative interview study in Flemish GPs. *BMJ Open* 2020;10:e039674

32. Turale S, Meechamnan C, Kunaviktikul W. Challenging times: ethics, nursing and the COVID-19 pandemic. *International Nursing Review* 2020;67:164-167

33. Jabbari A, Salahi S, Hadian M, Khakdel Z, Hosseini E, Sheikhbardsiri H. Exploring the challenges of Iranian government hospitals related to COVID-19 pandemic management: a qualitative content analysis research from the nurses perspective. *BMC Nursing* 2022;21:226

34. World Health Organization (WHO). COVID-19: occupational health and safety for health workers: interim guidance. 2021. Available at: <https://iris.who.int/handle/10665/339151>

35. World Health Organization (WHO), International Labour Organization (ILO). Preventing and mitigating COVID-19 at work: policy brief, 19 May 2021. Available at: <https://iris.who.int/handle/10665/341328>

36. Zarei E, Chavosh Sani K, Saadati M, Khodakarim S. Public trust in health system: a study in Rasht county. *Payavard Salamat* 2022;16:296-306 [Persian]

37. Gebreselassie A, Peiris D, Abimbola S, Ajisegiri W, Narasimhan P, Mulugeta A, et al. Community health extension workers' training and supervision in Ethiopia: exploring impact and implementation challenges for non-communicable disease service delivery. *PLoS Global Public Health* 2022;2:e0001160

38. World Health Organization (WHO). WHO guideline on health policy and system support to optimize community health worker programmes. 2018. Available at: <https://iris.who.int/handle/10665/275474>

39. World Health Organization (WHO). What do we know about community health workers? a systematic review of existing reviews. 2020. Available at: <https://iris.who.int/handle/10665/340717>

40. African Health Initiative Partnership Collaborative for Supportive Supervision and Mentoring. Improving primary care quality through supportive supervision and mentoring: lessons from the african health initiative in Ethiopia, Ghana, and Mozambique. *Global Health: Science and Practice* 2022;10:e2100667

41. Daneshkohan A, Foruzanfar F, Zarei E, Ramezankhani A, Damiri S. Supportive supervision in health centers of Shahid Beheshti university of medical sciences. *Journal of Health in the Field* 2020;7:32-44 [Persian]

42. World Health Organization (WHO). Occupational health: stress at the workplace. 2020. (Cited: 1 June 2024) Available at: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/ccupational-health-stress-at-the-workplace>

43. Agyapong VI, Osei A, McLoughlin DM, McAuliffe E. Task shifting-perception of stake holders about adequacy of training and supervision for community mental health workers in Ghana. *Health Policy and Planing* 2016;31:645-655

44. Health Metrics Network (HMN), World Health Organization (WHO). Framework and standards for country health information systems. 2nd Edition, World Health Organization: Geneva, 2008

45. Majidi S, Daneshkohan A, Zarei E, Ashktorab T. Perspectives of health workers on annual performance appraisal: a study in primary health care. *International Journal of Healthcare Management* 2021;14:1-8

46. World Health Organization (WHO). Optimizing community health worker programmes for HIV services: a guide for health policy and system support. 2021. Available at: <https://iris.who.int/handle/10665/350197>

47. Daneshkohan A, Alimoradi M, Ahmadi M, Alipour J. Data quality and data use in primary health care: a case study from Iran. *Informatics in Medicine Unlocked* 2022;28:100855

48. World Health Organization (WHO). Strategy for optimizing national routine health information systems: strengthening routine health information systems to deliver primary health care and universal health coverage. 2023. Available at: <https://iris.who.int/handle/10665/376094>

49. Agarwal S, Sripad P, Johnson C, Kirk K, Bellows B, Ana J, et al. A conceptual framework for measuring community health workforce performance within primary health care systems. *Human Resources for Health* 2019;17:86
50. European Observatory on Health Systems and Policies, Ziemann M, Chen C, Forman R, Sagan A, Pittman P. Global health workforce responses to address the COVID-19 pandemic: what policies and practices to recruit, retain, reskill, and support health workers during the COVID-19 pandemic should inform future workforce development?. 2023. Available at: <https://iris.who.int/handle/10665/371358>
51. World Health Organization (WHO) Country Office for India. Build back better: role of frontline health workers in managing the COVID-19 pandemic and delivery of essential health services in Assam. 2022. Available at: <https://iris.who.int/handle/10665/365312>