

## Explaining the Mizaj Identification Criteria in Diabetic Children Based on Persian Medicine Experts agreement; A Delphi method

Morteza Mojahedi<sup>1</sup>, Majid Asghari<sup>2</sup>, Abbas Ebadi<sup>3</sup>, Reza Ilkhani<sup>4</sup>, Zahra Aghauri<sup>5\*</sup>, Ali Montazeri<sup>6</sup>

1. Traditional Medicine and History of Medical Sciences Research Center, Babol University of Medical Science, Babol, Iran
2. School of Traditional Persian Medicine, Qom University of Medical Science, Qom, Iran
3. Behavioral Sciences Research Center, Life Style, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4. School of Traditional Persian Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5. Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6. Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research, ACECR, Tehran, Iran

Received: 12 December 2021

Accepted for publication: 15 May 2021

[EPub a head of print-31 May 2021]

Payesh: 2021; 20 (3): 311-322

### Abstract

**Objective (s):** In Persian Medicine (PM) diabetes mellitus is known as a dysmetabolic diseases (Su-e-mizaj) and is divided into two main types, hot and cold. Achieving agreed diagnostic criteria among PM experts for standardizing such criteria for identification of two types of diabetes and its management is essential. This study aimed to examine diabetes mizaj criteria via consensus of PM physicians.

**Methods:** This was a cross sectional survey and conducted by the Delphi method. Diabetes mizaj symptoms were collected from PM literature, and patient and PM experts interview. Sixteen PM experts were requested to evaluate quantitative and qualitative value of these symptoms during 3 rounds of Delphi.

**Results:** Based on the results of third round; thirst, touch condition of hand and kidney, impressibility of air and food and face puffing, were considered as major criteria and urine color and smell and face and eye color were considered as minor criteria for identification of diabetic children Mizaj or Su-e-mizaj

**Conclusion:** This study extracted the agreed criteria for determining the diabetic children Mizaj. These criteria, can be used to diagnose, different Su-e-mizaj of hole body and organs and so two types of diabetes (hot and cold) in diabetic children. Quantifying the intended criteria might lead to more exact diagnosis of the patients' mizaj.

**Key Words:** Diabetes, Ziamites, mizaj, Delphi method

\* Corresponding author: Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran  
E-mail: aganouri@gmail.com

## تبیین معیارهای مورد توافق متخصصان طب ایرانی، جهت تعیین مزاج کودکان دیابتی؛ به روش دلفی

مرتضی مجاهدی<sup>۱</sup>، مجید اصغری<sup>۲</sup>، عباس عبادی<sup>۳</sup>، رضا ایلخانی<sup>۴</sup>، زهرا آقانوری<sup>۵</sup>، علی منتظری<sup>۶</sup>

۱. مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
۲. دانشکده طب سنتی ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
۳. مرکز تحقیقات علوم رفتاری و سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
۴. دانشکده طب سنتی ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
۵. مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
۶. مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۹/۲۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۲/۲۵

[نشر الکترونیک پیش از انتشار - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰]

نشریه پایش: ۱۴۰۰، ۲۰ (۳): ۳۱۱-۳۲۲

### چکیده

**مقدمه:** در طب ایرانی دیابت از نظر مزاجی به دو نوع گرم و سرد تقسیم و برای هر یک درمان‌های متفاوت ذکر شده است. هدف از این پژوهش، دست‌یابی به معیارهای مورد توافق متخصصان با تجربه طب ایرانی، جهت تعیین مزاج کودکان مبتلا به دیابت بود.

**مواد و روش کار:** در این تحقیق که طی سالهای ۹۶-۹۶ انجام شد، ابتدا معیارهای مطرح شده جهت تعیین مزاج بیماران دیابتی طی سه زیر مطالعه کیفی شامل؛ کتب معتبر طب ایرانی، مصاحبه با بیماران و متخصصان طب ایرانی، شناسایی و تحلیل شدند. سپس با استفاده از روش دلفی از ۱۶ متخصص طب ایرانی، در خصوص اهمیت کمی و کیفی شاخص‌های به دست آمده طی سه دور نظرسنجی بعمل آمد. پس از هر دور پاسخ‌ها مورد تجزیه و تحلیل آماری و کیفی قرار گرفت و در نهایت شاخص‌هایی که میانگین امتیاز بسیار خوب داشتند معیار اصلی و آنها که امتیاز خوب داشتند معیار فرعی تلقی شدند.

**یافته‌ها:** پس از انجام سه دور دلفی؛ متخصصان، گزاره‌های میزان عطش، ملمس دست، ملمس کلیه، تاثیرپذیری از هوا، تاثیرپذیری از غذا و تهیج (پف دور چشم) را به عنوان معیارهای اصلی و علائمی همچون رنگ ادرار، بوی ادرار، رنگ چهره و رنگ چشم را به عنوان معیارهای فرعی در تشخیص مزاج کودکان دیابتی در نظر گرفتند.

**نتیجه گیری:** معیارهای به دست آمده علاوه بر کمک به تشخیص انواع سوء مزاجات عام و عضوی ساده یا مادی، دقت کافی در افتراق دیابت گرم و سرد را در کودکان دیابتی دارد. کمی‌سازی معیارهای به دست آمده سبب افزایش دقت آنها در تشخیص مزاج بیماران شده است.

**کلیدواژه:** مزاج، دیابت، روش دلفی، طب ایرانی

\* نویسنده پاسخگو: اصفهان، خیابان خرم، بیمارستان صدیقه طاهره، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم  
E-mail: aganouri@gmail.com

## مقدمه

فیزیکی [۲۴] و نیازمند استاندارد سازی شاخص‌های تشخیص آن است. در حال حاضر استفاده از پرسشنامه‌های متفاوت که عمدتاً از حداقل درجه اعتبار برخوردار نیستند در پایان نامه‌های انجام شده روی دیابت سبب شده مزاج‌های مختلف از این بیماری گزارش گردد. اصغری و همکاران در مطالعه خود، مزاج غالباً بیماران بزرگسال مبتلا به دیابت نوع ۲ را گرم و تر گزارش نمودند. [۲۵] در مطالعه دیگر مقیمه و همکاران مزاج غالب بیماران بزرگسال مبتلا به دیابت نوع ۲ را در ۳ دسته گرم و خشک (۴۷٪)، سرد و خشک (۳۳٪) و سرد و تر (۲۰٪) گزارش کرده‌اند. جهت تعیین مزاج بیماران در این دو مطالعه از دو کاربرگ متفاوت خود ساخته که مراحل اعتبار سنجی آن طی نشده استفاده شد. [۲۶]

روش دلفی ابزار ارتباطی بین گروهی از خبرگان است که کاربرگوله کردن آرای اعضاء گروه را آسان می‌کند. از سویی، روشی مناسب برای ایجاد یک توافق سریع میان دسته‌های افراد متخصص است که یکدیگر را نمی‌شناسند و در حین جمع بندی روشمند نیازی به تقابل رو در رو جهت بیان نظرات وجود ندارد. این روش در خصوص بسیاری از موضوعات مرتبط با سلامتی به کار رفته و سبب بهبود تصمیم‌گیری در تشخیص و درمان بسیاری از بیماریها شده است. [۲۷-۲۹].

از انجایی که شاخص‌های مربوط به تشخیص گرم یا سرد بودن انواع دیابت، بالینی است و در این خصوص وضعیت توافق بین خبرگان طب ایرانی در تشخیص مشخص نیست، دستیابی به اتفاق نظر در تعریف و کاربرد شاخص‌های تشخیص ضروری است. هدف از این پژوهش، تعیین مهمترین معیارهای مورد توافق متخصصان طب ایرانی جهت تعیین مزاج کودکان دیابتی با استفاده از روش دلفی بود. انتظار می‌رود بر اساس نتایج این پژوهش مسیر استاندارد سازی شاخص‌های تشخیص انواع گرم و سرد این بیماری از منظر طب ایرانی جهت بررسی اثر بخشی مداخلات مدنظر این مکتب بعنوان درمان کمکی این بیماری، هموارتر گردد.

## مواد و روش کار

با توجه به اینکه تا کنون مطالعه‌ای در خصوص علایم مزاجی انواع دیابت انجام نشده بود قبل از انجام دلفی، ابتدا اطلاعات مورد نیاز از سه منبع کتب طب ایرانی (شامل قانون، الحاوی، اکسیر اعظم، الاسباب و العلامات، طب اکبری، المختارات فی طب، رساله‌هی ذیابیطس، شرح اقسرایی)، و طی مصاحبه‌هایی که با خبرگان طب

دیابت نوع یک، یکی از شایع ترین بیماری‌های مزمن دوران کودکی است که در اثر تخریب سلولهای بتا پانکراس و کمبود انسولین، ایجاد می‌شود. این بیماری اغلب در دوران کودکی بروز می‌کند، اما یک چهارم موارد در بزرگسالان تشخیص داده می‌شود [۱-۴]. سن شروع دیابت در دوران کودکی دارای توزیع دو قله‌ای، با یک اوج در چهار تا شش سالگی و اوج دوم در اوایل بلوغ (۱۰ تا ۱۴ سالگی) است؛ به طور کلی، در حدود ۴۵ درصد از کودکان، قبل از ۱۰ سالگی بروز می‌کند [۵]. بروز این بیماری در سراسر جهان از ۲ تا ۵ درصد در سال، در حال افزایش است و دلایل این افزایش بروز همچنان ناشناخته است [۶]. تظاهرات بالینی دیابت نوع یک، در دوران کودکی می‌تواند به صورت شروع علایم کلاسیک، شامل پرنوشی، پرادراری و از دست دادن وزن همراه با هیپرگلیسمی و کتونمی یا کتونوری یا کتواسیدوز دیابتی باشد و یا بصورت خاموش و بدون علامت (کشف اتفاقی) بروز کند [۷]. بیماران مبتلا به دیابت نوع ۱ و خانواده‌های ایشان علاوه بر تحمل هزینه‌های سنگین ناشی از درمان، با عوارض جسمی و روانی ناشی از هیپرگلیسمی، تزريق مکرر انسولین و چک مکرر قند خون، طولانی شدن مدت بیماری بعلت ابتلا از سنین پایین و چالش‌های روانی والدین ناشی از بیماری کودک خانواده درگیر هستند. در نتیجه، هر گونه مداخله بهداشتی - درمانی که بتواند شروع تظاهرات دیابت را به تأخیر بیندازد یا پیش‌رفت عوارض آن را کند نماید، سهم بسزایی در تخفیف آلام بیماران، بهبود کیفیت زندگی آنها و کاهش هزینه‌های تحمیلی خواهد داشت [۸].

طب سنتی ایران، یک مکتب طبی جامع، از انواع پزشکی‌های سنتی است که نگرش آن به بیمار کل نگر و بر پایه مزاج و اخلاق از چهارگانه است [۹]. از منظر طب سنتی ایران، بسیاری از بیماریها - نظیر دیابت - ناشی از اختلال در سیستم مزاجی بدن (سوء مزاج) بوده و بخشی از راههای پیشگیری از ابتلا یا درمان بیماری منوط به اصلاح مزاج است [۱۰-۱۲].

از نظر طب ایرانی ذیابیطس یا دولاب بیماری است که بیمار مبتلا به محض نوشیدن آب، آن را از طریق ادرار دفع می‌کند. همین امر باعث می‌شود بیمار به طور دائم احساس تشنگی داشته باشد. از منظر طب ایرانی ذیابیطس بر حسب سوء مزاج گرم یا سرد باشد به دو نوع ذیابیطس حار (گرم) و ذیابیطس بارد (سرد) تقسیم می‌شود. [۱۳-۱۵]. افتراق این دو بر اساس شرح حال، معاینه

درون خوشه ای (ICC) ارزیابی شد. بر اساس فاصله اطمینان ۹۵٪ تخمین ICC، مقادیر کمتر از ۵٪، بین ۰/۵ تا ۰/۷۵، بین ۰/۷۵ تا ۰/۹ و بیشتر از ۰/۹۰، به ترتیب نشان دهنده قابلیت اطمینان ضعیف، متوسط، خوب و عالی در نظر گرفته شد.<sup>[۳۳]</sup>

### یافته‌ها

نتایج مرور متون و مصاحبه‌ها به تفصیل در جدول شماره ۱، آمده است. تیم تحقیق از ۸۲۵ شاخص به دست آمده ۲۸ گزاره که حداقل در یک زیر مطالعه بیش از ۲۰٪ تکرار داشتند، را در قالب کاربرگ اولیه دلفی آماده نمود. در دور اول دلفی از بین ۲۰ متخصص که جهت مراحل دلفی دعوت به همکاری شدند ۱۸ نفر کاربرگ ارسالی مرحله اول را در موعد مقرر تکمیل و ارسال نمودند. بر اساس نتایج این مرحله ۱۹ معیار برای ذیابیطس گرم و ۱۱ معیار برای ذیابیطس سرد مورد توافق متخصصان جهت دور اول دلفی استخراج شد. سپس کاربرگ مستخرج از دور اول دلفی جهت ۱۸ متخصص تکمیل کننده ارسال شد. بر اساس نتایج تحلیل دور و درخواست متخصصان همکار جهت سهولت در پاسخدهی، جداول امتیازدهی کرایتیوی ذیابیطس گرم و سرد تفکیک شدند. از این بین ۱۷ متخصص کاربرگ‌های ارسال را در موعد مقرر تکمیل و ارسال نمودند. نتایج تحلیل دور دوم نشان داد ۱۲ معیار برای ذیابیطس گرم و ۸ معیار برای ذیابیطس سرد مورد توافق متخصصان قرار گرفته است. همچنین مقایسه نتایج دور اول دوم بر اساس میانگین نمرات کسب شده هر شاخص، حاکی از پایداری و توافق بالای پاسخهای متخصصان در این ۲ دور بود. کاربرگ مستخرج از دور دوم برای متخصصان شرکت کننده در دور دوم ارسال و از این بین ۱۶ متخصص شامل ۶ زن و ۱۰ مرد در موعد مقرر کاربرگ را تکمیل و باز ارسال نمودند. میزان توافق درون خوشه ای (ICC) متخصصان در امتیاز دهنده به شاخص‌ها در دور سوم برابر (۰/۴۵-۰/۴۵) بود.

تحلیل میانگین امتیاز به دست آمده برای نشانگان ارزشمند در ذیابیطس حار نشان داد؛ از مجموع ۱۷ نشانگان ارایه شده، یک نشانگان (عطش شدید) امتیاز بالای ۸، ۶ نشانگان شامل ملمس گرم دست و بدن، ملمس گرم گرده، انتفاع از سرما، تضرر از گرما، انتفاع از غذای سرد، تضرر از غذای گرم امتیاز ۷-۸، ۵ نشانگان شامل ادرار پر رنگ، ادرار تندر بود، سوزش ادرار، فوریت ادرار و رنگ زرد یا سرخ چهره میانگین امتیاز ۷-۶ و ۵ نشانگان شامل رنگ زرد یا سرخ زبان، رنگ زرد یا سرخ چشم، کاهش وزن، افزایش

ایرانی و بیماران انجام شد، در قالب سه زیر مطالعه، استخراج شد. در این مرحله، شناسایی درون‌مایه‌های اصلی و توسعه تعریف ذیابیطس با روش تحلیل محتوا قراردادی در کاربرگ بدون ساختار اولیه انجام گرفت و جمع‌بندی نتایج آن کاربرگ بدون ساختار را به کاربرگی با ساختار تبدیل نمود که اساس دور اول دلفی را تشکیل می‌داد.

تیم تحقیق مشکل از ۴ متخصص طب ایرانی و ۲ اپیدمیولوژیست تشکیل شد. در ابتدا ۲۰ نفر متخصصان طب ایرانی عضو هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی کشور با سابقه فعالیت بالینی و پژوهشی در حوزه دیابت و مزاج شناسی بر اساس نظر تیم تحقیق جهت مراحل نظرسنجی با روش دلفی کلاسیک<sup>[۳۰]</sup> دعوت به همکاری گردیدند. پس از انجام مکاتبه و معرفی طرح، کاربرگ استخراج شده با یک متن مقدماتی در مورد هدف مطالعه به متخصصان مد نظر ارسال شد.

جهت ارایه نظرات متخصصان از لیکرت ۴ گزینه‌ای در دور اول و دوم استفاده شد. همچنین به اعضای پانل اجاذه درج نظرات داده شد. نتایج هر دور به دو صورت کمی، با استفاده از شاخص‌های مرکزی و پراکنده‌ی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.<sup>[۳۱]</sup> اجماع در دور اول و دوم بصورت کسب میانگین نمره بیشتر از ۲ برای هر گزینه، تعریف شد. در پایان دور دوم، معیارهایی که میانگین کمتر از ۲ امتیاز کسب کرده بودند حذف شدند (حداقل ۰/۵ درصد نمره، مبنای حذف بود).<sup>[۳۲]</sup> و تعاریف کاربردی و توسعه یافته‌های یک از معیارهای برگزیده با نظر تیم تحقیق تنظیم شد.

دور سوم با هدف استخراج معیارهای اصلی و فرعی از بین شاخص‌های مورد تایید و توافق متخصصان انجام شد. در این مرحله از متخصصان خواسته شد، با توجه به تعریف کاربردی هر نشانگان و امتیازات دور قبلی، علایم را باز بینی و این بار بر اساس اهمیت بالینی بین ۰-۱۰ نمره گذاری کنند. در این خصوص جهت نشانگان بسیار ارزشمند (پاتوگنومیک) نمره ۱۰، جهت نشانگان ارزشمند (معیار اصلی) نمره ۷-۹، جهت نشانگان کمتر ارزشمند (معیار فرعی) نمره ۴-۶ و جهت نشانگان فاقد ارزش نمره ۳-۰ پیشنهاد شد. نتایج دور سوم، مانند قبل، مورد تجزیه و تحلیل تیم تحقیق قرار گرفت. اجماع بصورت میانگین نمره بیشتر از ۷ برای معیارهای اصلی و میانگین امتیاز ۵-۷ برای معیار فرعی تعریف شد. معیارهایی که میانگین کمتر از ۵ امتیاز کسب کرده بودند حذف شدند. پایداری در پاسخ‌ها و میزان توافق در دور اخیر با محاسبه میزان توافق

امتیاز ۷-۸، ۴ نشانگان شامل: ملمس سرد دست و بدن، ادرار بدون بو، عطش غیر شدید و رنگ سفید یا تیره رخسار میانگین امتیاز ۶-۷ و رنگ سفید یا تیره زبان امتیاز ۵-۶ کسب کرده بودند. هیچ با در نظر گرفتن نظرات متخصصان و همچنین ادغام نشانگان تضرر و انتفاع، تحت عنوان تاثیرپذیری از هوا و غذا، نهایتاً ۵ نشانگان که امتیاز بالای ۷ نیز داشتند؛ شامل: عطش شدید، ملمس دست، ملمس گرده، تاثیرپذیری از هوا و تاثیرپذیری از غذا و تبهج (پف دور چشم) بعلاوه عطش غیر شدید (با نظر تیم تحقیق به قرینه عطش شدید که در ذیابیطس حار امتیاز و اهمیت بالایی کسب کرده بود) تحت عنوان معیارهای اصلی و ۳ نشانگان که اهمیت کمتر و غالباً امتیاز کمتر از ۷ داشتند؛ شامل ادرار کمرنگ، ادرار بدون بو و رنگ سفید یا تیره چهره بعنوان معیارهای فرعی انتخاب شدند. رنگ زبان حذف شد. روند تکامل و استخراج معیارها طی سه دور دلفی در جدول شماره ۲ و چک لیست امتیاز دهی به معیارهای تعیین شده جهت تعیین مزاج کودکان دیابتی در پیوست شماره ۱ آمده است.

اشتها و شب ادراری شدید امتیاز ۵-۶ کسب کرده بودند. هیچ موردي میانگین امتیاز کمتر از ۵ یا بیشتر از ۹ نداشت. با در نظر گرفتن نظرات متخصصان و همچنین ادغام نشانگان تضرر و انتفاع، تحت عنوان تاثیرپذیری از هوا و غذا، نهایتاً ۵ نشانگان که امتیاز بالای ۷ نیز داشتند؛ شامل: عطش شدید، ملمس دست، ملمس گرده، تاثیرپذیری از هوا و تاثیرپذیری از غذا بعنوان معیارهای اصلی و ۵ نشانگان که امتیاز کمتر از ۷ داشتند؛ شامل ادرار پر رنگ، ادرار تند بو یا بد بو، سوزش ادرار، رنگ زرد یا سرخ چهره و رنگ زرد یا سرخ چشم بعنوان معیارهای فرعی انتخاب شدند. سایر گزینه‌ها که امتیازهای کمتر کسب کرده بودند حذف شدند. تحلیل میانگین امتیاز به دست آمده برای هر شاخص (امتیاز از ۱۰-۰) از جدول ب (نشانگان از زشمند در ذیابیطس سرد) نشان داد؛ از مجموع ۱۲ نشانگان ارایه شده، ۷ نشانگان شامل: تضرر از غذای سرد، ملمس سرد گرده، انتفاع از غذای گرم، انتفاع از گرما، تبهج (پف دور چشم)، تضرر از سرما و ادرار کم رنگ میانگین

جدول ۱: جمع بندی علایم مزاجی بیماری دیابت در مصاحبه با بیماران و اساتید و در متون طب سنتی

نشانگان	ذیابیطس	اصحابه بیماران	سوء‌مزاجات عام در مصاحبه اساتید					
			سوء‌مزاجات کلیه			در مصاحبه اساتید		
			در کتب	در کتب	در کتب	در کتب	در کتب	در کتب
خرشکی	laguerri (٪۴۷)	laguerri (٪۵۰)	هزال	laguerri (٪۱۰)	laguerri (٪۱۰)	سرد	گرم	گرم
خشکی پوست و مخاطرات عمارض نمیشود	[٪۷۰]	خشکی	خشکی	ریزش آب دهان (بلغم) /٪۸۰	خشکی مخاطرات (دم) /٪۲۰	ریزش آب دهان (بلغم) /٪۸۰	ریزش آب دهان (بلغم) /٪۲۰	ریزش آب دهان (بلغم) /٪۸۰
خشکی مو دور چشم (فرورفته) برآمده (٪۰/۵)	-	خشکی	خشکی	ترک زبان (صفرا) /٪۱۰	ترک زبان (صفرا) /٪۱۰	ترک زبان (صفرا) /٪۱۰	ترک زبان (صفرا) /٪۱۰	ترک زبان (صفرا) /٪۱۰
تضرر (با تضرر از گرم) از گرمیجات (٪۰/۲۳) تضرر از گرم (٪۰/۱۷) سردی از گرمیجات (٪۰/۰۵)	-	تضرر (با تضرر از گرم) از گرمیجات (٪۰/۲۳)	تضرر (با تضرر از گرم) از گرمیجات (٪۰/۰۵)	سربدی ایدا از میردات و انتفاع از مسخنات /٪۰/۷۰	سربدی ادویه گرمده /٪۰/۳۰	سربدی ادویه گرمده /٪۰/۱۰	سربدی ادویه گرمده /٪۰/۱۰	سربدی ادویه گرمده /٪۰/۱۰
ملمس دست برد اطراف (٪۰/۵)	-	ملمس دست	ملمس دست	گرمی ملمس /٪۰/۵۰	گرمی ملمس /٪۰/۴۰	سردی ملمس /٪۰/۱۰	سردی ملمس /٪۰/۱۰	سردی ملمس /٪۰/۱۰
رنگ ملمس کلیه	[٪۵]	رنگ ملمس کلیه	رنگ ملمس کلیه	حرارت محل کلیه	٪۰/۱۰	٪۰/۲۰	٪۰/۳۰	٪۰/۴۰
سرخی در گرم/ دمsoy:	-	سرخی در گرم/ دمsoy:	سرخی در گرم/ دمsoy:	سرخی در گرم/ دمsoy:	٪۰/۱۰	٪۰/۲۰	٪۰/۳۰	٪۰/۴۰
سبب (عوامل) موجسب	-	سبب (عوامل) موجسب	سبب (عوامل) موجسب	ترس	٪۰/۱۰	٪۰/۲۰	٪۰/۳۰	٪۰/۴۰
شرب آب اغذیه ادویه اس-ترس و ت-رس ادویه- ادویه- فراش، ریاضت سرد بسیار مفرط ریاضت مفرط	-	شرب آب اغذیه ادویه ادویه- ادویه- فراش، ریاضت سرد بسیار مفرط ریاضت مفرط	شرب آب اغذیه ادویه ادویه- ادویه- فراش، ریاضت سرد بسیار مفرط ریاضت مفرط	ترس	٪۰/۱۰	٪۰/۲۰	٪۰/۳۰	٪۰/۴۰



سوء ظن و فحخ و آروغ	غشيان و قي (صفرا) /۴۰	دل درد و استفراغ (٪۱۷)
ترش و معده سرد (بلغم)		
٪/۹۰		
سوژش فم معده (سودا) ٪/۳۰	شیریني دهان (دم) ٪/۳۰ تلخى دهان (صفرا) ٪/۵۰ ٪/۱۰ (بلغم)	مزه دهان [٪/۵] نزله [٪/۱۷] تاري ديد (٪/۵)
زيادي خواب (بلغم) ٪/۳۰	خواب زياد (دم) ٪/۳۰	تحرييک پذيری- بيقراری (٪/۴۱)
سيستي و کسالت (بویزه) ٪/۶۰	بيقراری و کسالت (بویزه) ٪/۳۰	صحيحگاهي (بلغم) ٪/۶۰
بي خوابي (سودا) ٪/۶۰	بي خوابي (سودا)	

جدول ۲: روند تکامل استخراج معیارها طی سه دور مطالعه دلفی

شدت عطش	تفکیک	دیابت گرم	عطش شدید	تکمیل	عطش شدید يا اصلاح (عطش شدید) اصلی	روند تکامل سوم	نشانگان دور سوم	تحلیل دور سوم و استخراج معیارهای اصلی و فرعی
شدت پرادراري	تفکیک	دیابت حار	شدت پرادراري	حذف	عطش به آب	اصلاح (عطش شدید) اصلی	روند تکامل	نمشانگان دور سوم
شدت شب ادراري	تفکیک	دیابت سرد	شدت پرادراري	حذف	سرد	اصلاح	شب ادراري	شدید
تکرر ادرار	تفکیک	دیابت گرم	شدت شب ادراري	حذف	سرد	اصلاح	شب ادراري	حذف
سرعت قیام به بول (فوریت ادرار)	تفکیک	دیابت سرد	تواتر ادرار (فرکوئنسی)	حذف	سرد	اصلاح	سرعت قیام به بول	حذف
سوژش ادرار	تفکیک	دیابت گرم	تواتر ادرار (فرکوئنسی)	حذف	سرد	اصلاح	سرعت قیام به بول	بول
رنگ ادرار	تفکیک	دیابت گرم	سوژش ادرار (دیزوری)	حذف	سرد	اصلاح	سوژش ادرار	تایید
بوی ادرار	تفکیک	دیابت گرم	سوژش ادرار (دیزوری)	حذف	سرد	اصلاح	سوژش ادرار	فرعي
حرارت ادرار	تفکیک	دیابت گرم	حرارت ادرار	حذف	سرد	حرارت ادرار	حرارت ادرار	فرعي
سوخنگی پا	تفکیک	دیابت گرم	سوخنگی پا (دیپر راش)	تایید	سرد	حرارت ادرار	سوخنگی پا (دیپر راش)	فرعي
گرمی بدن در لمس	تفکیک	دیابت گرم	گرمی بدن در لمس	تایید	سرد	حرارت ادرار	حرارت ادرار	فرعي
تب	تفکیک	دیابت گرم	تب	حذف	سرد	دیابت سرد	دیابت سرد	اصلي

			حذف	تب	دیابت سرد			
اصلی	گرمی گرده در لمس	تجمیع (ملمس گرده)	تاپید	گرمی گرده در لمس	دیابت گرم	تفکیک	گرمی گرده در لمس	
اصلی	سردی گرده در لمس		تاپید	سردی گرده در لمس	دیابت سرد			
فرعی	رنگ زرد یا سرخ رخسار	تاپید	رنگ زرد یا سرخ رخسار		دیابت گرم	تفکیک	رنگ رخسار	
فرعی	رنگ سفید یا تیره رخسار	تاپید	رنگ سفید یا تیره رخسار		دیابت سرد			
فرعی	رنگ زرد یا سرخ چشم	تاپید	رنگ زرد یا سرخ چشم		دیابت گرم	تفکیک	رنگ چشم	
			حذف	رنگ سفید یا تیره چشم	دیابت سرد			
	رنگ زرد یا سرخ زبان	تاپید	رنگ زرد یا سرخ زبان		دیابت گرم	تفکیک	رنگ زبان	
	رنگ سفید یا تیره زبان	تاپید	رنگ سفید یا تیره زبان		دیابت سرد			
laghi	لاغری	حذف	لاغری	لاغری	دیابت گرم	تفکیک	laghi	
		حذف	چاقی		دیابت سرد			
اصلی	تیهچ	تایید	حذف	گودی دور چشم	دیابت گرم	تجمیع و	گودی دور چشم	
		تایید	تیهچ		دیابت سرد	تفکیک	تیهچ	
		حذف	خشکی پوست		دیابت گرم	تفکیک	خشکی پوست	
		حذف	خشکی پوست		دیابت سرد			
		حذف	خشکی مخاط		دیابت گرم	تفکیک	خشکی مخاط	
		حذف	خشکی مخاط		دیابت سرد			
		حذف	پوست		دیابت گرم	تفکیک	پوست	
		حذف	پوست		دیابت سرد			
		حذف	نیض سریع/ طویل		دیابت گرم	تفکیک	نیض	
		حذف	نیض بطی/ قصیر		دیابت سرد			
		حذف	افزایش اشتها	افزایش اشتها	دیابت گرم	تفکیک	اشتها	
		حذف	کاهش اشتها		دیابت سرد			
		حذف	کاهش قوت		دیابت گرم	تفکیک	قوت	
		حذف	کاهش قوت		دیابت سرد			
اصلی	تجمیع (انفعال از هوا)	تمکیل	تضرر از گرما	تضرر از گرما	دیابت گرم	تجمیع و	تضرر از گرما	
		تمکیل	انتفاع از سرما		دیابت سرد	تفکیک		
اصلی		تمکیل	تضرر از سرما				تضرر از سرما	
			انتفاع از گرما					
اصلی	تضرر از غذای گرم	تجمیع (انفعال از غذا)	تمکیل	تضرر از غذای گرم	دیابت گرم	تجمیع و	تضرر از غذای گرم	
			تمکیل	تضرر از غذای سرد	دیابت سرد			
			حذف	بیقراری	دیابت گرم	تفکیک	بیقراری	
			حذف	بیقراری	دیابت سرد			

## بحث و نتیجه‌گیری

در بیماران مورد تأکید بوده اما در متون، ذیل عالیم سوء مزاجات گرم کلیه ذکر شده و ذیل عالیم بیماری ذیابیطس گرم (افراط سوء مزاج گرم کلیه) و سرد هر دو ادرار بیرنگ و بدون سوزش آمده، لذا چنین برداشت میشود که کودکان دیابتی با ادرار پر رنگ یا سوزش ادرار قطعاً سرد نیستند و ممکن است هنوز در طیف سوء مزاج گرم کلیه باشند؛ بعبارت دیگر هنوز پر ادراری آنقدر شدید نشده باشد که ادرار کاملاً بیرنگ شود.

تحلیل داده های زیر مطالعه دوم (اصحابه های اساتید) نشان داد: در خصوص معیارهای تعیین مزاج دیابت و عضو کلیه بویژه در کودکان، متخصصان معدودند که بتوان با مصاحبه این عالیم را استخراج کرد و نتایج این مصاحبه ها بیشتر در عالیم مزاج بیماران کمک کننده است؛ در حالیکه این موارد مبتلا به کودکان مطالعه ما نبود. مقایسه کاربرگ های خودساخته جهت تعیین مزاج بیماران دیابتی [۲۶، ۲۲] با چک لیست به دست آمده از این مطالعه نشان میدهد بعضی فقط مزاج عام را سنجیده اند، یا آن را کمی نکرده اند یا افتراق بیماری گرم از سرد در آنها مشخص نیست. گاهی هم آنقدر طولانی شده که برای کار در کلینیک مناسب نیست.

بر اساس این یافته، اساتید در دورها دلفی معیارهای تعیین مزاج گرم و سرد را (دو سر طیف) جداگانه در نظر گرفتند؛ بطوریکه تأکید بر شیوه بیشتر عالیم گرمی در بیماران، ایشان را از عالیم دیابت سرد که نادرتر است غافل نکند.

این مطالعه توانست با استفاده از روش دلفی معیارهای مورد توافق جمعی از اساتید طب سنتی در تعیین مزاج کودکان دیابتی را استخراج کند. روش کار در این مطالعه سبب شد نشانگان ابتدایی چنان جامع و گسترده باشند که انواع سوء مزاجات ممکن از عام و عضوی یا ساده و مادی را در بر گیرد و نهایتاً معیارهایی استخراج شد که با اجماع اساتید طب سنتی دقت کافی در افتراق دیابت گرم و سرد را داشته باشد. همچنین کمی سازی کاربرگ نهایی از امتیازات بویژه این مطالعه است که زمینه را برای پژوهش های بعدی آماده می کند.

پیشنهاد میشود پژوهشی جهت ارزیابی و اعتبارسنجی معیارهای استخراج شده در این مطالعه طراحی و انجام شود. همچنین پژوهشی همانند، جهت دستیابی به معیارهای مورد توافق اساتید طب سنتی در سایر در موردن سایر انواع دیابت، انجام شود و با تعیین مزاج بیماران دیابتی، با استفاده از معیارهای به دست آمده، میزان شیوه ذیابیطس گرم و سرد در ایران بررسی شود.

این مطالعه برای اولین بار در طول تاریخ پزشکی، توانست در ابتدا با بررسی گسترده در متون و انجام مصاحبه با بیماران و اساتید طب سنتی بیش از ۷۵۰ واحد معنایی از عالیم دیابت را شناسایی کند و سپس با انجام ۳ دور نظر سنجی از اساتید خبره طب سنتی، ۱۱ شاخص مهم و در دسترس و قابل ارزیابی را با درصد توافق خوب اساتید (۶۲٪)، در قالب معیارهای اصلی و فرعی استخراج کند.

محدودیت های این مطالعه شامل کمی تعداد کودکان تازه مبتلا به دیابت، عدم دسترسی به بیماران مذکور در مرحله قبل از شروع بیماری، کمی تجربه متخصصان در خصوص کودکان دیابتی، عدم همکاری و محدود بودن فرصت متخصصان برای شرکت در طرح بود. استفاده از سه زیر مطالعه در تهیه کاربرگ اولیه دلفی بویژه مصاحبه با بیماران سبب شد ضعف و کم تجربگی اساتید در بیماران حاد دیابت نوع یک، ناشی از شیوع پایین آن در مقایسه با نوع دو، تا اندازه ای جبران شود. تیم تحقیق تلاش کرد با انکاس دقيق و کامل یافته های زیر مطالعات همچنین نظرات تکمیلی اساتید در راندها، معیارها به گونه ای استخراج شود که در عین موجز و خلاصه بودن هیچ معیار مفیدی حذف نشود. به گونه ای که ۱۱ شاخص به دست آمده بیش از ۸۰٪ عالیم ذکر شده در متون و مصاحبه های اولیه را شامل میشود. البته عالیمی که دال بر خشکی مزاج بیماران بود نظیر لاغری و خشکی پوست و مخاطات، اگر چه در مصاحبه ها و متون مورد تأکید بوده از نظر اساتید، از عوارض دیابت و کم آبی بوده و در افتراق ذیابیطس گرم از سرد کمک نمیکند. همچنین عالیمی (غیر اختصاصی) نظیر ضعف و کاهش یا افزایش اشتهاي طعام، میتواند در سیر بیماری در هر دو نوع گرم و سرد ذیابیطس دیده شود. لذا از لیست معیارها خارج شدند.

تحلیل داده های زیر مطالعه اول و سوم (عالیم ذیابیطس در متون و مصاحبه های بیماران) حاکی از توافق بالای این دو دسته داده است. شاخص هایی که در متون مورد تأکید قرار گرفته در مصاحبه ها هم بیشتر تکرار شده است. حتی در خصوص عالیم مزاج عام که بطور کلی ذکر شده، عالیم مبتلا به بیماران نظیر تضرر و انتفاع از گرما و سرما یا گرمی و... بطور جداگانه اشاره شده است. بجز بعضی عالیم نظیر احساس حرارت در مجرای بول هنگام ادرار کردن، که ما در مصاحبه ها نداشتیم و مورد توجه بیماران نبوده یا سن کودکان در مطالعه ما طوری نبوده که این احساس را بیان کنند، یا اینکه در متون بیشتر جنبه نظری داشته است. رنگ زرد ادرار یا سوزش ادرار

## علی منظری: طراحی پژوهش، تحلیل اماری داده‌ها تشکر و قدردانی

این مقاله نتیجه پایان نامه مقطع PhD بوده و با حمایت دانشگاه علوم پزشکی شهریرد بهشتی انجام شده است. به این وسیله مراتب سپاسگزاری خود را از همه متخصصان محترم طب سنتی و کودکان دیابتی و خانواده‌های ایشان، که با سعه‌ی صدروحواله‌ی فراوان ما را در اجرای این پژوهش یاری نمودند اعلام مینماییم.

## سیم نویسنده‌ان

مرتضی مجاهدی: استاد راهنمای همکاری در طراحی پژوهش،  
جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها  
مجید اصغری: همکاری در جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل محتوای  
داده‌ها  
زهراء آقانوری: جمع‌آوری داده‌ها و نگارش مقاله  
رضاء‌الخانی: استاد راهنمای همکاری در جمع‌آوری داده‌ها  
عباس عبادی: مشاور اماری و همکاری در نگارش مقاله

## منابع

1. Group SfDiYS. The burden of diabetes mellitus among US youth: prevalence estimates from the SEARCH for Diabetes in Youth Study. Pediatrics 2006;118:1510-8
2. Fagot-Campagna A, Pettitt DJ, Engelgau MM, Burrows NR, Geiss LS, Valdez R, et al. Type 2 diabetes among North adolescents: An epidemiologic health perspective. The Journal of pediatrics 2000;136:664-72
3. Lipton RB, Drum M, Burnet D, Rich B, Cooper A, Baumann E, et al. Obesity at the onset of diabetes in an ethnically diverse population of children: what does it mean for epidemiologists and clinicians? Pediatrics 2005;115: 553-60
4. Duncan GE. Prevalence of diabetes and impaired fasting glucose levels among US adolescents: National Health and Nutrition Examination Survey, 1999-2002 . Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 2006;160:523-8
5. Kappy MS, Geffner ME. Principles and practice of pediatric endocrinology. 1<sup>st</sup> Edition, eBook Charles C Thomas Publicaltion Ltd: Uk, 2005
6. Legault L, Polychronakos C. Annual incidence of type 1 diabetes in Quebec between 1989-2000 in children. Clinical and Investigative Medicine 2006;29:10
7. Quinn M, Fleischman A, Rosner B, Nigrin DJ, Wolfsdorf JI. Characteristics at diagnosis of type 1 diabetes in children younger than 6 years. The Journal of Pediatrics 2006;148 :366-371
8. Asghari M, Sabet Z, Davati A, Kamalinejad M, Soltaninejad H, Naseri M. Investigation and comparison of Zia bites disease, in Iranian traditional medicine and Diabetes disease, in classical medicine. Medical History Journal 2012; 3: 11-37
9. Zeinalian M, Eshaghi M, Naji H, Marandi SM, Sharbafchi MR, Asgary S. Iranian-Islamic traditional medicine: An ancient comprehensive personalized medicine. Advanced Biomedical Research 2015;4:191
10. Mojahedi M, Naseri M, Majdzadeh R, Keshavarz M, Ebadini M, Nazem E, et al. Reliability and validity assessment of Mizaj questionnaire: a novel self-report scale in Iranian traditional medicine. Iranian Red Crescent Medical Journal 2014; 16: 15924
11. Mojahedi M MS, Isfahani MM, Naseri M, Kamalinejad M ,Khodadoust M, et al . . Research Priorities in Traditional Persian Medicine. Journal of Research on History of Medicine 2016;5:3
12. Naseri M, Rezaeiazdeh H, Taheripanah T, Naseri V. Temperament theory in the iranian traditional medicine and variation in therapeutic responsiveness, based on pharmacogenetics. Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 2010;1:237-42
13. Nazamuddin M, Wadud A, Ansari AH, Alam T, Perveen A, Iqbal N. Concept of Diabetes in Unani System of Medicine: An Overview .Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences 2014;22:117-22
14. Shojaei A, Dabaghian FH, Goushegir A, Fard MA. Antidiabetic plants of Iran. Acta Medica Iranica 2011;49:637-42
15. Zarshenas MM, Khademian S, Moein M. Diabetes and related remedies in medieval Persian medicine. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism 2014;18:142-9
16. Ismail Jorjani. Al Aghraz Al Tibb Va Al Mabahes Al Alaieah [ Goals of medicin valuable disscausions]. Tehran University: Tehran, 2006: 746-8. [In Persian]
17. Arzani A. Teb-e-Akbari. Jalal al Din: Qom, 1999:826-840 [In Persian]

- 18.** Akhaveyni A. Hediyatol-motoallemin fi Al-teb[(The Principal's of Traditional Iranian Medicine)]. Mashhad University: Mashhad, 1992 [In Persian]
- 19.** Aghili Khorasani shirazi MH. Kholassat Al-Hekmah [(The Principal's of Traditional Iranian Medicine)]. In: Nazem E, editor. Esmaeilian: Qom, 2006:53 [In Persian]
- 20.** Ibn Sina(Avicenna) H. Al-qanun Fi'l-Tibb [Contains of medicine], Dar al Kotob al Elmiyah: Lebanon, 1999: 397-9 [in Arabic]
- 21.** Najiboddin Ali Samarghandi NA. Sharhe Asbaab o Alaamaat of Samarghandi [Explanation of medical signs by Samarghandi]. Jalal al Din: Qom, 2008: 142-4 [in Arabic]
- 22.** Azamkhan M. Exir Azam. Institut of Medical History and complementrry medicine of Iran university of Medical sciences: Tehran, 2008: 446 [In Persian]
- 23.** Mohammad Zakariyya Razi, Al Hawi Fi Al Tibb. [Contains of medicine].Dar al Kotob al Elmiyah: Lebanon 2000: 331-344. [in Arabic]
- 24.** Ahwazi A. Kamel- alsenaat- altebbiah. Jalal al Din: Qom, 2008: 147 [in Arabic]
- 25.** Majid Asghari, Zari Sabet, Ali Davati, Mohammad Kamalinejad. Diabetes explanation from the perspective of Iranian traditional medicine and evaluation the effect of Ziabites capsule consumption on blood glucose control, in patients with type 2 diabetes. (Theses) Tehran: Shahed University, Medical college; 2013 [In Persian]
- 26.** M. M. Explanation of diabetes in Iranian Traditional Medecine and modern medecine and designing type 2 diabetes diet on basis of Iranian Traditional Medecine.(Theses) Tehran University of Medical Sciece, 2015 [In Persian]
- 27.** Hsu C-C, Sandford BA. Delphi technique. Encyclopedia of Research Design 2010:344-7
- 28.** De Villiers MR, De Villiers PJ, Kent AP. The Delphi Technique in Health Sciences Education Research. Medical Teacher 2005;27:639-43
- 29.** Fink A, Kosecoff J, Chassin M, Brook RH. Consensus methods: characteristics and guidelines for use. American journal of public health 1984;74:979-83
- 30.** Ahmadi F, Nasiriyani K, Abazari P. The Delphi technique, a tool for research. Iranian Journal of Ejoucation in Medical Sciences 1999;2: 175-185 [In Persian]
- 31.** Powell C. The Delphi technique: myths and realities. Journal of Advanced Nursing 2003;41:376-82
- 32.** Landeta J. Current validity of the Delphi method in social sciences. Technological Forecasting and Social Change 2006;73:467-82
- 33.** Koo TK, Li MY. A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation Coefficients for Reliability Research. Journal of Chiropractic Medicine 2016;15:155-63

## چک لیست تعیین مزاج کودکان دیابتی، قبل از شروع درمان با انسولین

پژوهش محترم، لطفاً با در نظر گرفتن بیمار در مقایسه با همسالان هم جنس او، جدول ذیل را برای بیمار تکمیل نمایید.

نام و نام خانوادگی: ..... تاریخ مراجعه: ..... تاریخ تولد: ..... جنسیت: ..... زمان شروع علائم: .....

تاریخ تشخیص بیماری: ..... آدرس و تلفن تماس: ..... نام و دوز داروی مصرفی: ..... آدرس و تلفن تماس: .....

ردیف	عنوان معیار	به نفع ذیابیطس گرم	امتیاز	معتدل	امتیاز	به نفع ذیابیطس سرد	امتیاز
۱	ملمس گرده	گرم (+۲)	معمولی (۰)			سرد (-۲)	
۲	ملمس کل بدن	گرم (+۲)	معمولی (۰)			سرد (-۲)	
۳	تأثیرپذیری از هوا	انتفاع از سرما/ تضرر از گرما (+۲)	تأثیرپذیری از هوا/ سرد و گرم ندارد یا از هر دو به یک اندازه نفع و ضرر دارد. (۰)			انتفاع از گرما / تضرر از سرما (-۲)	انتفاع از گرما / تضرر از سرما (-۲)
۴	تأثیرپذیری از غذا	انتفاع از غذای سرد/ تضرر از غذای گرم (+۲)	تأثیرپذیری از غذای سرد و گرم ندارد یا از هر دو به یک اندازه نفع و ضرر دارد. (۰)			انتفاع از غذای سرد/ تضرر از غذا (-۲)	انتفاع از غذای سرد/ تضرر از غذا (-۲)
۵	عطش شدید	سیرابی ندارد (+۱)	غیر شدید	ندارد (۰)		سیرابی دارد (-۱)	
		از شدت عطش بیقرار نمیشود (+۱)				از شدت عطش بیقرار نمیشود (-۱)	
		میل به آب سرد دارد (+۱)				میل به آب سرد ندارد. (-۱)	
۶	تهیج (بیف دور چشم)	ندارد (۰)		ندارد (۰)		دارد (-۲)	کم رنگ (-۱)
۷	رنگ ادرار	پر رنگ (+۱)					بدون بو (-۱)
۸	بوی ادرار	بود تنده یا بد بو (+۱)					سفید یا تیره (-۱)
۹	رنگ رخسار	سرخ یا زرد (+۱)					عدم سرخی یا زردی (۰)
۱۰	رنگ چشم	سرخ یا زرد (+۱)					ندارد (۰)
۱۱	سوژش ادرار	+۱					-۱۶
	جمع	+۱۶		(۰)			

## توضیح جهت کاربران محترم چک لیست:

معیارهای ۱ تا ۶ (که بیش از یک امتیاز دارند) معیارهای اصلی و معیارهای ۷ تا ۱۱ (که یک امتیاز دارند) معیارهای فرعی هستند.

پس از امتیاز دادن به هر معیار، در نهایت جمع جبری امتیازهای کسب شده محاسبه میشود. در صورتی که جمع جبری مثبت باشد تشخیص ذیابیطس گرم و اگر منفی باشد تشخیص ذیابیطس سرد گذاشته میشود.

این پرسشنامه در مواردی که بیش از ۲ معیار در یک فرد از جهت گرمی و سردی ناهمسو باشد، فقط در صورتی معتبر است که قدر مطلق جمع امتیازات حاصله بیش از ۵ باشد.

در مواردیکه اکثر علائم بیمار، از نظر سردی و گرمی معتدل باشند با وجود حداقل ۱ معیار اصلی یا ۲ معیار فرعی تشخیص ذیابیطس (گرم یا سرد) گذاشته میشود.

اگر کودک هیچ علامتی به نفع سردی یا گرمی نداشته باشد و جمع جبری امتیازهای کسب شده صفر باشد، به نفع ذیابیطس سرد میباشد.