

بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مربوط با آن در سالمندان مقیم در خانه‌های سالمندی

محمد رضا اسماعیلی فخار^{*}، سلیمان زند^۱

۱. گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

فصلنامه پایش

سال دوازدهم شماره دوم فروردین - اردیبهشت ۱۳۹۲ صص ۱۴۳-۱۴۹

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۰/۸/۲

[نشر الکترونیک پیش از انتشار- ۷ اسفند ۹۱]

چکیده

یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و تغذیه سالمندان مقیم در خانه‌های سالمندی، دوری از کانون خانواده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی وضعیت تغذیه سالمندان مقیم در خانه‌های سالمندی و ارتباط آن با برخی بیماری‌های مزمن صورت گرفته است. در این مطالعه مقطعی تعداد ۱۶۹ نفر سالمند ۶۰ ساله و بالاتر با روش سرشماری از سالمندان مقیم در خانه‌های سالمندی استان مرکزی انتخاب و وارد پژوهش شدند. با استفاده از اندازه‌گیری نمایه‌های تن سنجی، پرسشنامه Mini Nutritional Assessment- MNA وضعیت تغذیه مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت امتیاز کلی وضعیت تغذیه محاسبه و ارتباط آن با برخی عوامل زمینه‌ای موجود در سالمندان با استفاده از آزمون کای اسکوئر و تحلیل رگرسیون لجستیک و از طریق نرم افزار spss14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از کل نمونه‌های مورد بررسی ۱۹/۶ درصد مبتلا به سوء تغذیه، ۵۳/۳ درصد در خطر سوء تغذیه و تنها ۲۷/۱ درصد آنان از وضعیت تغذیه خوب برخوردار بودند. همچنین ۷۷/۲ درصد از مبتلایان به سوء تغذیه دارای ۱ تا ۳ بیماری مزمن جسمی یا محدود کننده بودند. نتایج نشان داد که بین تعداد اختلالات زمینه‌ای با وضعیت تغذیه سالمندان ارتباط معنی دار وجود داشت ($P<0.001$). ضرورت توجه بیشتر مسئولین خانه‌های سالمندی به نیازهای تغذیه‌ای سالمندان و آموزش‌های همگانی ترویج فرهنگ نگهداری از سالمندان در کانون خانواده از موارد بسیار مهم و اساسی است.

کلیدواژه: سالمندی، تغذیه، خانه‌های سالمندی، بیماری‌های مزمن، سوء تغذیه

*نویسنده پاسخگو: اراک، دانشگاه علوم پزشکی اراک، مجتمع پردیس
تلفن: ۰۳۵۷۳۴۱۷۳۵۰۳

E-mail: slmnzand@araku.ac.ir

مقدمه

این مطالعه از نوع توصیفی - مقطوعی است که جهت جمع‌آوری داده‌های آن از مصاحبه، مشاهده، معاینه و تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) که در خانه‌های سالمندان استان مرکزی (۴ مرکز) مقیم و قادر به مصاحبه و معاینه بودند. نمونه‌گیری به روش سرشماری انجام گرفت که از مجموع ۲۱۷ سالمند مقیم، تعداد ۱۹۹ نفر که شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. میزان مصرف مواد غذایی و کالری دریافتی بر اساس برنامه غذایی هفتگی خانه‌های سالمندان تهیه و با استفاده از نرم افزار FPII ارزیابی و میزان کالری و پروتئین اختصاص داده شده به هر سالمند براساس recommended dietary allowance-RDA تعیین گردید. همچنین جهت تعیین وضعیت تغذیه از پرسشنامه MNA استفاده شد، که جهت ارزیابی وضعیت تغذیه سالمندان مورد استفاده و تأیید گردیده است و در ایران نیز به زبان فارسی ترجمه و پس از استانداردسازی در جمعیت ایرانی مناسب تشخیص داده شده است [۱۳، ۱۴]. MNA یک پرسشنامه ۱۸ گویه‌ای شامل اندازه‌گیری‌های تن‌سنجدی (BMI)، شامل اندازه‌گیری دور بازو، دور ماهیچه ساق پا و میزان کاهش وزن، دریافت رژیمی (شامل تعداد و عده‌های غذایی، دریافت مایعات و میزان اشتها، ارزیابی شیوه زندگی، داروهای مصرفی، تحرك و ارزیابی شخصی (نظر شخصی در مورد وضعیت تغذیه و سلامتی) با حدکثر امتیاز ۳۰ است که براساس آن افراد را از نظر وضعیت غذایی با تغذیه مناسب (امتیاز ۲۴ و بالاتر)، در خطر سوء تغذیه (امتیاز ۵/۲۳-۲۳) و مبتلا به سوء تغذیه (امتیاز کمتر از ۱۷) ردبندی می‌کنند. در این مطالعه علاوه بر وضعیت تغذیه برخی عوامل مساعد کننده سوء تغذیه نیز مورد بررسی قرار گرفتند؛ بدین منظور به منظور بررسی سطح شناختی و احدهای مورد پژوهش از پرسشنامه Mini Mental Status Examination-MMSE استفاده شد. در پرسشنامه مزبور سوالات بر اساس نمره ۳۰-۱ تقسیم شده است. بدین ترتیب که افراد با نمره کمتر از ۲۰ با تحریب شناختی قطعی مطابق پرسشنامه استاندارد شده در نظر گرفته می‌شوند. همچنین در این مطالعه بررسی برخی دیگر از عوامل مساعد کننده کالری اختصاص داده شده به افراد مورد مطالعه در شبانه روز، بیماری‌های مزمن، اختلالات حرکتی، اختلالات گوارشی، وضعیت دندانها و میزان ملاقات با نزدیکان با استفاده از پرونده پزشکی و مصاحبه اخذ گردید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که جمعیت ایران همانند دیگر کشورهای جهان در حال پیشدن است. در حال حاضر جمعیت بالای ۶۰ سال در ایران در حدود ۸ درصد جمعیت و به عبارتی در حدود ۵/۵ میلیون نفر هستند که با ادامه این روند در حوالی سال ۱۴۱۰ انفجار سالمندی در ایران رخ خواهد داد و بین ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت در سنین بالای ۵۰ سالگی قرار خواهد گرفت [۱]. بر این اساس است که امروزه نیاز بیشتری در فراهم‌نمودن مراقبت‌های بهداشتی و آمادگی جهت مراقبت از سالمندان احساس می‌گردد [۲، ۳] و حمایت از سالمندان جهت سالم زیستن و برخورداری از زندگی مناسب از بزرگترین چالشهای بخش سلامت در تمامی دنیا است [۴]. از طرفی تأمین سلامت سالمندان بستگی به این نکته دارد که تا چه حد بتوانیم محدودیت‌های عملکردی، بیماری‌های مزمن و سوء تغذیه را در آنان پیشگیری کنیم [۵]. نامطلوب بودن وضعیت تغذیه سالمندان، زمینه را برای بروز بسیاری از بیماری‌ها از جمله استئوآرتیت، دیابت، بیماری‌های قلب و عروق و افزایش فشار خون مساعد نموده و هزینه‌های هنگفتی را بر دولتها تحمیل و مشکلات بسیاری را در عرصه‌های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی بوجود می‌آورد که مقابله با آن نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق خواهد بود [۶]. داشتن سالمندان، تغذیه مناسب را یکی از شاخص‌های سلامتی و سوء تغذیه را مانع برای دستابی به هدف اصلی یعنی بالابردن کیفیت زندگی در جوامع بشری می‌داند. در چندین مطالعه ارتباط بین سوء تغذیه و افزایش خطر بروز بیماری و مرگ ناشی از عوارض آن به اثبات رسیده است [۷-۹]. شیوع سوء تغذیه از ۴ درصد در سالمندان جامعه تا ۵۰ درصد در سالمندان بستری و مقیم در خانه‌های سالمندان گزارش شده است [۱۰] و حتی در برخی مطالعات میزان سوء تغذیه پروتئین - ارزی سالمندانی که در خانه سالمندان از آنان نگهداری می‌شود را تا ۸۵ درصد نیز گزارش شده نموده‌اند [۱۱، ۱۲]. بررسی وضعیت تغذیه در سالمندان مقیم در خانه‌های سالمندان به منظور شناسایی مشکلات عمومی و عوامل زمینه‌ساز سوء تغذیه در آنها می‌تواند شناخت جامعه نسبت به سالمندی و عوامل تهدیدکننده در این دوران تغییر و افزایش دهد. لذا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مقیم در خانه‌های سالمندی استان مرکزی طراحی شده است تا این طریق امکان کشف و برطرف نمودن موارد سوء تغذیه از طریق آموزش و مداخلات لازم، صورت گیرد.

معنی دار وجود داشت. بطوریکه شناس ابتلا به سوء تغذیه در افرادی که مبتلا به بیماری مزمن بودند ۳/۶۴ برابر افرادی بود که مبتلا به بیماری مزمن نبودند ($P<0.003$). شناس ابتلا به سوء تغذیه در سالمدان مبتلا به اختلال شناختی ۲/۳۲ برابر بیشتر از سالمدانی است که مبتلا به اختلال شناختی نمی باشند ($P<0.038$). شناس ابتلا به سوء تغذیه در سالمدان با اختلال حرکتی ۶/۷ برابر بیشتر از سالمدانی است که اختلال حرکتی نداشتند ($P<0.002$). همچنین شناس ابتلا به سوء تغذیه در سالمدان که دندان خراب دارند ۱/۷۵ برابر ($P<0.047$), دندان خراب و ناقص دارند ۲ برابر ($P<0.033$), دندان مضمونی دارند و بدون دندان بودند ۳/۴۲ برابر بیشتر از سالمدانی بود که دندان سالم داشتند. اما این روابط در هیچ موردي معنادار نبود (جدول شماره ۳).

جدول ۱: توزیع فراوانی مطلق و نسبی وضعیت تغذیه ای سالمدان بر مبنای MNA به تفکیک مراکز نگهداری سالمدان در استان مرکزی

نادرد	سوء تغذیه		در معرض خطر	سوء تغذیه	دارد*	تعداد نمونه
	تعداد	درصد				
۴(۱۰/۳)	۲۴(۶/۱)	۱۱(۲۸/۴)	۳۹	اراک		
۲۰(۳۲/۸)	۲۹(۴۷/۵)	۱۲(۱۹/۷)	۶۱	تفوش		
۹(۲۳/۷)	۲۳(۶۰/۵)	۶(۱۵/۸)	۳۸	ابراهيم آباد		
۲۱(۳۴/۴)	۳۰(۴۹/۲)	۱۰(۱۶/۴)	۶۱	دلیجان		
۵۴(۲۷/۱)	۱۰۶(۵۳/۳)	۴۹(۱۹/۶)	۱۹۹	جمع		

*آزمون آنالیز رگرسیون لجستیک ارتباط معنی دار آماری بین وضعیت تغذیه ای واحدهای مورد پژوهش با مراکز مورد پژوهش نشان داد ($P=0.128$). جهت استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک سطوح در معرض خطر سوء تغذیه و سوء تغذیه با همدیگر ادغام و به صورت دو سطحی (سوء تغذیه دارد و ندارد) تعریف شده است.

جدول ۲: توزیع فراوانی عوامل مورد بررسی در سالمدان ساکن در آسایشگاههای استان مرکزی

P	سوء تغذیه		در معرض خطر	سوء تغذیه	دارد*	تعداد کل
	نادرد	درصد				
.۰۰۰۱*	۲۰(۱/۵)	۲۵(۱۲/۶)	۱۶(۸)	۴۴	اختلال حرکتی	
.۰۰۱*	۲۰(۳۲/۸)	۲۹(۴۷/۵)	۱۲(۱۹/۷)	۵۵	اختلال شناختی	
.۰۰۱۶*	۷(۳/۵)	۳۲(۱۶/۱)	۱۹(۹/۵)	۵۸	بیماری مزمن	
.۰۲۲۳	۲(۱)	۱۲(۶)	۵(۲/۵)	۱۹	اختلال گوارشی	
.۰۰۰۱*	۹(۷/۲۳)	۲۳(۶۰/۵)	۶(۱۵/۸)	۱۳	بی اشتیاهی	
.۰۰۱**					وضعیت دندانها	
	۴(۲)	۵(۲/۵)	۰(۰)	۹(۴/۵)	سالم	
	۱۶(۸)	۳۱(۱۵/۶)	۴(۲)	۵۱(۲۵/۶)	خراب	
	۲۲(۱۱/۱)	۳۹(۱۹/۶)	۷(۸)	۷۷(۳۸/۷)	خراب و ناقص	
	۵(۲/۵)	۱۴(۷)	۶(۳)	۲۵(۱۲/۶)	دندان مضمونی	
	۷(۳/۵)	۱۷(۸/۵)	۳۱(۶/۵)	۳۷(۱۸/۶)	بدون دندان	
					ملاقات بازدیدیکان	
	۴(۲)	۲(۱)	۱(۰/۵)	۱(۰/۵)	هفته ای یک بار	
	۱۱(۵/۵)	۰(۰)	۱۰(۵)	۱۰(۰/۵)	۱۵ روز بیکار	
	۳۳(۱۶/۶)	۱۰(۵)	۱۷(۸/۵)	۶(۳)	هر ماه بیکار	
	۹۴(۳۲/۲)	۱۰(۵)	۴۳(۱۷/۶)	۱۹(۹/۵)	هر سه ماه بیکار	
	۸۷(۴۳/۷)	۱۷(۸/۵)	۴۳(۲۱/۶)	۲۷(۱۳/۶)	بدون ملاقات	

* p-value حاصل از آزمون chi-squar ارتباط معنی دار آماری بین وضعیت تغذیه ای واحدهای مورد پژوهش با عوامل مورد پژوهش نشان داد. مقدار احتمالی بیانگر اختلاف نسبت ها است.

** مقدار احتمالی بیانگر جدول توافقی حاصل می باشد.

پس از اخذ نتایج و تحلیل داده ها، وضعیت تغذیه هر یک از نمونه ها با استفاده از معیار MNA تعیین و ارتباط آن با عوامل مساعد کننده مورد بررسی قرار گرفت. سپس اطلاعات جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق برنامه آماری sspss 14 و با استفاده از آمار توصیفی مانند شاخص های عددی جهت محاسبه و تعیین سطح وضعیت تغذیه و افسردگی، آزمون آماری کای اسکوئر و تحلیل رگرسیون لجستیک جهت بررسی ارتباط بین سوء تغذیه و عوامل مساعد کننده انجام شد.

یافته ها

از مجموع ۱۹۹ نمونه مورد بررسی در ۴ مرکز نگهداری سالمدان در استان مرکزی ۳۰/۷ درصد مذکور و ۶۹/۳ درصد مؤثت بوده، میانگین سنی نمونه ها ۶۹ سال با SD=۱۴/۵۳ براورد گردید. در هر چهار مرکز نگهداری سالمدان، سه وعده غذای اصلی و دو میان وعده برای سالمدان در نظر گرفته شده بود، که کالری تأمین شده از این پنج وعده غذایی بر اساس RDA و با استفاده از نرم افزار FPII در حد مطلوب بوده است. استفاده از مقیاس بررسی وضعیت تغذیه (MNA) نشان داد که ۱۹/۶ درصد از سالمدان دچار سوء تغذیه، ۵۳/۳ درصد در خطر سوء تغذیه و ۲۷/۱ درصد اختلال سوء تغذیه نداشتند. استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر نشان داد که توزیع وضعیت های مختلف در مراکز مورد بررسی همگن بوده و تفاوت آماری معنی دار در وضعیت تغذیه نمونه ها در مراکز مورد بررسی وجود ندارد (P=۰/۱۳۸) (جدول شماره ۱). نتایج حاصل از مصاحبه و بررسی پرونده سلامت سالمدان نشان داد که ۲۱/۱ درصد از نمونه ها به اختلال گوارشی، بی اشتیاهی، اختلال حرکتی، اختلال شناختی، بیماری های مزمن مبتلا نبوده و ۲۸/۱ درصد نیز اختلال افسردگی نداشتند (جدول شماره ۲). همچنین ۲۸/۱ درصد دارای یک اختلال، ۲۶/۶ درصد دارای ۲ اختلال، ۳ درصد دارای ۳ اختلال دارای ۴ اختلال، ۵ درصد دارای ۵ اختلال و ۱ درصد نیز دارای هر ۶ اختلال فوق بوده اند. آزمون افسردگی GDS نشان داد که ۲۲/۶ درصد از سالمدان مبتلا به افسردگی بوده، ۴۴/۲ درصد در خطر افسردگی قرار داشته و ۵ درصد نیز بدليل اختلال در سطح شناختی قادر به پاسخگویی جهت ارزیابی افسردگی نبودند. نتایج استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک جهت بررسی ارتباط وضعیت تغذیه با متغیرهای از قبیل بیماری مزمن، اختلال شناختی، اختلالات حرکتی و وضعیت دندانها نشان داد که بین بیماری های مزمن و تغذیه ارتباط

ناتوانی حرکتی و جنس وجود دارد، بگونه‌ای که ناتوانی شدید و متوسط در زنان به مراتب بیشتر از مردان بوده و در صد ناتوانی شدید در زنان $4/5$ برابر و ناتوانی متوسط $3/5$ برابر مردان بوده است [۲۱]. مطالعات انجام گرفته در دیگر کشورها نیز نشان داده‌اند که مشکلات جسمی که منجر به تقاضای درمان و کاهش کیفیت زندگی می‌شوند، در زنان بارزتر است [۲۲، ۲۳]. این امر می‌تواند به بیشتر بودن بیماری‌های مزمن ناتوان‌کننده در زنان سالمند [۲۴]، تفاوت‌های فیزیولوژیک و آندوکرین آنها با مردان [۲۵] یا سبک زندگی و کم تحرکی بیشتر در زنان جامعه ما ارتباط داشته باشد [۲۱]. نتایج فوق و این واقعیت که با افزایش شدت ناتوانی‌های حرکتی احتمال انتقال سالمندان به خانه‌های سالمندی و مراکز نگهداری افزایش می‌یابد [۲۶] می‌تواند توجیه کننده زیاد بودن نسبت ناتوانی زنان نسبت به مردان مقیم در خانه‌های سالمندی باشد. با افزایش سن شیوع ابتلا به بیماری‌های مزمن جسمی و روحی افزایش می‌یابد [۲۷] بطوری که در مطالعه انجام شده در بابل ۸۳ درصد از افراد سالمند مورد مطالعه دارای حداقل یک بیماری مزمن بودند [۲۸]. همچنین در بررسی انجام گرفته در کره جنوبی نیز $46/8$ درصد از سالمندان دارای بیش از ۲ بیماری مزمن بطور همزمان بودند [۲۹]. مصرف داروهای متعدد، بی‌اشتهايی روانی ناشی از ناتوانی ابتلا به بیماری‌های مزمن، تغییرات متابولیک ناشی از بیماری‌های مزمن که موجب افزایش دفع ازت می‌گردد زمینه‌های لازم را برای سوء تغذیه فراهم می‌نماید [۳۰، ۳۱]. نتایج ما نیز نشان داد که بین بیماری‌های مزمن و تغذیه ارتباط معنی دار وجود دارد ($P=0/003$) بطوریکه شناس ابتلا به سوء تغذیه در افرادی که مبتلا به بیماری مزمن هستند $3/64$ برابر افرادی است که مبتلا به بیماری مزمن نیستند. دوری از خانواده می‌تواند زمینه لازم را برای بیماری‌های جسمی و روحی فراهم می‌نماید بطوری که روزنبرگ و همکاران طی مطالعه‌ای به این نتیجه دست یافتند که افراد متأهل نسبت به افراد بیو و سالمندانی که با خانواده خود زندگی می‌کنند نسبت به سالمندانی که به تنها‌ی زندگی می‌کنند کمتر به پژوهش مراجعه نموده و یا در بیمارستان بستری می‌شوند که این یافته بیانگر تأثیر مثبت ارتباط اعضاء خانواده در کیفیت زندگی است [۳۲]. نتایج ما نشان داد که تنها ۲ درصد از سالمندان مورد بررسی هفت‌های یکبار با نزدیکان خود ملاقات داشته و تقریباً نیمی از آنان حتی ۶ ماه یکبار نیز ملاقاتی نداشته‌اند. صادقی در گزارش نتایج خود می‌نویسد: ۱۹ درصد از سالمندان مقیم در خانه‌های

جدول ۳: بررسی عوامل موثر بر سوء تغذیه با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در سالمندان ساکن آسایشگاههای استان مرکزی

P	OR	مقدار انحراف معیار	ضریب رگرسیون لجستیک (B)	بیماری مزمن
.۰/۰۰۳*	۳/۶۴	.۰/۶۲	-۱/۶۰۱	اختلال شناختی
.۰/۰۳۸*	۲/۲۲	.۰/۲۹	۱/۷۰۸	اختلال حرکتی
.۰/۰۰۲*	۶/۷	.۰/۵۷۰	۲/۹۸۴	دندان خراب
.۰/۴۴۷	۱/۷۵	.۰/۷۲	-۱/۱۹۹	دندان خراب و ناقص
.۰/۳۳۲	۲	.۰/۶۳	۲۱/۴۹۷	دندان مصنوعی
.۰/۱۶۴	۳/۲	.۱/۰۱	۲/۹۳۲	بدون دندان
.۰/۱۱۹	۲/۴۲	.۱/۰۹	-۱/۱۹۸	آزمون آنالیز رگرسیون لجستیک ارتباط معنی دار آماری بین سوء تغذیه با متغیرهای مورد پژوهش نشان داد.

*آزمون آنالیز رگرسیون لجستیک ارتباط معنی دار آماری بین سوء تغذیه با متغیرهای مورد پژوهش نشان داد.

بحث و نتیجه گیری

مهمترین یافته این مطالعه، بالایودن شیوع اختلال تغذیه در سالمندان مقیم در خانه‌های سالمندی استان مرکزی بود که با مطالعات انجام شده در ایران تا حدودی همخوانی دارد، بطوری که مطالعه مشابه در خانه‌های سالمندی تهران و شمیرانات نیز مشخص نمود که ۱۲/۸ درصد از سالمندان این مراکز مبتلا به سوء تغذیه و ۵۶/۲ درصد در خطر سوء تغذیه بوده‌اند [۱۰]. نتایج فوق نشان می‌دهد که میزان شیوع سوء تغذیه در سالمندان مقیم خانه‌های سالمندی بیش از سالمندانی است که در کنار خانواده‌های خود زندگی می‌کنند، بطوری که نجاتی در مطالعه خود در سالمندان استان قم مشخص نمود که تنها ۶/۶ درصد از سالمندان مبتلا به سوء تغذیه و ۵۷/۶ درصد نیز در خطر سوء تغذیه قرار داشته اند [۱۶]. مطالعات مشابه خارجی نیز بیانگر آنست که در منازل شخصی خود زندگی در آسایشگاهها نسبت به سالمندانی که در منازل شخصی خود زندگی می‌کنند، از نظر اختلالات تغذیه آسیب‌پذیرتر هستند [۲۰-۲۱]. در نتیجه با توجه به مناسب بودن کالری دریافتی در جیره غذایی واحد های مورد پژوهش (۲۰۰۰ تا ۲۱۵۰ کالری روزانه) به نظر می‌رسد علت بالا بودن شیوع سوء تغذیه در خانه‌های سالمندی را باید در عواملی دیگری جستجو نمود. با ورود به دوره سالمندی میزان ناتوانی‌ها بتدریج افزایش می‌یابد، بطوریکه میزان شیوع محدودیت‌های حرکتی در ۷۶ سالگی و بالاتر حتی به ۵۰ درصد نیز میرسد. این محدودیت‌ها به نوبه خود سبب وابستگی افراد سالمند می‌گردد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که نسبت افراد وابسته در میان سالمندان ۳ برابر بزرگ‌سالان است. نتایج ما نشان داد که ۲۲/۱ درصد از سالمندان مورد بررسی دارای مشکلات و محدودیت‌های حرکتی بوده و شناس ابتلاء در زنان $۳/۴$ بیشتر از مردان است. ادیب نیز در تحقیق خود در جامعه کاشان نشان داد که ارتباط واضحی بین

سهم نویسنده‌گان

حمدیرضا ابراهیمی فخار؛ طراحی و مدیریت مطالعه
سلیمان زند؛ تحلیل آماری و نگارش و بازنویسی مقاله

تشکر و قدردانی

این پژوهش بخشی از طرح تحقیقاتی است که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شده است. بدینوسیله از کلیه همکاران دانشکده پرستاری و مامایی و حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، مدیریت و پرسنل مراکز نگهداری سالمندان در استان مرکزی تشکر و قدردانی می‌شود.

سالمندی تهران هیچ ملاقاتی نداشته ولی ۴۰/۵ درصد از آنان بطور هفتگی با نزدیکان خود ملاقات داشته‌اند [۳۳]. مقایسه این دو تحقیق نشان می‌دهد که میزان ملاقات سالمندان مقیم در خانه‌های سالمندی استان مرکزی نسبت به تهران بسیار کمتر بوده و می‌تواند دلیلی بر بالا بودن میزان افسردگی در تحقیق ما باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مسئولین بهداشتی باید اهداف مراقبتی خود را بیش از پیش به تأمین نیازهای جسمی سالمندان مقیم در خانه‌های سالمندی معطوف نمایند. همچنین پیشنهاد می‌گردد تا با آموزش‌های همگانی در سطح جامعه نسبت به مشکلات سالمندانی که از خانواده‌های خود جدا می‌گردند اطلاع رسانی شده و فرهنگ نگهداری از سالمندان در محیط‌های گرم خانوادگی را تقویت نمایند.

منابع

- Heidari M, Shahbazi S. Effect of self-care training program on quality of life of elders. *Iran Journal of Nursing* 2012; 25: 1-8
- Hafez G, Bagchi K, Mahaini R. Caring for the elderly: a report on the status of care for the elderly in the Eastern Mediterranean Region. *East Mediterr Health Journal* 2000; 6:636-43
- Andrews GA. Promoting health and functioning in an aging population. *British Medical Journal* 2001; 322: 728-29
- World Health Organization. Launches new initiative to address the health needs of rapidly aging population. Is available at:<http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004>
- Malek Afzali H, Baradaran Eftekhar M, Hejazi F, Khojasteh T, Tabrizi R, Faridi T. Social mobilization for health promotion in the elderly. *Hakim Research Journal* 2007; 9:1- 6
- Amir Zadeh J, Amir Zadeh N, Salari Sh. Dietary pattern based on RDA effective factors on the elderly people in Urmia in 1383. *Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty* 2005;3: 48-40
- Ockenga J, Gastell S, Lochs H. Tumour anorexia-tumour cachexia in case of gastrointestinal tumours: standards and visions. *Gastroenterol* 2002;40:929-36
- Kyle U.G, Pirllich M, Lochs H, Schuetz T, Pichard C. Increased length of hospital stay in underweight and overweight patients at hospital admission: a controlled population study. *Clinical Nutrition* 2005;24:133-42
- Pirllich M, Lochs H. Nutrition in the elderly. *Gastroenterol* 2001;15:869-84
- Afkhami A, Keshavarz S.A, Rahimi A, Jazayeri S.A, Sadrzadeh H. Nutritional status and associated non-dietary factors in the elderly living in nursing homes of Tehran and Shemiranat, 2004. *Journal of The Iranian Institute For Health Sciences Research* 2008;3: 211-17[Persian]
- Visvanathan R. Under-nutrition in older people: a serious and growing global problem. *Journal Postgrad Medcine* 2003;49:352-60
- Seyed Reza Eshaghi, Ziba Farajzadegan, Anahita Babak. Nutritional status in Esfahan. *Salmand- Iranian Journal of Ageing* 2007;2: 340-45
- Sadrzadeh-Yeganeh H, Angoorany P, Keshavarz S.A, Rahimi A, Ahmady B. Comparison of two nutrition education techniques on breakfast-eating practice in primary school girls, Tehran. *Journal of School of Public Health And Institute of Public Health Researches* 2006;4: 65-72
- Hamid Reza Jamaati, Parisa Pajouh, Mehnoosh Nayebi, Nooshin Baghaie, Negar Baghaie, Hassan Khosravani. Ascorbic acid concentration in plasma and white blood cells of patients with bronchial asthma, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Disease. *Tanaffos* 2006; 5: 29-35[Persian]
- Malakouti S.K, Fathelahi P, Mirabzadeh A, Salavati M, Kahani Sh. Validation of geriatric depression scale(GDS-15) in Iran. *Journal of the Faculty of Medicine* 2007;30:361-68
- Nejati V. Assessing the health status of elderly people in the province of qom (2007). *Qom University of Medical Sciences Journal* 2009; 13:67-71
- Ruize- lopez D, Artacho R, Oliva P, Morenortores R. Nutritional risk in institutionalized older women

- determind by the mini nutritional assessment (MNA) test: what are the main factors? *Nutriton* 2003;19:767-71
- 18.** Griep MI, Mets IF, Collys K, ponjart I, Massart DL. Risk of malnutritional in retirement homes elderly persons measured by the mini nutritional assessment (MNA). *Journal of Gerontology of Biological & Medical Sciences* 2000;55:57-63
- 19.** Christensson L, Unsson M, Eka C. Evaluation of nutritional assessment techniques in elderly people newly admitted to municipal care. *European Journal of Clinical Nutrition* 2002; 56:810-18
- 20.** Beck AM, Schroll M, Ovenson L. A six monthsprospective follow up of over 65 years old patientsfrom general practice classified according tonutritional risk by the mini nutritional assessment (MNA). *European Journal of Clinical Nutrition* 2001; 55: 1028-33
- 21.** Adib-Hajbaghery M, Akbari H. The severity of old age disability and its related factors. *Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences* 2009; 13: 225-34
- 22.** Maftoon F, Nik Pour B, Majlesi F, Rahimi Foroushani A, Shariati B. Elderlies and medical services: demand and utilization in Tehran. *Payesh* 2002; 2: 51-5[Persian]
- 23.** Ahmadi F, Salar A, Faghizadeh S. Quality of life in Zahedan elderly population. *The Journal of Facultyof Nursing & Midwifery* 2004; 22: 61-7
- 24.** Avlund K, Holstein BE, Osler M, Damsgaard MT, Holm-Pedersen P, Rasmussen NK. Social position andhealth in old age: the relevance of different indicators of social position. *Scand Journal Public Health* 2003;31:126-36

- 25.** HulmePA, Walker SN, Effle KJ, Jorgesen L, McGowen MG, Nelson JD, Pratt EN. Health-promoting lifestyle behaviors of Spanish-Speaking Hispanic adults. *Journal of Transcultural Nursing* 2003; 14: 244-54
- 26.** AdibHajbaghery M, Masoody Alavi N. evaluating the patients with osteoporotic neck femor bonefractures in Kashan. *Feyz-Journal of Kashan University of Medical Sciences* 2007; 10: 52-8.
- 27.** Aldrich N, Benson WF. Disaster preparedness and the chronic disease needs of vulnerable older adults. *Prevention Chronic Diseases* 2008; 5: 27
- 28.** Hossini SR, Zabihi A, Savadkohi S, Bijani A. Prevlence of chronic disease in elderly population in AMIRKOLA (2006-2007). *Journal of Babol University of Medical Sciences* 2008;10:68-75
- 29.** Tootoonchi P. Chronic diseases and senile changes in the elderly population. *Payesh* 2004; 3: 219-25[Persian]
- 30.** Tajvar M. Elderly health and the review on the different aspects of life. 1st Edition, Arjmand publication: Tehran, 2003
- 31.** Harris NG. Nutrition in Aging. Krause's food nutrition and diet therapy. 11th Edition, Saunders: Philadelphia, 2004
- 32.** Rosenberg M, Everitt J. Planning for aging populations: inside or outside thewalls. *Program Planning* 2001; 56: 119-168
- 33.** Sadeghi M, Kazemi HR. Prevalence of dementia and depression among residents of elderly nursing homes in Tehran province. *Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology* 2004; 9: 55-49

ABSTRACT

Nutritional status and associated factors in elderly residents in nursing homes

Mohammad Reza Ebrahimi Fakhar¹, Soleyman Zand^{1*}

1. Instructor of Nursing Departement, School of Nursing & Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran

Payesh 2013; 12: 143-149

Accepted for publication: 24 October 2011
[EPub a head of print-25 February 2013]

Objective (s): To assess nutritional status in an elderly population living in nursing homes.

Method: This was a cross- sectional study of 199 elderly people 60 years old or above living in nursing homes in Arak, Iran. Data on nutrition was collected using the Mini Nutritional Assessment (MNA).

Results: The findings showed that 19.6% of elderly were suffering from malnutrition, 53.3% were at risk of malnutrition, and in 27.1% nutritional status was satisfactory. Of those suffering from malnutrition 77.2% reported 1 to 3 chronic diseases or physical impairments. There were significant associations between nutrition and some health conditions ($P<0.001$).

Conclusion: The findings suggest that elderly people living in nursing home should be cared for their nutritional status.

Key Words: nutrition-nursing-chronic disease-geriatric depression scale

* Corresponding author: Arak.-Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
Tel: 0861-4173524
Email: slmnzand@yahoo.com