

ترجیحات عاملان زایمان در مورد زایمان خود و نوع زایمان پیشنهادی آنان به زنان باردار

سهیلا بانی*، الهه سید رسولی^۱، طاهره شمس قریشی^۱، مرتضی قوجازاده^۱، شیرین حسن پور^۱

۱. دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فصلنامه پایش

سال یازدهم شماره پنجم مهر - آبان ۱۳۹۱ صص ۶۳۵-۶۲۹

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۹/۱۰/۲۰

انشر الکترونیک پیش از انتشار - ۲۸ خرداد ۹۱]

چکیده

زایمان یک واقعه پراسترس بوده و زنان باردار جهت سازگاری با آن نیازمند کمک افراد دیگر هستند. در بین ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، عاملان زایمان (متخصصان زنان و زایمان و ماماها) نقش ویژه‌ای در این زمینه بر عهده دارند. به نظر می‌رسد که ترجیحات این گروه‌ها در رابطه با نوع زایمان بر امر مشاوره در دوران بارداری جهت انتخاب نوع زایمان زنان باردار تأثیرگذار باشند. هدف از این مطالعه تعیین نوع زایمان ترجیحی متخصصان زایمان برای خود و نوع زایمان پیشنهادی آنان به زنان باردار بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که در سال ۱۳۸۸ انجام شد. در این پژوهش که در آن ۱۵۳ نفر ماما و ۹۰ نفر متخصص زنان و زایمان بنا به تمایل شخصی شرکت کردند، نتایج تحقیق نشان داد که سزارین، زایمان ترجیحی ۶۲/۲ درصد متخصصان زنان و زایمان و ۵۷/۶ درصد ماماها برای خود و زایمان پیشنهادی ۳۳/۷ درصد متخصصان زنان و زایمان و ۱۷/۶ درصد ماماها به زنان باردار نخست‌زا بود. همچنین ارتباط آماری معنی‌داری بین نوع زایمان ترجیحی متخصصان زایمان برای خود و زایمان پیشنهادی آنان به زنان باردار مشاهده گردید. با توجه به نقش این گروه در زمینه مشاوره در دوران بارداری، نوع زایمان عاملان زایمان نقش اساسی در انتخاب نوع زایمان زنان باردار دارد.

کلیدواژه‌ها: ترجیحات، عاملان زایمان، نوع زایمان، زایمان پیشنهادی

* نویسنده پاسخگو: نشانی: تبریز، شریعتی جنوبی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تلفن: ۰۴۱۱-۴۷۹۷۷۱۳

پست الکترونیکی: bani1343@yahoo.com

مقدمه

زایمان یکی از موهبت‌های الهی برای تولید نسل بشر بر روی زمین بوده و از بدو تولد آدم تاکنون همواره ادامه داشته است. اما با پیشرفت علم و تکنولوژی طی دهه‌های اخیر بشر به راه‌هایی دست یافت که با کمک عمل جراحی در مواردی که جان مادر یا جنین در خطر بود به کمک آنها شتافت [۱]. امروزه آمار سزارین در بیشتر کشورهای دنیا از جمله ایران بسیار بالا و در حال افزایش است [۲]. در ایران در بررسی سال ۱۳۵۵، شیوع سزارین ۱۹/۵ درصد بوده و طبق آمار و ارقام اعلام شده در سال ۱۳۸۵، این میزان به ۴۲/۳ درصد رسیده است [۱]. مطالعات اخیر سازمان بهداشت جهانی اظهار دارد که بهترین نتایج مادری و نوزادی با میزان سزارین ۱۰-۵ درصد حاصل می‌شود و به نظری‌رسد که میزان بالای ۱۵ درصد می‌تواند آسیب‌زننده باشد [۳]. رضایت بیمار در مورد تجربه زایمان به میزان زیادی به دخالت بیمار در تصمیم‌گیری در مورد نوع زایمان بستگی دارد و از آنجایی که حالات روحی هر فرد می‌تواند فیزیولوژی بدن وی را تحت تأثیر قرار دهد، نگرش مثبت مراقبین مادران باردار در امر مشاوره در دوران بارداری جهت انتخاب نوع زایمان حائز اهمیت است [۴].

ترجیح و مصلحت عاملان زایمان و همچنین مسائل فرهنگی نقش مهمی بر اولویت‌های مادری و درخواست برای سزارین ایفا می‌کند [۵-۷]. کالج آمریکایی زنان و زایمان اظهار کرده‌است که اگر عاملان زایمان عقیده داشته باشند که زایمان سزارین سلامت مادر و جنین را بیشتر از زایمان واژینال بهبود می‌بخشد اخلاقاً باید زایمان سزارین را تصدیق نمایند و اگر عقیده داشته باشند که زایمان سزارین ممکن است برای سلامت مادر و جنین زیان‌آور باشد اخلاقاً باید از این کار صرف‌نظر نمایند [۸].

براساس مطالعات حنطوش زاده و همکاران، پزشکان و عاملان زایمانی بیشتر نوع زایمانی را برای بیماران خود پیشنهاد می‌کنند که برای خود ترجیح داده و انتخاب کرده‌اند [۹].

از آنجایی که عاملان زایمان یکی از قابل‌اعتمادترین افراد از طرف خانواده‌ها برای ارائه مشاوره به منظور تعیین نوع زایمان هستند و نوع زایمان پیشنهادی آنها نقش غیرقابل‌انکاری بر زایمان ترجیحی زنان باردار دارد، بر آن شدیم تا پژوهشی در این مورد با پاسخ به سؤالات زیر انجام دهیم: ۱- ترجیحات عاملان زایمان در مورد زایمان خود چیست؟ ۲- نوع زایمان پیشنهادی عاملان زایمان به زنان باردار چیست؟ ۳- چه ارتباطی بین ترجیحات عاملان

زایمان درمورد زایمان خود و زایمان پیشنهادی آنان به زنان باردار وجود دارد؟

مواد و روش کار

این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی بود که با هدف تعیین ترجیحات عاملان زایمان در رابطه با نوع زایمان خود و نوع زایمان پیشنهادی آنان به زنان باردار صورت گرفت. بدلیل تعداد کم نمونه‌ها، جامعه مورد پژوهش در این مطالعه، شامل تمامی ماما‌های شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهرستان‌های اطراف تبریز و کلیه متخصصان زنان و زایمان زن استان آذربایجان شرقی بود. جهت نمونه‌گیری ابتدا مجوز انجام مطالعه مقدماتی از معاونت پژوهشی دانشگاه اخذ شده و آمار مربوطه از طریق معاونت درمان استان برای متخصصان زن استان آذربایجان شرقی (۱۱۰) نفر و نیز ماما‌های شاغل در شهرستان‌های این استان باستانه تبریز (که خود مستقیماً مسئول اداره بیمار در زایمان و اتاق زایمان بودند) (۱۷۰) نفر گزارش گردید. طی مطالعه ۹۰ نفر از کل متخصصان زنان و زایمان آذربایجان شرقی و ۱۵۳ نفر از کل ماما‌های شاغل در زایشگاه‌های شهرستان‌های اطراف تبریز (۱۳ شهرستان) که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند با تمایل شخصی خود در این مطالعه وارد شدند. روند جمع‌آوری داده‌ها ۶ ماه طول کشید (تیر ماه تا آذر ماه سال ۱۳۸۸). ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته شامل بخش‌های زیر بود. قسمت اول: شامل مشخصات فردی - اجتماعی شامل سن، مدت اشتغال، وضعیت تأهل. قسمت دوم: شامل تاریخچه حاملگی شامل سابقه بارداری و زایمان، نوع زایمان و در صورت داشتن سابقه سزارین انتخابی، علل انتخاب سزارین، قسمت سوم: شامل نوع زایمان ترجیحی عاملان زایمان برای خود (در صورتی که خود را در شرایطی فرض کنند که باردار نخست‌زا، دارای جنین یک قلوبی ترم با وزن تخمینی ۳۵۰۰ گرم و بدون اندیکاسیون سزارین باشند) و عللی که منجر به ترجیح سزارین برای خود شده‌است چهارم: شامل نوع زایمان پیشنهادی به زنان باردار و عللی که منجر به پیشنهاد سزارین می‌شود. برای تعیین علل ترجیحات و پیشنهادات سزارین از سوی عاملان زایمان از مقیاس نمره‌دهی لیکرت [با اهمیت‌ترین دلیل (۴)، دلیل نسبتاً با اهمیت (۳)، دلیل کم‌اهمیت (۲)، دلیل بی‌اهمیت (۱)] استفاده شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و صوری استفاده شد. برای این منظور پرسشنامه به ۱۲ نفر از اعضاء هیئت علمی دانشکده

داده‌های بدست آمده از مطالعه با استفاده از روش‌های آمار توصیفی، آزمون مجذورکای، آزمون دقیق فیشر و آزمون تی برای گروه‌های مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

یافته‌ها

ضریب پیروسون در بررسی پایایی (آزمون - بازآزمون) ۷۴ درصد محاسبه شد.

نتایج پژوهش حاضر در پاسخ به سؤال اول پژوهش نشان داد که که زایمان ترجیحی ۵۷/۶ درصد ماماها و ۶۲/۲ درصد متخصصان زنان و زایمان در صورتی که در شرایطی باشند که خود را باردار نخست‌زا، دارای جنین تک قلوئی ترم با وزن تخمین ۳/۵ کیلوگرم فرض نمایند، سزارین بود.

پرستاری و مامایی و متخصصان زنان و زایمان زن دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارسال شد و سپس نظرات اصلاحی و پیشنهادات آنها اعمال گردید. برای بررسی اعتماد علمی پرسشنامه از روش آزمون مجدد استفاده شد؛ به این ترتیب که پرسشنامه توسط ۱۰ نفر از ماماها و ۱۰ نفر از متخصصان در دو نوبت تکمیل شد. فرآیند اجرایی پژوهش به این صورت بود که پژوهشگر پس از اخذ معرفی از دانشکده با مراجعه به بخش‌های زایمانی ۱۵ بیمارستان دولتی استان آذربایجان شرقی و مطب‌های خصوصی ضمن معرفی خود و با ارائه توضیحات در مورد اهداف و نحوه تکمیل کردن پرسشنامه، اختیاری بودن شرکت در مطالعه و محرمانه بودن اطلاعات آنها، پرسشنامه را در اختیار نمونه‌ها قرار می‌داد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۱۳ استفاده شد.

جدول ۱- توزیع فراوانی و درصدی علل ترجیح سزارین انتخابی واحدهای مورد پژوهش

دلیل بی‌اهمیت	دلیل کم اهمیت	دلیل نسبتاً با اهمیت	با اهمیت ترین دلیل	علل ترجیح سزارین انتخابی
				ترس از آسیب به پرینه و واژن
۱۷(۱۹/۵)	۶(۶/۹)	۱۴(۱۶/۱)	۵۰(۵۷/۵)	ماما
۱۷(۳۰/۹)	۸(۱۴/۵)	۱۱(۲۰)	۱۹(۳۴/۵)	متخصص
				ترس از بی‌اختیاری ادرار و مدفوع
۲۲(۲۵/۳)	۵(۵/۷)	۹(۱۰/۳)	۵۱(۵۸/۶)	ماما
۲۱(۳۸/۲)	۹(۱۶/۴)	۱۰(۱۸/۲)	۱۵(۲۷/۳)	متخصص
				ترس از درد زایمان
۶(۶/۹)	۹(۱۰/۳)	۵(۵/۷)	۶۷(۷۷)	ماما
۱۲(۲۱/۸)	۸(۱۴/۵)	۹(۱۶/۴)	۲۶(۴۷/۳)	متخصص
				ترس از آسیب به نوزاد
۱۴(۱۶/۱)	۵(۵/۷)	۱۸(۲۰/۷)	۵۰(۵۷/۵)	ماما
۸(۱۴/۵)	۴(۷/۳)	۴(۷/۳)	۳۹(۷۰/۹)	متخصص
				اعتقاد به ایمن بودن سزارین
۳۵(۴۰/۲)	۹(۱۰/۳)	۱۸(۷/۲۰)	۲۵(۲۸/۷)	ماما
۱۹(۳۴/۵)	۷(۱۲/۷)	۱۰(۱۸/۲)	۱۹(۳۴/۵)	متخصص
				کوتاه شدن زمان زایمان
۲۲(۲۵/۳)	۱۰(۱۱/۵)	۱۴(۱۶/۱)	۴۱(۴۷/۱)	ماما
۲۵(۴۵/۵)	۶(۱۰/۹)	۶(۱۰/۹)	۱۸(۳۲/۷)	متخصص
				تغییر نیافتن کیفیت روابط زناشویی
۴۳(۴۹/۴)	۸(۹/۲)	۱۰(۱۱/۵)	۲۶(۲۹/۹)	ماما
۳۳(۶۰)	۸(۱۴/۵)	۵(۹/۱)	۹(۱۶/۴)	متخصص
				انتخاب زمان زایمان
۳۳(۳۷/۹)	۱۱(۱۲/۶)	۱۳(۱۴/۹)	۳۰(۳۴/۵)	ماما
۲۶(۴۷/۳)	۸(۱۴/۵)	۶(۱۰/۹)	۱۵(۲۷/۳)	متخصص
				پیشگیری از سزارین اورژانس احتمالی
۲۹(۳۳/۳)	۸(۹/۲)	۱۲(۱۳/۸)	۳۸(۳۴/۷)	ماما
۲۶(۴۷/۳)	۵(۹/۱)	۸(۱۴/۵)	۱۶(۲۹/۱)	متخصص

خود انتخاب نمودند [۱۱]. که هر دو نتایج با مطالعه ما همخوانی ندارد. تنها پژوهشی که در این رابطه در ایران انجام شده است توسط حنطوش زاده و همکاران در سال ۲۰۰۷ است که طبق نتایج آن از ۷۸۵ متخصص پاسخ دهنده ۲۸۲ نفر (۳۵/۹ درصد) سزارین را برای خود ترجیح دادند [۹]؛ که باز هم با نتایج مطالعه ما تفاوت دارد. یکی از عللی که بنظر می‌رسد در این تفاوت نقش داشته باشد، دو برابر بودن تعداد نمونه‌ها در مطالعه یادشده نسبت به مطالعه ماست. همچنین تفاوت‌های محیط‌های بالینی، آمار بالای تولدها و به تبع آن نحوه مراقبت‌های قبل و بعد از زایمان طبیعی، و نیز شرایط کاری متخصصان در کشورهای نامبرده و ایران را نیز نباید فراموش نمود. براساس نتایج مطالعه حاضر، مهمترین علل انتخاب سزارین توسط متخصصان "ترس از آسیب به نوزاد"، "ترس از درد زایمان" و "اعتقاد به ایمن بودن سزارین" بود. در حالی که براساس مطالعات Al-Mufti علی که متخصصان زنان و زایمان در توضیح انتخاب سزارین بیان کردند، ترس از آسیب به پرینه، ترس از اختلال در روابط جنسی، نگرانی از آسیب به جنین و تعیین زمان زایمان بود [۱۲]. در تحقیقات Jacquemyn و همکاران مهمترین علت انتخاب سزارین، امنیت جنین بود و ترس از آسیب به پرینه از علل پراهمیت به‌شمار نمی‌رفت [۱۳]. براساس مطالعه ما نوع زایمان ترجیحی ۱۱/۸ درصد متخصصان زنان و زایمان برای زنان باردار نخست‌زا سزارین بود. این در حالی است که نوع زایمان ترجیحی برای خودشان در ۵۶ درصد موارد سزارین بوده است. در مطالعه حنطوش زاده و همکاران ۲۵/۶ درصد متخصصان زایمان سزارین را برای زن باردار ترجیح دادند که با نتایج حاضر همخوانی ندارد [۹]. از آنجایی که مسئولیت مستقیم اعمال جراحی متخصصان بر عهده خود آنها است، منطقی است که به خاطر ترس از عوارض احتمالی برای مادران کمتر پیشنهاد سزارین داده شود اما عملاً ما شاهد آمار بالای سزارین برای مادران هستیم و به نظر می‌رسد فاکتورهای دیگری در این مسئله دخیل باشند. ما باید همیشه این نکته را در نظر داشته باشیم که پزشکان بخصوص متخصصان زنان و زایمان مراجعی هستند که بیماران در رابطه با تعیین نوع زایمان به آنها رجوع می‌کنند [۱۲]. شریفی‌راد و همکاران معتقدند که مهمترین فرد تأثیرگذار بر زن باردار در تعیین نوع زایمان، پزشک و در درجات بعدی شوهر، مادر و دوستان وی هستند و این موضوع اهمیت نقش پزشکان را بر دیدگاه زنان نسبت به زایمان طبیعی و سزارین نشان می‌دهد [۱].

نتایج آزمون آماری مجذور کای تفاوت معنی‌داری را بین دو گروه متخصصان زنان و زایمان و ماماها از نظر نوع زایمان ترجیحی‌شان نشان داد ($P < 0.05$).

پراهمیت‌ترین علل ترجیح سزارین توسط متخصصان "ترس از آسیب به نوزاد"، "ترس از درد زایمان" و "اعتقاد به ایمن بودن سزارین بود. در حالی که از نظر ماماها "ترس از درد زایمان"، "ترس از آسیب به پرینه و واژن" و "ترس از بی‌اختیاری ادرار" از علل با اهمیت بیان شدند (جدول شماره ۱).

نتایج این پژوهش در پاسخ به سؤال دوم پژوهش مشخص کرد که که سزارین، زایمان پیشنهادی ۱۰۰ درصد متخصصان زنان و زایمان و ۹۵/۴ درصد ماماها به زنان باردار دارای سابقه سزارین بود. همچنین زایمان طبیعی، زایمان پیشنهادی ۸۷/۶ درصد متخصصان زنان و زایمان و ۹۴/۶ درصد ماماها به زنان باردار بدون سابقه سزارین بود. علل پیشنهاد زایمان سزارین نیز از نظر متخصصان زایمانی در جدول شماره ۲ ذکر شده است. مهمترین علل ترجیح سزارین برای مادر باردار بدون اندیکاسیون سزارین در هر دو گروه ماماها و متخصصان زنان و زایمان، "ترس از دیستوشی و ترومای تولد" و "ترس از مسائل قانونی" بود. همچنین "ترس از عدم حضور به موقع بر بالین زائو"، "نامناسب بودن زمان زایمان واژینال" و "طولانی بودن پروسه زایمان" جزء علل بی‌اهمیت بیان شد. در پاسخ به سؤال سوم پژوهش نتایج این پژوهش با استفاده از آزمون آماری مجذور کای مشخص کرد که ارتباط معنی‌داری بین نوع زایمان ترجیحی عاملین زایمان برای خود و نوع زایمان پیشنهادی آنان به زنان باردار وجود دارد ($P < 0.05$) (جدول شماره ۳).

بحث و نتیجه‌گیری

در راستای دستیابی به هدف اول پژوهش یافته‌ها بیانگر آن بود که درصد بالایی از ماماها (۵۸/۷ درصد) و پزشکان (۶۲/۲ درصد) مورد مطالعه در مورد نوع زایمان خود در صورتی که خود را باردار نخست‌زا ترم سفالیک بدون اندیکاسیون سزارین تصور نمایند، سزارین بود. در سال ۱۹۹۷ اولین تحقیق در این رابطه توسط Al-Mufti و همکارانش صورت گرفت. طبق یافته‌های این محققین ۱۷ درصد از ۲۰۶ نفر پاسخ دهنده، سزارین را برای خود یا همسر خود انتخاب نمودند [۱۰]. نتایج تحقیق Mc Gurgan و همکارانش در سال ۱۹۹۹ در ایرلند نشان داد که فقط ۷ درصد از ۱۶۵ متخصص زنان و زایمان پاسخ دهنده، سزارین را به عنوان زایمان ترجیحی

جدول ۲- توزیع فراوانی و درصدی علل پیشنهاد سزارین به زنان باردار توسط واحدهای مورد پژوهش

دلیل بی‌اهمیت	دلیل کم‌اهمیت	دلیل نسبتاً با اهمیت	با اهمیت‌ترین دلیل	
				ترس از آسیب به پرینه
۳۰ (۳۳)	۱۵ (۱۶/۵)	۱۴ (۱۵/۵)	۳۲ (۳۵/۲)	ماما
۳۳ (۴۹/۳)	۱۲ (۱۷/۹)	۱۵ (۲۲/۴)	۷ (۱۰/۴)	متخصص
				ترس از بی‌اختیاری ادرار
۳۰ (۳۳)	۱۸ (۱۹/۸)	۱۵ (۱۶/۵)	۲۸ (۳۰/۸)	ماما
۳۰ (۴۴/۸)	۱۶ (۲۳/۹)	۱۴ (۲۰/۹)	۷ (۱۰/۴)	متخصص
				ترس از دیستوشی و ترومای تولد
۹ (۹/۹)	۸ (۸/۸)	۹ (۹/۹)	۶۵ (۷۱/۴)	ماما
۸ (۱۱/۹)	۷ (۱۰/۴)	۷ (۱۰/۴)	۴۵ (۶۷/۲)	متخصص
				ترس از مسائل قانونی
۳۱ (۳۴/۱)	۹ (۹/۹)	۱۶ (۱۷/۶)	۳۵ (۳۸/۵)	ماما
۹ (۱۳/۴)	۵ (۷/۵)	۷ (۱۰/۴)	۴۶ (۶۸/۷)	متخصص
				اعتقاد به ایمن بودن سزارین
۳۷ (۴۰/۷)	۱۶ (۱۷/۶)	۱۸ (۱۹/۸)	۲۰ (۲۲)	ماما
۲۰ (۲۹/۹)	۶ (۹)	۱۸ (۲۶/۹)	۲۳ (۳۴/۳)	متخصص
				سزارین به درخواست مادر
۲۷ (۲۹/۷)	۱۷ (۱۸/۷)	۲۱ (۲۳/۱)	۲۶ (۲۸/۶)	ماما
۱۳ (۱۹/۴)	۴ (۶)	۸ (۱۱/۹)	۴۲ (۶۲/۷)	متخصص
				ترس از عدم حضور به موقع بر بالین زانو
۵۷ (۶۲/۶)	۱۹ (۲۰/۹)	۷ (۷/۷)	۸ (۸/۸)	ماما
۲۴ (۳۵/۸)	۱۳ (۱۹/۴)	۱۴ (۲۰/۹)	۱۶ (۲۳/۹)	متخصص
				نامناسب بودن زمان زایمان واژینال (شیفت عصر و شب)
۶۱ (۶۷)	۱۶ (۱۷/۶)	۳ (۳/۳)	۱۱ (۱۲/۱)	ماما
۲۸ (۴۱/۸)	۱۶ (۲۳/۹)	۹ (۱۳/۴)	۱۴ (۲۰/۹)	متخصص
				طولانی بودن پروسه زایمان واژینال و وقت‌گیر بودن
۵۵ (۶۰/۴)	۱۳ (۱۴/۳)	۸ (۸/۸)	۱۵ (۱۶/۵)	ماما
۲۸ (۴۱/۸)	۱۱ (۱۶/۴)	۱۱ (۱۶/۴)	۱۷ (۲۵/۴)	متخصص
				نداشتن پرسنل کافی جهت کنترل در طول زایمان
۴۸ (۵۲/۷)	۱۶ (۱۷/۶)	۹ (۹/۹)	۱۸ (۱۹/۸)	ماما
۱۶ (۲۳/۹)	۶ (۹)	۱۳ (۱۹/۴)	۳۲ (۴۷/۸)	متخصص

جدول ۳: ارتباط بین نوع زایمان پیشنهادی عاملان زایمان به زنان باردار براساس نوع زایمان ترجیحی خودشان

χ^2	df	P-value	نوع زایمان ترجیحی برای خود*				
			سزارین	طبیعی			
							ماما
۵/۶۷	۲	۰/۰۴۲	۲ (۲/۳)	۵ (۷/۸)	طبیعی	دارای سابقه سزارین	نوع زایمان پیشنهادی به زنان باردار
			۸۴ (۹۷/۷)	۵۹ (۹۲/۲)	سزارین		
۵/۹۷	۲	۰/۰۲۱	۷۷ (۹۰/۶)	۶۱ (۱۰۰)	طبیعی	بدون سابقه سزارین	
			۸ (۹/۴)	۰ (۰)	سزارین		
۲۰/۰۱	۲	۰/۰۰۱	۵۴ (۶۹/۲)	۶۱ (۹۸/۴)	طبیعی	نخست‌زا	
			۲۴ (۳۰/۸)	۱ (۱/۶)	سزارین		
							متخصص
-	-	-	-	-	طبیعی	دارای سابقه سزاری	نوع زایمان پیشنهادی به زنان باردار
			۵۶ (۱۰۰)	۳۴ (۱۰۰)	سزارین		
۱/۹۲	۲	۰/۲۰	۴۷ (۸۳/۹)	۳۱ (۹۳/۹)	طبیعی	بدون سابقه سزارین	
			۹ (۱۶/۱)	۲ (۱/۶)	سزارین		
۱۱/۸۵	۲	۰/۰۰۱	۲۹ (۵۲/۷)	۳۰ (۸۸/۲)	طبیعی	نخست‌زا	
			۲۶ (۴۷/۳)	۴ (۱۱/۸)	سزارین		

متقاعد نمودن زنان باردار خواهان سزارین انجام نخواهد داد و در حین کمک به زائو در زایمان، مدت زمان کمتری برای تلاش در جهت کمک به زایمان طبیعی زن باردار اختصاص می‌دهد و در نتیجه زائو به سمت سزارین سوق داده می‌شود. این مطالعه تلاشی بود برای روشن شدن این مطلب که داشتن ترجیح مثبت متخصصان زایمان نسبت به سیر زایمان طبیعی می‌تواند بر عملکرد آنان در امر مشاوره به مادران باردار در رابطه با نوع زایمان و میزان تلاش برای انجام زایمان طبیعی تأثیرگذار باشد. امید است با نظارت و تلاش مسئولان مربوطه در جهت گنجاندن برنامه‌های آموزشی در راستای افزایش نگرش مثبت متخصصان زنان و زایمان و ماماها نسبت به زایمان طبیعی در آینده‌ای نزدیک، گامی در جهت کاهش میزان سزارین‌های غیرضروری برداشته باشیم.

سهم نویسندگان

سهیلا بانی: استاد راهنمای اول پایان‌نامه و مجری طرح، همکاری در تدوین کلیه قسمت‌های مقاله
الهه سیدرسولی: استاد راهنمای دوم پایان‌نامه، همکاری در تحقیقاتی، همکاری در تدوین کلیه قسمت‌های مقاله
طاہره شمس قریشی: جمع‌آوری مقالات علمی و نگارش پایان‌نامه و مقاله، گردآوری و وارد کردن داده‌ها
دکتر مرتضی قوجازاده: مشاور پایان‌نامه و همکاری طرح، کمک به وارد کردن داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها
شیرین حسن پور: همکاری طرح، کمک به اساتید راهنما و مشاور در تمامی قسمت‌های انجام طرح و نگارش مقاله حاصل از آن

تشکر و قدردانی

در پایان از اساتید بزرگوار و متخصصان محترم زنان و زایمان استان آذربایجان شرقی که با وجود مشغله کاری فراوان قبول زحمت نموده و پرسشنامه مربوط به این پژوهش را تکمیل نمودند و همچنین مسئولین محترم بیمارستان‌های استان و ماماها که ما را در امر جمع‌آوری اطلاعات یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داریم. همچنین، از معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز که اعتبارات مالی طرح را تأمین کردند قدردانی می‌شود. در انتها از مسئولین محترم دانشکده پرستاری و مامایی و معاونت محترم پژوهشی دانشکده کمال تشکر را داریم.

همچنین بر اساس نتایج این مطالعه نوع زایمان ترجیحی ۱۷/۶ درصد ماماها برای زنان باردار نخست‌زا سزارین بود. مهمترین علل بیان شده ترجیح سزارین توسط ماماها "ترس از درد زایمان" و "ترس از آسیب به نوزاد" بود. بر اساس مطالعات Gunnervik و همکارانش، ۹۸/۷ درصد ماماها شاغل در زایشگاه مخالف این عقیده بودند که زایمان سزارین ایمن‌تر از زایمان واژینال هم برای مادر و هم برای جنین است؛ همچنین فقط ۱۴/۷ درصد ماماها شاغل در زایشگاه با این عقیده که زنان باردار حق انتخاب سزارین به عنوان روش زایمانی را دارند موافق بودند [۱۴]؛ که با نتایج مطالعه ما هم خوانی دارد. نتایج آزمون آماری مجذور کای در این تحقیق ارتباط معنی‌داری بین نوع زایمان ترجیحی متخصصان زنان و زایمان و ماماها برای خود و نوع زایمان ترجیحی برای زنان باردار نخست‌زا ($P=0/01$) نشان داد. این نتایج با نتایج حنطوش‌زاده و همکاران همخوانی دارد اما با وجود معنی دار بودن این گزینه در گروه ماماها عملاً ما شاهد همسو نبودن ترجیح ماماها برای خود و زنان باردار بودیم. آنچه مسلم است این است که مسئولیت مستقیم کنترل و مراقبت از مادران باردار، عوارض و احتمال بروز خطرات و خطاهای احتمالی ناشی از سزارین و حتی زایمان طبیعی در حال حاضر بر عهده ماماها نبوده و نهایتاً در صورت مشاهده هرگونه علائم خطر فوراً به پزشک متخصص اطلاع داده می‌شود در نتیجه ماماها کمتر از متخصصان استرس کاری داشته و نهایتاً متخصصان پاسخ‌گو خواهند بود و لذا وقتی که ماماها از دید حرفه‌ای به مسئله نگاه می‌کنند بر طبق آموخته‌های خود و اینکه اصولاً شغل آنان انجام زایمان طبیعی است در اکثریت موارد اعتقاد دارند که نوع زایمان پیشنهادی آنان به زنان باردار زایمان طبیعی است. اما وقتی خود را مادر باردار فرض می‌کنند از ترس صدمه به جنین و خودشان و اینکه احتمالاً متخصصان بدلیل شلوغی بخش‌های زایمانی فرصت مراقبت از آنها و جنین‌شان را نداشته‌باشند سزارین را برای خود ترجیح می‌دهند. این مسئله ثابت می‌کند که ماماها ما در طی تحصیل به این باور نرسیده‌اند که زایمان واژینال روش مطمئنی برای زایمان زنان باردار بدون مشکل است؛ و اندیکاسیون‌های سزارین را به خوبی درک نکرده‌اند. پژوهشگر معتقد است که ترجیحات افراد بر عملکردشان تأثیرگذار می‌باشد و اگر ماما که نقش کلیدی در مراقبت‌های دوران بارداری و در حین زایمان دارد نگرش مثبتی نسبت به زایمان سزارین داشته باشد در نتیجه در روند آموزش تلاش کافی را برای

منابع

1. Sharefi Rad G, Fatheian Z, Terani M, Mahaki B. The survey of pregnant women 'viewpoints to the normal and cs according to medical behavior. The journal of Yazd Medical Science university 2008;15:19-23
2. Fatheian Z, Sharefi Rad G, Hasanzadeh A, Fatheian Z. The survey of Effect on knowledge, attitude and practice of pregnant women compared to normal delivery model based on behavioral intention in Khomeini Shahr city. The journal of Tabez Sharg 2007; 2:123-31
3. Althabe F, Belizan JF. Caesarean section: The paradox. The Lancet 2006; 368: 1472-73
4. Monari F, Mario S, Facchinetti F, Basevi V. Obstetricians' and Midwives' Attitudes toward Cesarean Section. BIRTH Journal 2008;35:129-35
5. Kingdon C, Baker L, Lavender T. Systematic review of nulliparous women's views of planned cesarean birth: The missing component in the debate about a term cephalic trial. Birth Journal 2006;33:229-37
6. Potter JE, et al. Unwanted caesarean section among public and private patients in Brazil: Prospective study. British Medical Journal 2001; 323:1155-58
7. Kalish RB, Chervenak FA, Thaler HT, Gupta M, Mc Cullough L. Intrapartum elective cesarean delivery: a previously unrecognized clinical entity. American Journal of Obstetric & Gynecology 2004; 103:1137-41
8. Bettes BA, et al. Cesarean delivery on maternal request: obstetrician-gynaecologists' knowledge, perception, and practice patterns. American Journal of Obstetric & Gynecology 2007;109: 57-66
9. Hantoushzadeh S, et al. Caesarean or normal vaginal delivery: overview of physicians' self-preference and suggestion to patients. Archives of Gynecology and Obstetrics journal 2008; 17: 26-28
10. Al-Mufti R, Carthy A, Fisk NM. Survey of obstetricians personal preference and discretionary practice. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 1997;73:1-40
11. Mc Gurgan P, Coulter-Smith S, O'Donovan PJ. A national confidential survey of obstetrician's personal preferences regarding mode of delivery. European Journal of Obstetrics & Gynecology 2001;97: 17-19
12. Chervenak FA, Thaler HT, Gupta M, Mc Cullough L, Kalish RB. Intrapartum elective cesarean delivery: a previously unrecognized clinical entity. American Journal of Obstetric & Gynecology 2004; 103:1137-41
13. Jacquemen Y, Ahankour F, Martens G. Flemish obstetricians' personal preference regarding mode of delivery and attitude toward caesarean section on demand. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2003;111:164-66
14. Gunnervik C, Josefsson A, Sydsjo A, Sydsjo G. Attitudes mode of birth among Swedish midwives. Journal of Midwifery & Women's Health 2010; 26:38-44