

# تأثیر دریافت تغذیه‌ای آهن و روی در اوایل بارداری بر وزن هنگام تولد

فرگل صادقیان<sup>۱</sup>، آریتا گشتاسبی<sup>۲\*</sup>، لیلا عسکری<sup>۱</sup>

۱. گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

۲. گروه بهداشت خانواده، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

فصلنامه پایش

سال یازدهم شماره اول بهمن - اسفند ۱۳۹۰ صص ۹۷-۱۰۲

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۰/۲/۱۰

نشر الکترونیک پیش از انتشار- ۱۰ آذر ۱۳۹۰

## چکیده

فقر ریز مغذی‌ها تأثیر نامطلوب شناخته شده‌ای بر پیامدهای بارداری دارد. این مطالعه با هدف بررسی نقش کمبود دریافت تغذیه‌ای روی و آهن در اوایل بارداری بر وزن هنگام تولد نوزاد انجام شد. در یک مطالعه طولی آینده نگر ۲۱۸ مادر باردار با حاملگی کم خطر مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از نسخه ایرانی پرسشنامه بسامد خوراک (Food Frequency Questionnaire) در نیمه اول بارداری میزان دریافت تغذیه‌ای آهن، روی و انرژی اندازه‌گیری شد و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در مدل رگرسیون خطی ارزیابی گردید. متوسط سن مادران مورد مطالعه  $26/5 (\pm 4/28)$  سال بود و  $61/9$  درصد از ایشان نخست‌زا بودند.  $61/9$  درصد از نوزادان پسر و  $8/5$  درصد از نوزادان دچار وزن کم هنگام تولد بودند.  $52/8$  درصد از افراد دریافت ناکافی روی (کمتر از  $75$  درصد میزان توصیه شده) و  $86/2$  درصد از افراد دریافت ناکافی آهن داشتند. تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که از میان آهن و روی و انرژی، تنها روی ( $P < 0/001$ ) و از میان متغیرهای باروری، تعداد زایمان ( $P = 0/049$ ) و سن بارداری هنگام زایمان ( $P < 0/001$ ) در پیش‌گویی وزن هنگام تولد، مؤثر بود. یافته‌های این مطالعه نشان دهنده میزان نسبتاً بالای کمبود دریافت تغذیه‌ای آهن و روی در زنان باردار مورد مطالعه و تأثیر دریافت تغذیه‌ای روی حتی در اوایل بارداری بر وزن هنگام تولد است.

**کلیدواژه‌ها:** دریافت تغذیه‌ای، ریزمغذی‌ها، بارداری، وزن هنگام تولد، FFQ

\* نویسنده پاسخگو: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک ۲۳، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم

بهداشتی جهاد دانشگاهی

نمابر: ۶۶۴۸۰۸۰۵

تلفن: ۶۶۴۸۰۸۰۴

E-mail: agoshtasebi@ihsr.ac.ir

## مقدمه

وزن هنگام تولد عامل مهمی در مرگ و میر نوزادان و شیرخواران و نیز بیماری‌های دوران کودکی به شمار می‌رود، تغذیه دوران بارداری حتی در مراحل اولیه رویانی بر وزن هنگام تولد مؤثر است [۱].

فقر مواد غذایی، خصوصاً ریز مغذی‌ها تأثیر نامطلوبی بر رشد رویان دارد. فقر آهن و روی از شایع‌ترین مشکلات تغذیه‌ای در دوران بارداری به شمار می‌روند [۲، ۳]. بارداری با افزایش نیاز به ریزمغذی‌هایی مانند آهن و روی همراه است و فقر هر کدام از این ریزمغذی‌ها می‌تواند تأثیر نامطلوبی بر نتیجه بارداری به همراه داشته باشد [۴]. احتمال عوارضی مانند محدود شدن رشد جنین، زایمان زودرس، افزایش خطر عفونت‌ها، در مادران باردار دچار فقر آهن بیشتر است [۵]. فقر روی در بارداری احتمال عوارضی مانند تأخیر رشد داخل رحمی، وزن کم هنگام تولد، نمره کم آپگار نوزاد، خونریزی واژینال، زایمان زودرس یا دیررس را افزایش می‌دهد [۶]. به طور متوسط، ۴۰ تا ۵۰ درصد از مادران باردار ایرانی دچار آنمی فقر آهن هستند و ۳۰ تا ۶۰ درصد از آنها از کمبود روی رنج می‌برند. مصرف دوز بالای مکمل آهن که در کشورهای در حال توسعه معمول است می‌تواند تأثیر نامطلوبی بر جذب روی داشته باشد [۸، ۷]. با توجه به شیوع بالای کم خونی فقر آهن و تأثیر نامطلوب دوز بالای مکمل آهن بر جذب روی، توجه بیشتر به دریافت تغذیه‌ای این ریزمغذی در بارداری حایز اهمیت است.

## مواد و روش کار

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی آینده نگر بوده و جامعه پژوهش آن را زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت بارداری بیمارستان آرش در تهران تشکیل دادند.

نمونه مورد مطالعه زنان باردار در فاصله اردیبهشت تا بهمن ۱۳۸۹ مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت بارداری بیمارستان آرش بودند. معیارهای ورود به مطالعه شامل سن ۱۸ تا ۳۵ سال، سن بارداری کمتر از ۲۰ هفته، بارداری تک قلو و عدم مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر بود. همچنین سقط، تولد نوزاد مرده، ابتلا به دیابت بارداری و نیز ابتلا به بیماری‌های سیستمیک و عفونی در طول بارداری، معیارهای خروج از مطالعه بودند. در ابتدا ۲۳۸ زن باردار به روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند که ۱۸ نفر به علت ابتلا به دیابت بارداری و ۲ نفر به علت تولد نوزاد مرده از

مطالعه خارج شدند و در انتها ۲۱۸ زن باردار، مورد مطالعه قرار گرفتند.

ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه دموگرافیک و زمینه‌ای، پرسشنامه بسامد خوراک (FFQ) و پرسشنامه پیامدهای زایمان بود.

نسخه ایرانی پرسشنامه بسامد خوراک (FFQ) که یک پرسشنامه نیمه کمی است که به منظور ارزیابی عادات غذایی افراد از طریق پرسش در مورد بسامد مصرف مواد غذایی در یک دوره زمانی خاص، جهت ارزیابی ارتباط بین رژیم غذایی و پیامد بارداری، مورد استفاده قرار گرفت. روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران قبلاً سنجیده شده است [۹]. تعداد آیتم‌های غذایی استفاده شده در پرسشنامه این مطالعه ۶۰ مورد بود. بسامد مصرف مواد غذایی به صورت میزان مصرف روزانه ماده غذایی به گرم محاسبه گردید.

در اولین مراجعه برای مراقبت بارداری اطلاعات مربوط به سن، قد، وزن پیش از بارداری، شاخص توده بدنی پیش از بارداری، تعداد بارداری، تعداد زایمان و سن بارداری ثبت شد. اطلاعات مربوط به زایمان شامل زمان زایمان، وزن هنگام تولد و جنس نوزاد در اولین فرصت بعد از زایمان از پرونده زایمانی استخراج شد.

نسخه ایرانی پرسشنامه بسامد خوراک (FFQ) برای تمام زنان باردار در فاصله ۱۴ تا ۲۰ هفته بارداری تکمیل شده و میزان دریافت آهن، روی و انرژی به صورت میلی گرم مصرف روزانه و کیلو کالری دریافت روزانه در یک ماه گذشته توسط نرم‌افزار SPSS Modified NUT4 محاسبه گردید و داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ با روش رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفت.

## یافته‌ها

متوسط سن مادران مورد مطالعه  $(\pm 4/28)$  ۲۶/۵ سال بوده و اغلب ایشان (۸۴/۹ درصد) خانه دار بودند. متوسط سال‌های تحصیل  $(\pm 3/6)$  ۱۱ سال بود. ۵۴/۱ درصد از زنان مورد مطالعه برای اولین بار، باردار شده و ۶۱/۹ درصد از آنان نخست‌زا بودند. متوسط شاخص توده بدنی مادران باردار  $(\pm 4/37)$  ۲۴/۴۶ کیلوگرم بر متر مربع بود (جدول شماره ۱).

خصوصیات آنتروپومتریک نوزادان مورد مطالعه در جدول شماره ۱ ارائه شده است. ۶۱/۹ درصد از نوزادان پسر و ۳۱/۸ درصد دختر بودند. ۸/۵ درصد از نوزادان دچار وزن کم هنگام تولد، ۲/۸ درصد از آنها ماکروزوم و ۱۱/۹ درصد در وضعیت پره ترم متولد شده بودند.

رگرسیون خطی نشان داد که از میان آهن، روی و انرژی، تنها دریافت روی با وزن هنگام تولد ارتباط مستقیم دارد.

#### جدول شماره ۲- توزیع میزان دریافت آهن و روی طبق RDA (n=218)

دریافت ناکافی (کمتر از ۷۵ درصد میزان توصیه شده)	تعداد (درصد)	میانگین (انحراف معیار)	تعداد (درصد)	متوسط دریافت روزانه (میلی گرم/روز)
۱۶۷ (۷۶/۶)	۱۸۸ (۸۶/۲)	۱۸/۸۷ (±۱۸/۰۴)	۱۶۷ (۷۶/۶)	آهن
۱۱۵ (۵۲/۸)	۱۶۱ (۷۳/۹)	۱۳/۷۵ (±۲۸/۲۴)	۱۱۵ (۵۲/۸)	روی

#### جدول شماره ۳- تحلیل رگرسیون بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه و وزن هنگام تولد

P	Std Error	B	Beta	
۰/۱۶۴	۸/۲۶۱	-۱۱/۵۵۲	-۰/۰۹۷	سن مادر (سال)
۰/۰۶۵	۹/۰۴۷	۱۶/۸۰۶	۰/۱۲۰	تحصیل (سال)
۰/۱۶۴	۴۳/۴۲۶	-۶۰/۵۶۹	-۰/۰۸۷	شغل
۰/۶۲۳	۵۴/۷۱۲	۲۶/۹۴۴	۰/۰۴۳	تعداد بارداری
۰/۰۴۹*	۸۲/۱۶۴	۱۶۳/۱۹۴	۰/۱۸۱	تعداد زایمان
۰/۲۱۹	۶۳/۱۶۷	-۷۷/۹۱۹	-۰/۰۷۶	جنس نوزاد
۰/۷۹۲	۰/۰۴۹	-۰/۰۱۳	-۰/۰۲۳	دریافت انرژی (کیلوکالری/روز)
۰/۰۰۱*	۲/۰۳۸	۶/۹۹۹۱	۰/۲۲۷	دریافت روی (میلی گرم/روز)
۰/۷۹۸	۳/۰۷۸	-۰/۷۸۸	-۰/۰۲۲	دریافت آهن (میلی گرم/روز)
۰/۰۸۳	۷/۰۶۱	۱۲/۳۱۸	۰/۱۰۸	شاخص توده بدنی مادر پیش از بارداری (کیلوگرم/مترمربع)
۰/۰۰۱*	۲/۷۸۱	۲۲/۰۱۶	۰/۴۹۴	سن بارداری هنگام زایمان (روز)

\* P<۰/۰۵

#### بحث و نتیجه گیری

متوسط وزن هنگام تولد نوزادان مورد مطالعه (±۵۰۷/۷۸) [۱۰، ۱۱]. میزان وزن کم هنگام تولد در این مطالعه ۸/۵ درصد بود که مشابه نتایج سایر مطالعات انجام شده در ایران است [۱۰، ۱۱]. میزان دریافت تغذیه‌ای روی در این مطالعه به طور متوسط (±۲۸/۲۴) ۱۳/۷۵ میلی گرم در روز محاسبه شد که ۵۲/۸

متوسط دریافت تغذیه‌ای آهن و روی به ترتیب (±۱۸/۰۴) و ۱۸/۸۷ (±۲۸/۲۴) میلی گرم روزانه و متوسط دریافت انرژی (±۸۹۱/۹۲) ۲۰۲۸/۳۰ کیلو کالری در روز بود. ۷۶/۶ و ۵۲/۸ درصد از افراد مورد مطالعه به ترتیب دریافت ناکافی (کمتر از ۷۵ درصد میزان توصیه شده) آهن و روی داشتند (جدول شماره ۲).

#### جدول شماره ۱- خصوصیات دموگرافیک و زمینه‌ای مادران و نوزادان مورد مطالعه (n=218)

تعداد (درصد)	مادر
	سن (سال)
۹۴ (۴۱)	۱۸-۲۵
۸۴ (۳۸/۵)	۲۵-۳۰
۴۰ (۱۸/۴)	>۳۰
	سطح تحصیلات
۵۲ (۲۳/۹)	دبستان و راهنمایی
۱۱۶ (۵۳/۲)	دبیرستان
۵۰ (۲۲/۹)	دانشگاهی
	شغل
۱۸۵ (۸۴/۹)	خانه دار
۳۳ (۱۵/۱)	شاغل
	شاخص توده بدن
۳۷ (۱۷)	<۱۹/۸
۱۲۴ (۵۶/۹)	۱۹/۸-۲۶
۵۷ (۲۶/۱)	>۲۶
	تعداد بارداری
۱۱۸ (۵۴/۱)	≤۱
۱۰۰ (۴۵/۹)	>۱
	تعداد زایمان
۱۳۵ (۶۱/۹)	.
۷۶ (۳۴/۹)	۱
۷ (۳/۲)	>۱
	نوزاد
۳۱۳۳/۸۸ (±۵۰۷/۷۸)	وزن (گرم)
۴۹/۶۶ (±۲/۹)	قد (سانتی متر)
۳۴/۱۰ (±۱/۶۹)	دور سر (سانتی متر)
۳۳/۲۲ (±۱/۸۴)	دور قفسه سینه (سانتی متر)

وزن هنگام تولد و ارتباط آن با متغیرهای باروری و تغذیه‌ای در مدل رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفت (جدول شماره ۳). از میان متغیرهای باروری، دو متغیر تعداد زایمان و سن بارداری هنگام زایمان با وزن هنگام تولد ارتباط مستقیم داشتند. تحلیل

دریافت روزانه آهن را در افراد باردار مورد مطالعه خود به ترتیب ۱۶/۶ و ۱۵/۹ میلی گرم روزانه گزارش کرده‌اند [۲۰، ۱۸].

هوشیار راد در سال ۱۹۹۸ در مطالعه خود بر روی زنان باردار ساکن حومه تهران (کرج و شمیران) میزان دریافت روزانه آهن را در زنان مورد مطالعه ۳۶ میلی گرم در روز گزارش کرده که ۲۶ درصد از افراد مورد مطالعه دریافت ناکافی (کمتر از ۷۵ درصد میزان توصیه شده) آهن داشتند [۱].

علت این تفاوت می‌تواند ناشی از روستایی بودن جمعیت مورد بررسی در این مطالعه و تفاوت در رژیم غذایی جامعه شهری و روستایی و نیز تفاوت در نحوه اندازه گیری آهن و روی باشد.

**Osendrap** در سال ۱۹۹۶ در مطالعه‌ای بر روی زنان باردار دچار فقر اقتصادی در بنگلادش میزان دریافت روزانه آهن را ۱۱/۳ میلی گرم گزارش کرده است [۱۹]. علت تفاوت دریافت روزانه می‌تواند ناشی از فقر اقتصادی و عدم دریافت مواد غذایی با ارزش تغذیه‌ای (**Nutrient Density**) بالا در جمعیت مورد بررسی در این مطالعه باشد.

متوسط دریافت انرژی در این مطالعه (۸۹۱/۹۲±) ۲۰۲۸/۳۰ کیلو کالری در روز بود که با میزان متوسط دریافت انرژی در مطالعات دیگر مشابهت داشت [۱۳، ۲، ۱].

نتایج این مطالعه حاکی از وجود ارتباط بین دریافت تغذیه‌ای روزانه روی با وزن هنگام تولد بود، اما بین دریافت روزانه آهن و انرژی با وزن هنگام تولد ارتباط معنی‌دار دیده نشد.

در مطالعه انجام شده توسط Lee در سال ۲۰۰۹ در کره بین میزان دریافت تغذیه‌ای روی و وزن هنگام تولد ارتباط معنی‌دار دیده شد [۱۴].

**Scholl** در سال ۱۹۹۲ در نیوجرسی در مطالعه انجام شده در زنان باردار میزان وزن کم هنگام تولد را در افرادی که دریافت تغذیه‌ای روی کمتر از ۶ میلی گرم در روز داشتند، دو برابر بیشتر گزارش کرده است [۱۷].

**Duran** در سال ۲۰۰۱ در شیلی در مطالعه خود میزان وزن کم هنگام تولد را در مادرانی که مکمل روی مصرف کرده بودند نسبت به سایر مادران مورد مطالعه خود کمتر گزارش کرده است [۱۸].

در سایر مطالعات **Goldenberg** در سال ۱۹۹۵ در بیرمنگام و **Grag** در سال ۱۹۹۳ که به بررسی ارتباط بین مصرف مکمل روی با وزن هنگام تولد پرداختند، بین مصرف مکمل روی و وزن هنگام تولد ارتباط معنی‌دار وجود داشت [۲۲، ۲۱].

درصد از افراد دریافت ناکافی (کمتر از ۷۵ درصد میزان توصیه شده) و ۷۳/۹ درصد از افراد دریافت کمتر از میزان توصیه شده را دارا بودند.

**Bawadi** در سال ۲۰۱۰ در مطالعه خود بر روی زنان باردار اردن میزان دریافت روی را در ۷۸ درصد از زنان باردار مورد مطالعه کمتر از میزان توصیه شده گزارش کرده است [۱۲]. هوشیار راد در سال ۱۹۹۸ در مطالعه خود بر روی زنان باردار ساکن حومه تهران (کرج و شمیران) میزان دریافت تغذیه‌ای روی را در ۷۴ درصد از افراد باردار مورد مطالعه کمتر از ۷۵ درصد میزان توصیه شده گزارش نموده است [۱]. همچنین **Ortega** در سال ۱۹۹۹ در مطالعه‌ای در اسپانیا میزان دریافت روی را در تمام افراد باردار مورد مطالعه خود کمتر از میزان توصیه شده گزارش کرده است [۱۳]. **Lee** در سال ۲۰۰۹ در کره و **Ortega** در سال ۱۹۹۸ در مطالعه‌ای در اسپانیا متوسط دریافت روزانه روی را در زنان باردار مورد مطالعه خود به ترتیب ۱۱/۸ و ۱۰ میلی گرم محاسبه کرده‌اند [۱۵، ۱۴]. **Carbone** در سال ۱۹۹۲ متوسط میزان دریافت روزانه روی را در ۶۶ درصد از زنان باردار مورد مطالعه کمتر از میزان توصیه شده گزارش کرده است [۱۶].

**Scholl** در سال ۱۹۹۲ در نیوجرسی متوسط دریافت تغذیه‌ای روی را در زنان باردار مورد مطالعه خود ۱۱/۱ میلی گرم در روز گزارش کرده است [۱۷]. همچنین **Duran** در سال ۲۰۰۱ در شیلی میزان دریافت تغذیه‌ای روی را در افراد باردار به طور متوسط کمتر از ۵۰ درصد میزان توصیه شده گزارش کرده است [۱۸].

**Osendrap** در سال ۱۹۹۶ در مطالعه‌ای بر روی زنان باردار دچار فقر اقتصادی در بنگلادش میزان دریافت روزانه روی را ۶/۳ میلی گرم گزارش کرده است [۱۹]. علت تفاوت دریافت روزانه می‌تواند ناشی از فقر اقتصادی و عدم دریافت مواد غذایی با چگالی تغذیه‌ای بالا در جمعیت مورد بررسی در این مطالعه باشد.

میزان دریافت تغذیه‌ای آهن در این مطالعه به طور متوسط (۱۸/۸۷±) ۱۸/۸۷ میلی گرم در روز محاسبه شد که ۸۶/۲ درصد دریافت ناکافی (کمتر از ۷۵ درصد میزان توصیه شده) و ۷۶/۶ درصد افراد دریافت کمتر از میزان توصیه شده را دارا بودند.

**Bawadi** در سال ۲۰۱۰ در مطالعه خود بر روی زنان باردار اردن میزان دریافت آهن را در ۹۴/۱ درصد از زنان باردار مورد مطالعه کمتر از میزان توصیه شده گزارش کرده است [۱۲]. **Duran** در سال ۲۰۰۱ در شیلی و **Pick** در سال ۲۰۰۵ در کانادا میزان متوسط

کمبود دریافت تغذیه‌ای این ریزمغذی در مادران باردار مورد مطالعه است، نیاز به آموزش‌های تغذیه‌ای از ابتدای بارداری در مورد مصرف مواد غذایی با ارزش تغذیه‌ای بالاتر در مادران باردار احساس می‌شود.

متوسط وزن هنگام تولد در نوزادان مورد مطالعه، بیانگر چندان‌عملی بودن وزن هنگام تولد و نیز احتمال نیاز افزودن آهن و روی دریافتی از طریق دریافت مکمل آهن و روی در مادران مورد مطالعه باشد و این موضوع اهمیت دریافت مکمل‌های تغذیه‌ای را در زنان باردار بیش از پیش آشکار می‌سازد.

### سهم نویسندگان

فرگل صادقیان: جمع‌آوری داده‌ها، همکاری در تحلیل داده‌ها، نگارش مقاله

آزیتا گشتاسبی: طراحی مطالعه، تحلیل داده‌ها، نگارش مقاله  
لیلا عسگری: جمع‌آوری داده‌ها، همکاری در تحلیل داده‌ها، نگارش مقاله

### تشکر و قدردانی

بدین وسیله از همه مادرانی که ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند تشکر و قدردانی می‌گردد.  
این تحقیق در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی با حمایت دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.

در مطالعه انجام شده توسط هوشیار راد در سال ۱۹۹۸ بر روی زنان باردار ساکن حومه تهران (کرج و شمیران) بین دریافت تغذیه‌ای روی و وزن هنگام تولد ارتباط معنی‌دار دیده نشد [۱]. علت این تفاوت می‌تواند ناشی از دریافت تغذیه‌ای بالای آهن در این مطالعه و در نتیجه تداخل در جذب روی باشد.

در کارآزمایی بالینی انجام شده توسط Osendrap در سال ۱۹۹۶ روی زنان باردار دچار فقر اقتصادی در بنگلادش بین مصرف مکمل روی و وزن هنگام تولد ارتباط معنی‌دار دیده نشد [۱۹]. علت این تفاوت می‌تواند ناشی از فقر اقتصادی جمعیت مورد بررسی در این مطالعه در نتیجه دریافت ناکافی مواد غذایی باشد که کاهش فراهمی زیستی مکمل روی تجویز شده را به همراه خواهد داشت و یا ناشی از تأثیر مستقل دریافت ناکافی تغذیه‌ای بر محدودیت رشد جنین باشد.

همچنین بین دریافت انرژی و وزن هنگام تولد در سایر مطالعات نیز ارتباط معنی‌دار دیده نشد [۱، ۱۲، ۱۸، ۲۳].

یافته‌های این مطالعه نشان دهنده میزان نسبتاً بالای کمبود دریافت تغذیه‌ای آهن و روی در زنان باردار مورد مطالعه است که می‌تواند ناشی از تمایل کمتر مادران باردار به مصرف مواد غذایی با ارزش تغذیه‌ای بالا، وضعیت اقتصادی، عدم دسترسی و یا عادات غذایی مادران باردار مورد مطالعه مبنی بر تأمین انرژی دریافتی از مواد غذایی با چگالی تغذیه‌ای کمتر باشد. با توجه به یافته‌های این مطالعه که نشان دهنده تأثیر تغذیه‌ای دریافت روی در اوایل بارداری بر وزن هنگام تولد است و همچنین میزان نسبتاً بالای

### منابع

- Houshiarrad A, Omidvar N, Mahmoodi M. Dietary Intake anthropometry and birth outcome of rural pregnant women in two Iranian districts. *Nutrition Research* 1998; 18: 1469-82
- Bergmann R, Gravens L, Hertwig K. Iron deficiency is prevalent in a sample of pregnant women at delivery in Germany. *European Journal of Obstetric and Gynecology and Reproductive Biology* 2002; 102: 155-60
- Bawadi H, Kuran O, Bastoni L. Gestational nutrition improves outcome of vaginal deliveries in Jordan. *Nutrition Research* 2010; 30: 110-17
- Upadhyaya C, Mishras S, Ajmera P. Serum iron, copper and zinc status in maternal and cord blood. *Indian Journal of Clinical Biochemistry* 2004; 19: 48-52
- Isil M, Baykan Z, Sancak B. The relation between maternal zinc level and infant birth weight. *Gazi Medical Journal* 2001; 12: 179-82
- Zhang Q, Ananth C, Rhoads G. The Impact of maternal anemia on perinatal mortality. *Annals of Epidemiology* 2009; 19: 793-99
- Torabi P, Sheikholeslam R, Minaie M. Country guideline for pregnancy and lactation nutrition. 1st Edition, Ministry of Health and Medical education: Tehran, 2008
- Parul C, Khatry S, Leclercq S. Iron and zinc interaction among pregnant Nepali women. *Nutrition Research* 2001; 21: 141-48
- Malekshah AF, Kimiagar M, Saadatian-Elahi M, Pourshams A, Nouraie M, Gogiani G, et al. Validity and reliability of a new food frequency questionnaire

compared to 24 h recalls and biochemical measurements: pilot phase of Golestan cohort study of esophageal cancer. *European Journal of Clinical Nutrition* 2006; 60: 971-7

10. Nasiriamiri F, Hajiahmadi M. The relationship between maternal HCT and pregnancy outcomes. *Journal of Gorgan University of Medical Science* 2007; 9: 29-34

11. Ramazanali F, Vahid Dastjerdi M, Beigi A, Moinin A. The Relationship between maternal HCT levels, birth weight and risk of low birth weight. *Iran Journal of Pediatric* 2006; 6: 447-54

12. Bawadi H, Kuran O, Bastoni L. Gestational nutrition improves outcome of vaginal deliveries in Jordan. *Nutrition Research* 2010; 30: 110-17

13. Ortega RM, Gaspar MJ, Moreiras O. Zinc status of a group of Spanish women. *International Journal of Vitamin and Nutrition Research* 1994; 64: 130-34

14. Lee Y, Kim H, Ha E, Park H, Ha M, Kim Y. Maternal zinc intake during pregnancy is positively associated with birth weight. *FASEB Journal*. 2010; 24 (Meeting Abstract Supplement): 1b309

15. Ortega R, Martinez R, Lopez Sobaler A, Andres P. The consumption of food, energy and nutrients in pregnant women. *Nutrition Research* 1998; 18: 1691-1701

16. Carbone P, Sobreviela M, Jimenez D, Martinez C. Hair zinc and dietary zinc intake during pregnancy and puerperium. *European Journal of Obstetric and Gynecology and Reproductive* 1992; 47: 103-8

17. Scholl T, Hediger M, Schall J, Fischer R, Khoo CS. Low zinc intake during pregnancy: its association with preterm and very preterm delivery. *American Journal of Epidemiology* 1993; 137: 1115-24

18. Duran C, Marin V, Alcazar L, Iturradle H. Controlled trial of Zinc supplementation in Chilean pregnant adolescent. *Nutrition Research* 2001; 21: 715-24

19. Osendrap S, Raaij J, Arifeen S, Wahed M. A randomized, placebo-controlled trial of the effect of zinc supplementation during pregnancy on pregnancy outcome in Bangladeshi urban poor. *American Journal of Clinical Nutrition* 2000; 71:114-9

20. Pick M, Edwards M, Moreau D. Assessment of diet quality in pregnant women using the Healthy Eating Index. *American Diet Association* 2005; 105: 240-46

21. Goldenberg RL, Tamura T, Neggers Y, Copper RL, Johnstone KE. The effect of zinc supplementation on pregnancy outcome. *The Journal of the American Medical* 1995; 274: 463-68

22. Grag HK, Singhal KC, Arshad Z. A study of the effect of oral zinc supplementation during pregnancy on pregnancy outcome. *Indian Journal of Pharmacology* 1993; 37: 276-84

23. Lagiou P, Tamimi RM, Mucci LA, Adami HO. Diet during pregnancy in relation to maternal weight gain and birth size. *European Journal of Clinical Nutrition* 2004; 58: 231-7