# استفاده از شاخص تنسنجی برای غربالگری عوامل خطر بیماریهای قلبی- عروقی

دکتر فریدون عزیزی: استاد، گروه غدد درون ریز و متابولیسم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی احمد اسماعیلزاده: دانشجوی دکترای تغذیه، محقق گروه تغذیه، مرکز تحقیقات غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پروین میرمیران: مربی، گروه تغذیه انسانی، دانشگاه علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیلوفر شیوا: مربی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فصلنامه پایش سال سوم شماره دوم بهار ۱۳۸۳ صص ۱۰۸–۹۷ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۲/۹/۳

### چکیده

شناسایی بهترین شاخص ساده تن سنجی جهت غربالگری مناسب برای عوامل خطر بیماریهای مزمن در هر جامعهای ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف ارزیابی مقایسهای شاخصهای تن سنجی جهت پیشگویی عوامل خطر بیماریهای قلبی - عروقی در زنان ساکن منطقه ۱۳ تهران صورت گرفت.

مطالعه مقطعی حاضر برروی ۵۰۷۳ زن ۷۴ ساله شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران که بهطور تصادفی از ساکنین منطقه ۱۳ تهران انتخاب شده بودند صورت گرفت. اطلاعات دموگرافیک جمعآوری شد و شاخصهای تن سنجی طبق دستورالعملهای استاندارد اندازه گیری و محاسبه شدند. حدود مرزی مورد استفاده برای دورکمر، نمایه توده بدن، نسبت دور کمر به قد (Waist to Height Ratio-WHtR) به ترتیب ۸۰۰ شب به باسن (Waist to Height Ratio-WHtR) و دور کمر به قد (Waist to Height Ratio-WHtR) به ترتیب معیارهای معیارهای معیارهای فشار خون به روش استاندارد صورت گرفت و پرفشاری خون بر طبق معیارهای Joint National Committee VI تعریف شد. فراسنجهای بیوشیمیایی در نـمونه خون ناشــتا اندازه گیری شــدند. دیابت به صورت ۱۲۶mg/dl و دیس لیپیدمی بر اساس FBS ۱۲۶mg/dl تعریف شد. وجود « حداقل یک عامل خطرساز» از چهار عامل عمده خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی (پرفشاری خون، دیس لیپیدمی، دیابت و استعمال دخانیات) نیز ارزیابی شد.

میانگین سنی زنان مورد مطالعه  $7/4 \pm 1/6$  سال و میانگین دور کمر، BMI و WHtR و WHtR آنها بهترتیب میانگین سنی زنان مورد مطالعه  $7/4 \pm 1/6 \pm 0.00$  بود. در مورد تمام عوامل خطرساز، بیشترین شانس ابتلا به آن عامل خطرساز مربوط به افرادی می شد که دارای دور کمر غیر طبیعی بودند. در هر دو رده سنی  $7/6 \pm 0.00$  سال و  $7/6 \pm 0.00$  سال، دور کمر بیشترین حساسیت و ویژگی را جهت پیشگویی عوامل خطرساز دارا بود. بیشترین سطح زیر منحنی Receiver Operating Curve (ROC) نیز در تمام موارد به دور کمر مربوط می شد. دور کمر درصد بالایی از پیشگویی صحیح را جهت ابتلا به عوامل خطر ساز در مقایسه با سایر شاخصهای تن سنجی دیگر دارا بود.

یافتهها نشان میدهند که در جامعه رنان ساکن منطقه ۱۳ تهران, دور کمر شاخص بهتری برای غربالگری عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی میباشد.

كليدواژهها: دور كمر، نمايه توده بدن، بيماريهاي قلبي- عروقي، زنان

E-mail: azizi @erc-iran.com

<sup>\*</sup> نویسنده پاسخگو: تهران، اوین، بیمارستان طالقانی، طبقه دوم، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تلفن: ۲۴۰۹۳۰۹ نمابر: ۲۴۰۲۴۶۳

#### مقدمه

امروزه شیوع چاقی در کشورهای پیشرفته و هم چنین در کشورهای در حال پیشرفت بهطور قابل ملاحظهای رو به افزایش است[۱-۳]. بهطوری که برخی از مجامع جهانی از آن به عنوان یک اپیدمی یاد می کنند [۴]. افراد چاق بیشتر از سایرین مستعد ابتلا به دیابت، بیماریهای قلبی- عروقی و برخی سرطانها هستند[۴]. در ایران نیز میزان شیوع چاقی و عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی بالاست[۵، ۶].

هر چند که نمایه توده بدن به عنوان شاخص توصیه شده چاقی توسط سازمان جهانی بهداشت [۷] با عوامل خطر بیماریها مرتبط است [۸]، اما برخی مطالعات نشان میدهند که الگوی توزیع چربی در بدن نقش تعیین کنندهتری در شناسایی عوامل خطر بیماریها دارد [۹-۱۱] و افرادی که دارای تجمع بیشتر چربی در ناحیه شکمی هستند در معرض خطر بالاتری برای ابــتلا به دیابت [۱۲]، پرفشاری خون [۱۳] و بیماریهای قلبی- عروقی [۱۴] قرار دارند. این در حالی است که هنوز هیچگونه اتفاق نظری در زمینه چاقی شکمی وجود ندارد. هر چند که بیشتر مطالعات انجام شده دور کمر را به عنوان یک شاخص برتر نسبت به نمایه توده بدن و نسبت دور کمر به باسن (Waist to Hip Ratio-WHpR) برای شناسایی چاقی شکمی و عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی پیشنهاد کردهاند [۱۸-۱۸]، اما هنوز بهترین شاخص چاقی که پیشگویی کننده خطر بیماریهای قلبی- عروقی باشد، مورد بحث است و نتیجه قطعی در مورد آن حاصل نشده است. از طرف دیگر اغلب مطالعاتی که خطر عواقب بهداشتی مرتبط با چاقی را بررسی کردهاند مربوط به کشورهای اروپایی و امریکایی بوده و اطلاعات کمی در این زمینه در کشورهای آسیایی وجود دارد. اهمیت این مطلب موقعی دو چندان میشود که بدانیم قــدرت پیشگویی کنندگی شاخصهای تنسنجی برای عوامل خطر بیماریهای قلبی- عروقی بستگی به جمعیت (Population-dependent) هر منطقه داشته [۱۹] و از نژادی به نژاد دیگر متفاوت است[۲۰]. لذا شناسایی بهترین شاخص ساده تنسنجی جهت انجام غربالگری مناسب برای عوامل خطر بیماریهای مزمن در هر جامعهای ضروری بهنظر

مىرسد. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي مقايسهاى شاخصهاى تنسنجی جهت پیشگویی عوامل خطرساز بیماریهای قلبی-عروقی در زنان ساکن منطقه ۱۳ تهران صورت گرفت.

# مواد و *ر*وش کا*ر*

بررسی حاضر یک مطالعه مقطعی و بر پایه جمعیت (Population-based cross-sectional study) است که در قالب مطالعه قند و لیپید تهران، مطالعه آینده نگری که با هدف تعیین شیوع و شناسایی عوامل خطرساز بیماریهای غیر واگیر و ایجاد شیوه زندگی سالم جهت بهبود این عوامل در منطقه ۱۳ تهران در جریان است ۲۱۱]، انجام شد. در مطالعه قند و لیپید تهران، ۱۵۰۰۵ فرد بالای ۳ سال با استفاده از روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای به طور تصادفی انتخاب شدهاند که در این بین ۱۰۸۳۷ نفر ۷۴-۱۸ ساله بودند. در بررسی حاضر تحلیل دادهها بر روی ۵۰۷۳ زن ۱۸-۷۴ ساله که دادههای مربوط به آنها بهطور کامل در دست بود انجام شد. این تحقیق توسط شورای پژوهشی مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصویب شد و در آن از تمامی افراد شرکت كننده موافقتنامه آگاهانه كتبي اخذ شد.

افراد مورد مطالعه بهطور خصوصی و با روش چهره به چهره مصاحبه شدند. مصاحبهها به زبان فارسی و توسط پرسشگران مجرب با استفاده از پرسشنامه از پیشآزمونشده صورت گرفت. ابتدا اطلاعاتی راجع به سن و عادات سیگار کشیدن از افراد گرفته شد.

سپس وزن با حداقل پوشش و بدون کفش با استفاده از یک ترازوی دیجیتالی با دقت ۱۰۰ گرم اندازهگیری و ثبت شد. قد افراد با استفاده از متر نواری در وضعیت ایستاده در کنار دیوار و بدون کفش در حالی که کتفها در شرایط عادی قرار داشتند با دقت ۱ سانتیمتر اندازهگیری شد. نمایه توده بدن از رابطه وزن (به کیلوگرم) بر مجذور قد (به متر مربع) محاسبه شد. دور کمر در باریک ترین ناحیه آن در حالتی ارزیابی شد که فرد در انتهای بازدم طبیعی خود قرار داشت. جهت اندازه گیری دور باسن، برجسته ترین قسمت آن مشخص گردید. اندازهگیری دور کمر و دور باسن با استفاده از یک متر

نواری غیرقابل ارتجاع بدون تحمیل هرگونه فشاری به بدن فرد با دقت  $\cdot$ /۱ سانتی متر صورت گرفت. از تقسیم دور کمر به باسن به دور باسن نسبت دور کمر به باسن (WHpR) Waist to Hip Ratio فردی دور کمر به قد نسبت (WHpR) Waist to Hip Ratio منظور حذف خطای فردی همه اندازه گیری ها توسط یک نفر انجام شد. حدود مرزی مورد استفاده برای دور کمر، WHpR و BMI به ترتیب  $\cdot$ /۱ مرا که و ۲۵ kg/m² و Whtr

جهت اندازه گیری فشارخون، از افراد مورد مطالعه خواسته شد تا بهمدت ۱۵ دقیقه استراحت کنند. سپس فشارخون در حالت نشسته از بازوی راست افراد دو مرتبه به فاصله حداقل ۳۰ ثانیه با استفاده از یک فشارسنج جیوهای استاندارد که اندازه بازوبند آن بسته به دور بازوی افراد متغیر بود، توسط یک پزشک مجرب اندازه گیری شد. سپس میانگین دو اندازه گیری محاسبه و به عنوان فشارخون نهایی افراد در نظر گرفته شد. همچنین فشارخون سیستولیک با شنیده شدن اولین صدای کروتکف و فشارخون دیاستولیک با از بین رفتن صدا (فاز ۵ کروتکف) ثبت می شد. قبل از اندازه گیری فشارخون از فرد در مورد مصرف چای یا قهوه، فعالیت فشارخون از فرد در مورد مصرف چای یا قهوه، فعالیت فیزیکی، سیسگار و پر بودن مثانه سؤال می شد.

نمونه خون سیاهرگی از تمام افراد مورد مطالعه پس از ۱۲-۱۴ ساعت ناشتا بودن، بین ساعت ۲ تا ۹ صبح در محل آزمایشگاه واحد بررسیهای قند وچربی خون جمعآوری گردید. نمونههای خون بهمدت ۱۰ دقیقه با سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ شدند. تحلیل نمونهها با دستگاه سلکترا-۲ (Vital Scientific, Spankeren, Netherlands) اتوآنالیزر (خون بهمدت.

قندخون در همان روز اخذ نمونه با روش گلوکز اکسیداز به طریق رنگسنجی آنزیمی اندازهگیری شد. دیابت قندی

بهصورت FBS ≥۱۲۶mg/dl یا قند خون دو ساعته بزرگتر یا مساوی ۲۰۰ mg/dl تعریف شد[۲۳].

آزمون کلسترول تام و تریگلیسرید به ترتیب به روش كالرىمترى آنزيمي با كلسترول استراز، كلسترول اكسيداز و گلیسرول فسفات اکسیداز با استفاده از کیتهای شرکت پارس آزمون انجام گرفت. اندازهگیری HDL سرم پس از رسوب محلول آپولیپوپروتئینها با اسیدفسفوتنگستیک صورت گرفت. LDL نیز با استفاده از فرمول Friedwald محاسبه شد. به منظور کنترل کیفیت آزمایشها بین هر ۲۰ آزمون برای چربیها با Precipath (محدوده طبیعی) و Precipath (محدوده پاتولوژیک) ارزیابی میشد. برای کالیبره کردن دستگاه اتوآنالیزر، سلکترا-۲ در تمامی روزهای کار آزمایشگاه استفاده میشد. تمامی نمونهها در شرایطی آنالیز میشدند که كنترل كيفيت دروني معيارهاي قابل قبول بودن را اخذ کرده بود. ضریب تغییرات درون وبرون آزمون به ترتیب ۲ و درصد برای کلسترول تام و 1/6 و 9/1 درصد برای 1/6ترىگليسريدها بود. ديسليپيدمي بهصورت TC≥۲۰۰mg/dl يا LDL ڪ١٣٠mg/dl يا HDL<٣٥ mg/dl يا TG ≥۲۰۰mg/dl تعریف شد [۲۴].

وجود « حداقل یک عامل خطرساز» از ۴ عامل عمده خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی (پرفشاری خون، دیسانیپیدمی، دیابت و استعمال دخانیات) نیز ارزیابی شد.

تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS (Version 9.5) دو رده سنی -79 سال تقسیم شدند.

جهت به دست آوردن نسبت شانس برای وجود عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی در حدود مرزی معین شاخصهای تنسنجی از رگرسیون لجستیک با روش Enter استفاده شد و در آن اثر عواملی چون سن، فعالیت فیزیکی و استعمال دخانیات تعدیل گردید. فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای نسبتهای شانس نیز محاسبه شد.

جهت تعیین حساسیت و ویژگی حدود مرزی شاخصهای تنسنجی از منحنی (Roceiver Operating Curve (ROC) و محدود فاصله استفاده شد و سطح زیر منحنی ROC و ۹۵ درصد فاصله اطمینان آن برای شاخصهای تنسنجی به تفکیک گروههای

سنی ارایه شد. مقایسه شاخصهای تنسنجی از نظر قدرت آنها در صحیح طبقهبندی کردن افراد بر طبق وجود یا عدم وجود عوامل خطرساز با استفاده از آزمون McNemar ارزیابی شد.

## يافتهها

میانگین سنی زنان مورد مطالعه  $79/4\pm11$  سال میانگین سنی زنان مورد مطالعه  $79/4\pm11$  و Body Mass Index-BMI) و دور کمر آنها بهترتیب  $79/4\pm11/0$  kg/m² و میانگین WHpR و WHpR بهترتیب  $79/4\pm11/0$  و  $99/4\pm11/0$  و بیانگین  $99/4\pm11/0$  و ساله بهترتیب  $99/4\pm11/0$  بود. تمام شاخصهای تنسنجی در افراد 99/40 ساله بیشتر از افراد 99/40 ساله بود. در مورد سطح فراسنجهای لیپیدی سرم و فشار خون نیز افراد 99/40 ساله مقادیر بالاتری را نسبت به گروه سنی 99/40 سال دارا بودند، به استثنای سطح 99/40 سرم که در هر دو گروه سنی 99/40 به استثنای سطح 99/40 بود (جدول شماره ۱).

میزان شیوع عوامل خطرساز بیماریهای قبلی- عروقی در شکل شماره ۱(الف) نشان داده شده است. بهطور کلی ۲۲ درصد از زنان مورد مطالعه مبتلا به پرفشاری خون و ۷ درصد مبتلا به دیابت بودند. شیوع دیسلیپیدمی و « حداقل یک عامل خطرساز» نیز بهترتیب در ۶۴ و ۶۸ درصد از افراد مورد مطالعه دیده شد. نسبتی از زنان مورد مطالعه که دارای BMI،

WHpR ،WC و WHtR بالای حدود مرزی تعیین شده بودند نیز در شکل شماره ۱(ب) آمده است.

ورصد از افراد مورد مطالعه داراری BMI بزرگتر یا مساوی  $7000\,\mathrm{kg/m^2}$  و  $800\,\mathrm{kg/m^2}$  و  $800\,\mathrm{kg/m^2}$  کـمر بزرگتر یا مساوی  $800\,\mathrm{kg/m^2}$  بودند.  $800\,\mathrm{kg/m^2}$  و  $800\,\mathrm{kg/m^2}$  نیز بهترتیب در  $800\,\mathrm{kg/m^2}$  درصد و  $800\,\mathrm{kg/m^2}$  از افراد مورد مطالعه مشاهده گردید. در تمام موارد میزان شیوع، در گروه سنی  $800\,\mathrm{kg/m^2}$  سال بیشتر از گروه سنی  $800\,\mathrm{kg/m^2}$  سال بیشتر از گروه سنی  $800\,\mathrm{kg/m^2}$ 


جدول شماره ۲ نسبت شانس تعدیل شده از نظر سن، فعالیت فیزیکی، استعمال دخانیات و اثر متقابل شاخصهای تنسنجی برای وجود عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی را برطبق شاخصهای تنسنجی نشان میدهد. در مورد تمام عوامل خطرساز، بیشترین شانس ابتلا به آن عامل خطرساز مربوط به افرادی میشد که دارای WC غیر طبیعی بودند. به عبارت دیگر زنانی که دارای WC بزرگتر یا مساوی ۸۰cm بودند نسبت به افرادی که دارای BMI یا Whpk غیرطبیعی بودند، از شانس بالاتری جهت ابتلا به عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی برخوردار


جدول شماره ۱- میانگین و انحراف معیار سن،شاخصهای تنسنجی، بیوشیمیایی و فشارخون در زنان، مطالعه قند و لیپید تهران

بودند.

	O 3 ( )		
		گروههای سنی (سال)	(
	۱۸-۳۹	414	کل افراد
	<b>て人/で±タ/キ</b>	۵٣/١±٨/٩	٣9/9±1 <i>۴/</i> ۶
$(kg/m^2)BMI$	70/7±4/7	て9/7±4/8	ΥΥ/1±۵/1
(cm)WC	1.18±11/8	98/4±11/4	۸۶/۵±۱۳/۱
WHpR	•/ <b>Y</b> 9±•/• <b>Y</b>	•/AA±•/•Y	•/ <b>۸</b> ٣±•/• <b>۸</b>
WHtR	•/ <b>۵</b> •±•/• <b>Y</b>	•/۶•±•/•Y	•/۵۵±•/•A
کلسترول تام سرم (mg/dl)	1.人∨±٣٧	777±49	<b>۲・</b> 人士 <b>ギ</b> V
تری گلیسرید سرم (mg/dl)	11A±8٣	<b>ヽヾ</b> ハ±٧٧	1 <i>48</i> ±18
گلوکز سرم (mg/dl)	$\Lambda\Lambda\pm1\Delta$	1 • Y±47	٩٧±٣٣
HDL-C سرم (mg/dl)	40±11	40±11	40±11
LDL-Cسرم (mg/dl)سرم	11A±~~	101±4·	144∓£•
فشار خون سیستولیک (mmHg)	1 · 9±1 1	<b>۱</b> ۲人土 <b>۲</b> ۲	<b>り</b> 1人土 <b>り</b> 9
فشار خون دیاستولیک(mmHg)	٧ <b>۴</b> ±٩	۸۱±۱۱	γγ±۱۱

نمودار شماره ۱- شیوع عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی در زنان ۷۴–۱۸ سال، مطالعه قند ولیپید تهران





الف- به طور کلی ۲۲ درصد از زنان مورد مطالعه مبتلا به پرفشاری خون و ۷ درصد مبتلا به دیابت بودند. شیوع دیس لیپیدمی و «حداقل یک عامل خطرساز» " نیز به ترتیب در ۶۴ و ۸۸ درصد از افراد مورد مطالعه دیده شد. ب- ۶۵ درصد از افراد مورد مطالعه داراری BMI بزرگتر یا مساوی ۲۵ kg/m² و ۲۵ درصد از افراد مورد مطالعه مشاهده گردید. در تمام دارای دور کـمر بزرگتر یا مساوی ۸۰ سال بیشـتر از گروه سنی ۷/۱ WHtR و ۲/۵ و ۶۳ درصد از افراد مورد مطالعه مشاهده گردید. در تمام موارد میزان شیوع در گروه سنی 4 - 1 سال بیشـتر از گروه سنی 4 - 1 سال است.

BMI: Body Mass Index, WC: Waist Circumference, WHpR: Waist-to-Hip Ratio, WHtR: Waist-to-Height Ratio

DOR: 20.1001.1.16807626.1383.3.2.1.9

جدول شماره ۲- نسبت شانس تعدیل شده برای وجود عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی بر طبق شاخصهای تنسنجی در زنان ۷۴-۱۸

مطالعه قند و لیپید تهران

حداقل یک عامل خطرساز ٔ	ديس ليپيدمي <sup>×</sup>	دیابت <sup>×</sup>	پرفشاری خون <sup>*</sup>	شاخصهای تنسنجی**
1/V(1/4-7/+)	1/8(1/4-1/9)	·/9(·/۶-1/۲)	1/7 (1/4-7/1)‡	BMI
Υ/·(\/Δ-Υ/Δ)	Y/1(1/A-Y/D)	<b>T/9(T/•-T/V)</b>	<b>T/T(1/V-T/A)</b>	WC
1/8(1/1-1/8)	1/7(1/•-1/۵)	7/4(1/4-4/7)	1/1(+/97-1/4)	WHpR
1/7(•/9-1/۵)	1/۲(+/٩-1/۶)	\/ <b>Y(</b> •/\\D- <b>Y</b> /\Lambda)	1/从(1/٢-٢/٩)	WHtR

<sup>ٔ</sup> پرفشاری خون بصورت فشار خون سیستولیک بزرگتر یا مساوی ۱۴۰mmHg یا فشار خون دیاستولیک بزرگتر یا مساوی ۹۰mmHg یا مصرف داروی پائین آورنده فشار خون تعریف شد، دیابت بهصورت قندخون ناشتای بزرگتر یا مساوی ۱۲۶mg/dl یا قند خون دو ساعته بزرگتر یا مساوی T۰۰ mg/dl و دیس لیپیدمی به صورت داشتن TC ≥ ۲۰۰mg/dl یا HDL <۳۵mg/dl یا TC ≥۲۰۰mg/dl تعریف شد.

مقایسه حساسیت، ویژگی و میانگین «حساسیت+ ویژگی» برای WHpR ،WC ،BMI و WHtR جهت پیشگویی پرفشاری خون و دیس لیپیدمی در جدول شماره ۳ آمده است. هم در مورد دو رده سنی ۳۹–۱۸ سال و ۷۴–۴۰ سال و هم در مــورد كــل افــــراد (۷۴-۱۸ سال)، از بين چهار شاخص تنسنجی مذکور، WC بیشترین حساسیت و ویژگی را جهت پیشگویی پرفشاری خون و دیس لیپیدمی دارا بود، به جز در مورد دیس لیپیدمی در کل افراد (۷۴-۱۸ سال) که در آن ویژگی BMI و WHpR بیشتر از WC بود. در تمام موارد WC از بیشترین مقدار میانگین «حساسیت + ویژگی» برخوردار بود و هیچکدام از شاخصهای تنسنجی میانگین « حساسیت+ ویژگی» بیشتر از WC نداشتند. در مورد دیابت و « حداقل یک عامل خطرساز» نیز WC دارای بیشترین حساسیت، ویژگی و میانگین «حساسیت + ویژگی» بود (اطلاعات نشان داده نشده است). در تمام موارد با افزایش سن از رده سنی ۳۹–۱۸ سال به رده سنی ۲۴–۴۰ سال، حساسیت حدود مرزی شاخصهای تنسنجی جهت پیشگویی عوامل خطرساز افزایش و ویژگی آنها کاهش می یافت.

سطح زیر منحنی ROC برای شاخصهای تنسنجی جهت تشخیص عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی در زنان مورد مطالعه در جدول شماره ۴ آمده است. در مورد تمام

عوامل خطرساز در هر دو رده سنی ۳۹–۱۸ سال و ۷۴-۴۰ سال و همچنین در کل افراد، بیشترین سطح زیر منحنی مربوط به WC بود.

مقایسه شاخصهای تنسنجی از نظر قدرت پیشگویی آنها برای تشخیص « حداقل یک عامل خطرساز» در جدول شماره ۵ آمده است. WC درصد بالایی از پیشگویی صحیح را در مقایسه با تمام شاخصهای تنسنجی دیگر دارا بود. بین درصد افرادی که وضعیت عامل خطرساز آنها به درستی توسط WC و به اشتباه توسط BMI شناسایی شده بودند با درصد افرادی که وضعیت عامل خطرساز آنها بهدرستی توسط BMI و به اشتباه توسط WC تشخیص داده شده بودند تفاوت معنی داری وجود داشت ( $P < \cdot / \cdot \cdot 1$ ). چنین تفاوتی بين WHtR و P <٠/٠٠١) WC و همچنين بين WHtR و P<٠/٠١) WC) و بين WHpR و P<٠/٠١) WC) نيز دیده می شد. در مورد عوامل خطرساز دیگر نیز که دادههای مربوط به آنها نشان داده نشده است، تمام این یافتهها صادق بودند. بنابراین از بین چهار شاخص تنسنجی مذکور، دور کمر بهترین شاخص برای غربالگری عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی در جامعه زنان ساکن منطقه ۱۳ تهران است,

آعوامل خطر ساز عبارتند از: پرفشاری خون، دیابت، دیس لیپیدمی و استعمال دخانیات

<sup>🕻</sup> اعداد نشان دهنده نسبت شانس تعدیل شده از نظر سن، فعالیت فیزیکی، استعمال دخانیات و اثر متقابل شاخصهای تن سنجی بوده و اعداد داخل پرانتز بیانگر ٩٥٪ فاصله اطمينان آن مىباشند.

<sup>\*\*</sup>حدود مرزی BMI برابر CAkg/m² برابر WHtR ،۸٠cm برابر ۱/۵ و WHpR برابر ۱/۵ در نظر گرفته شد.



چه در مورد عوامل خطرسازی که شیوع پایینی دارند و چه در مورد عوامل خطرسازی که از شیوع بالایی برخوردارند.

جدول شماره ۳- حساسیت و ویژگی شاخصهای تنسنجی جهت پیشگویی پرفشاری خون و دیس لیپیدمی در زنان ۷۴-۱۸ ساله، مطالعه قند و لیپید تهران

		1.:		0.7	1	×	
شاخصهای تنسنجی <sup>†</sup>			ری خون <sup>*</sup>		ديس ليپ	دمى	
حن: ای	حساسيت	ویژگی	۲/ (حساسیت +ویژگی)	حساسیت	ویژگی	۲/۰(حساسیت+ویژگی)	
۱۸–۳۹ ســـال							
BMI	۸۳	۵۳	۶۸	۶۵	۶۵	۶۵	
WC	٨٩	۵۸	74	٧٣	۶۸	٧١	
WHpR	۶۸	۵۶	87	۵۸	99	87	
WHtR	۸۴	۵٠	۶۷	۶۸	۶.	۶۴	
۴۰–۷۴ ســـال							
BMI	٨۶	77	۵۴	٨۴	78	۵۵	
WC	٩۵	۲۸	87	98	۲۸	87	
WHpR	٩٠	۲.	۵۵	۸Y	77	۵۵	
WHtR	91	١٣	۵۲	97	١٨	۵۵	
کل افـــــراد							
BMI	٨۶	47	49	٧۶	۵۶	99	
WC	91	41	۶۹	۸۳	۵١	۶۷	
WHpR	۸Υ	44	۶۵	٧۶	۵۶	99	
WHtR	٨٩	38	۶۳	٨١	۵١	99	

<sup>\*</sup>پرفشـــاری خـــون بهصورت فشــار خون سیستولیک بزرگتر یا مساوی ۱۴۰mmHg یا فشــار خــون دیاستولیک بزرگتر یا مساوی۹۰mmHg یا مصرف داروی پایین آورنده فشار خون تعریف شد؛ دیـس لیـــپیدمی بهصـورت داشــتن TC≥ ۲۰۰mg/dl یا HDL <۳۵mg/dl یا LDL ≥ ۱۳۰mg/dl تعریف شد.

جدول شماره ۴- سطح زیر منحنی ROC برای شاخصهای تنسنجی جهت تشخیص عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی در زنان ۷۴-۱۸ ساله،

مطالعه قند و لیپید تهران

		سطح زیر منحنی ROC			
	BMI	WC	WHpR	WHtR	
۳۹–۱۸ ســـال					
پرفشاری خون <sup>*</sup>	•/V•(•/۶٩-•/V <b>١</b> ) <sup>‡</sup>	•/٧۴(•/٧٢-•/٧۶)	·/۶۶(·/۶۴-·/۶ <b>\</b> )	·/Y·(·/۶۸-·/Y۱)	
دیابت <sup>×</sup>	·/۶٩(·/۶٧-·/٧١)	•/٧۴(•/٧٢-•/٧۵)	•/Y•(•/۶A-•/Y <b>١</b> )	·/۶۸(·/۶۵-·/Y·)	
ديس ليپيدمي×	•/۶٩(•/۶V-•/V•)	•/YY(•/Y1-•/YF)	·/8۵(·/8٣-·/8V)	·/۶۶(·/۶۲-·/V·)	
حداقل یک عامل خطر ساز <sup>†</sup>	·/۶٩(·/۶٨-·/٧١)	·/Y۵(·/Y۲-·/YA)	٠/۶۵(٠/۶٣-٠/۶٧)	·/۶\(•/۶Y-•/Y•)	
۴۰-۷۴ ســـال					
پرفشاری خون	·/۵٩(·/۵٧-·/۶١)	·/\$\(\cdot\(\frac{\fir}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}}}}{\firac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}{\frac{\f{	٠/۶١(٠/۵٩-٠/۶٣)	•/84(•/84-•/80)	
ديابت	·/\DY(*/\FX-*/\DD)	·/۶٩(·/۶Y-·/Y١)	·/8۵(·/8٣-·/88)	·/۶۱(·/۵۸-·/۶۴)	
ديس ليپيدمي	·/۵٩(·/۵۶-·/۶۲)	·/\$\(\cdot\(\frac{\fir}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}}}}{\firac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}{\frac{\f{	·/۵9(·/۵۶-·/۶۲)	·/۶۲(·/۵۹-·/۶۵)	
حداقل یک عامل خطر ساز	·/۶۱(·/۵A-·/۶۵)	·/V·(·/۶٩-·/YT)	·/۶۴(·/۶۱-·/۶V)	·/۶۵(·/۶۲-·/۶A)	
كـــل افــــــراد					
پرفشاری خون	·/۶۶(·/۶۴-·/۶A)	•/Y٣(•/Y1-•/Y۵)	·/۶٣(·/۶۲-·/۶۵)	·/\$&(•/\$\$-•/V•)	
ديابت	·/۶۴(·/۶۱-·/۶Y)	•/YY(•/Y•-•/Y۵)	·/۶Y(·/۶۵-·/۶A)	·/8۵(·/8٣-·/8Y)	
ديس ليپيدمي	•/8۵(•/8۲-•/8٧)	•/V•(•/۶٩-•/VI)	·/۶۲(·/۶·-·/۶۴)	٠/۶۵(٠/۶٣-٠/۶٧)	
حد اقل یک عامل خطرساز	·/۶۶(·/۶٣-·/۶A)	·/Y٣(·/Y1-·/YΔ)	·/۶۴(·/۶۲-·/۶۵)	·/۶Y(·/۶۶-·/۶۹)	

BMI; Body mass index, WC; Waist circumference, WHpR; Waist -to-hip ratio, WHtR; Waist-to-height ratio

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> حدود مرزی BMI برابر WC ،۲۵kg/m<sup>2</sup> برابر WHtR ،۸۰cm برابر ۱/۵ و WHpR برابر ۱/۸ در نظر گرفته شد.

<sup>×</sup> پرفشاری خون بهصورت فشار خون سیستولیک بزرگتر یا مساوی ۱۴۰mmHg یا فشار خون دیاستولیک بزرگتر یا مساوی ۹۰mmHg یا مصرف داروی پائین آورنده فشار خون تعریف شد، دیابت بصورت قند خون ناشتای بزرگتر یا مساوی ۱۲۶mg/dl یا ۱۲۰۰mg/dl مساوی ۲۰۰ mg/dl یا LDL ≥۱۳۰mg/dl یا LDL ≤۳۵mg/dl یا LDL ≤۳۵mg/dl یا LDL ≤۳۵mg/dl یا LDL ≤۳۵mg/dl یا LDL خسریف شد.

أعوامل خطر ساز عبارتند از: پرفشاری خون، دیابت، دیس لیپیدمی و استعمال دخانیات

جدول شماره ۵- مقایسه شاخصهای تنسنجی جهت پیشگویی « حداقل یک عامل خطرساز» در زنان ۷۴–۱۸ ساله، مطالعه قند و لیپید تهران ّ

P	درصد افراد مبتلا به "حداقل یک عامل خطر ساز" که توسط موارد زیر تشخیص داده شدند				شاخصهای مورد مقایسه	
	فقط شاخص دوم <sup>¶</sup>	$^{ m II}$ فقط شاخص اول	هیچکدام از شاخصها $^{\$}$	هر دو شا <i>خص</i> <sup>‡</sup>	شاخص دوم	شاخص دوم
•/••1	11	۵	١٣	٧١	†WC	†WC
•/64	17	١٣	17	۶۳	†WHpR	†WHpR
٠/٢١	٨	۶	١٣	٧٣	†WHtR	†WHtR
•/••1	۴	٩	۱۵	٧٢	WHpR	WHpR
•/•1	١	۴	۱۵	٨٠	WHtR	WHtR
•/••1	1 •	٣	14	٧٣	WHtR	WHtR

ٔ عوامل خطرساز عبارتند از : پرفشاری خون ، دیابت، دیس لیپیدمی و استعمال دخانیات

### بحث و نتیجه گیری

مطالعه حاضر اولین مطالعهای است که با هدف ارزیابی مقایسهای شاخصهای تنسنجی جهت پیشگویی عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی در زنان ساکن منطقه ۱۳ تهران صورت گرفت. یافتههای این مطالعه دور کمر را به عنوان بهترین شاخص تنسنجی جهت پیشگویی عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی در این جامعه پیشنهاد می کنند. این نکته در سطح زیر منحنی ROC و همچنین در مقایسه دقت پیشگویی شاخصهای تنسنجی نمایان است.

دور کمر به عنوان یک شاخص مناسب برای ارزیابی چربی شکمی، بهویژه برای ارزیابی چربی داخل شکمی (Intra-abdominal fat) که از نظر متابولیکی فعال است، شناخته شده است[۲۵، ۲۵]. تجمع بافت چربی احشایی در ناحیه شکمی با افزایش سطح اسیدهای چرب آزاد همراه است که بنوبه خود منجر به اختلالاتی نظیر هیپرانسولینمی می گردد [۲۵، ۲۶] و این امر می تواند باعث بروز عوامل خطرساز بیماریهای قلبی – عروقی گردد[۳۷].

همسو با یافتههای ما محققین دیگر نیز دور کمر را به عنوان بهترین شاخص تنسنجی جهت غربالگری عوامل خطر بیماریهای قلبی- عروقی در جامعه معرفی کردهاند. Zhu و همکاران [۲۸] در مطالعه برروی ۹۰۱۹ مرد و زن آمریکایی شر کت کننده در NHANES III نشان دادند که دور کمر اطلاعات بیشتری را نسبت به BMI در مورد عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی در اختیار می گذارد. Dobbelsteyn و همکاران [۱۷] نیز در مطالعه برروی مردان و زنان کانادایی نشان دادند که قدرت پیشگویی عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی توسط دور کمر بیشتر از BMI و WHpR می باشد. چنین یافته هایی توسط محققین دیگر نیز گزارش شده است[۱۸، ۳۰-۲۹]. این در حالی است که در برخی جوامع WHtR [۳۱، ۳۱] و در برخی دیگر [۳۴، ۳۳] به عنوان شاخص مناسب برای غربالگری عوامل خطر بیماریهای قلبی- عروقی معرفی شدهاند. تفاوت در محل اندازه گیری دور کمر [۳۵]، اختلافات نژادی بین جوامع [۳۶] و تفاوت در دامنه سنی و BMI افراد مورد مطالعه در مطالعات مختلف [٣٧] مي تواند اختلاف بين مطالعات مختلف را تا حدودی توجیه کند. به علاوه استفاده از حدود مرزی

<sup>\*</sup>اعداد نشان دهنده سطح زير منحني ROC و اعداد داخل پرانتز بيانگر ۹۵٪ فاصله اطمينان آن ميباشند.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> حدود مرزی دور کمر برابر BMI ،۸۰cm برابر WHpR ،۲۵ kg/m<sup>2</sup> برابر ۰/۸ و WHtR برابر ۵/۸ در نظر گرفته شد.

<sup>🗓</sup> اعداد این ستون درصد افرادی را نشان میدهد که به درستی توسط هر دو شاخص تشخیص داده شدند.

<sup>🤻</sup> اعداد این ستون درصد افرادی را نشان میدهد که توسط هیچکدام از شاخصها تشخیص داده نشدند.

ا عداد این ستون درصد افرادی را نشان میدهد که فقط توسط شاخص اول درست تشخیص داده شدند.  $^{
m II}$ 

<sup>¶</sup> اعداد این ستون درصد افرادی را نشان میدهد که فقط توسط شاخص دوم درست تشخیص داده شدند.

مختلف شاخصهای تنسنجی در تحقیقات متعدد و همچنین چگونگی تعریف عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی نیز مى تواند منشأ ايجاد تفاوت دريافتههاى محققين مختلف باشد. دور کمر مزایای متعددی نسبت به سایر شاخصهای تنسنجی دارد. مزیت عمده آن، راحتی استفاده از آن در شرایط بالینی و سهولت در تفسیر آن است. اندازه گیری این شاخص تنها نیاز به یک متر نواری دارد که این امر در مقایسه با اندازه گیری قد و وزن هم از نظر ابزار و هم از نظر فضای لازم به صرفه تر است. همچنین این شاخص در مقایسه با شاخصهای دیگر- که برای بهدست آوردن آنها نیاز به اندازه گیـری دو شاخص و محاسبه نسبت این دو شاخص وجود دارد- کمتر مستعد خطاهای اندازه گیری (Measurement error) و محاسبهای (Measurement error) است. از طرف دیگر استفاده از شاخصهای نسبتی (Ratio indicators) با محدودیتهای آماری [۳۸] و همچنین اشکال در تفسیر بیولوژیکی [۱۹] همراه است. دورکمر همبستگی خوبی با چاقی احشایی دارد [۳۹] و هر گونه تغییر در آن با تغییر در عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی همراه است[۹]. مطالعات پیشین یک ارتباط قوی بین دور کمر بالا با عوامل خطرساز سندرم مقاومت انسولینی [۴۰] و سرطان سینه [۴۱] در زنان را گزارش کردهاند که بیانگر ارزش بالای دور کمر به عنوان شاخصی برای خطر بسیاری از بیماریهای مزمن میباشد.

در ارزیابی یافتههای این مطالعه باید نکات زیر را مدنظر قرار داد. در این مطالعه دور کمر در باریکترین نقطه آن اندازهگیری شده است. این در حالی است که کمیته تخصصی WHO [۴۲] اندازهگیری آن را بین پایینترین دنده و خار ایلیاک توصیه میکند. راهنمای NHANES III [۴۳] استفاده از نقطه بالای ایلیوم راست را پیشنهاد میکند و انجمن مطالعه برروی چاقی آمریکای شمالی (NAASO) و انسیتیو ملی خون, قلب و ریه (NHLBI) خارایلیاک سمت

راست را توصیه می کنند [۴۴]. Pouliot و همکاران [۱۵] نیز معتقدند که دور کمر ناحیه بالای خار ایلیاک پیشگویی کننده بهتری برای چربی احشایی است. فقدان یک اندازهگیری استاندارد برای دورکمر مقایسه مطالعات را دشوار میسازد. اعتقاد براین است که استفاده از باریکترین نقطه کمر از سهولت بالایی برخوردار است و علاوه بر کاربرد بالینی, اجازه اندازه گیری توسط خود فرد را به او می دهد. نکته دیگر آن که مقادیر مطلوب دور کمر وابسته به سن بوده و یک حد مرزی دور کمر نمی تواند مقدار مطلوب برای تمام سنین و عوامل خطرساز مختلف باشد. اما به دلایل کاربردی معمولاً حد مرزی ۸۰cm در زنان بهترین حد مرزی برای استفاده در مطالعات جمعیتی و در شرایط بالینی است[۱۷]. محدودیت عمده این مطالعه استفاده از دادههای مقطعی جهت مقایسه شاخصهای تنسنجی برای پیشگویی عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی است. مطالعات آینده با استفاده از دادههای طولی (Longitudinal) بهتر می توانند در این مورد قضاوت نمایند. باید در نظر داشت که بیماریهای مزمن دارای علل متعددی هستند و به غیر از شاخصهای تنسنجی عوامل دیگری چون وراثت و وضعیت یائسگی نیز در آن نقش دارند. بهعلاوه بسیاری از عوامل خطرساز خود با هم مرتبط هستند و ارتباط بین شاخصهای تنسنجی و عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی را مخدوش میکنند. در مقابل از نكات قوت اين مطالعه مي توان به استفاده از يك نمونه با حجم بالا از زنان ساکن منطقه ۱۳ تهران اشاره کرد که این امر باعث افزایش روایی یافتههای ما می گردد.

با در نظر گرفتن محدودیتهای این مطالعه، نتیجه گیری می شود در زنان ساکن منطقه ۱۳ تهران، دور کمر شاخص بهتری برای غربالگری عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی است. این امر لزوم گنجاندن ارزیابی آن را در معاینات روزمره بالینی آشکار میسازد.

منابع



1-Mokdad AH, Serdula MK, Dietz WH. The continuing epidemic of obesity in the United States. Journal of American Medical Association

2000; 284: 1650-1

**2-**Kuczmarski RJ, Flegal KM, Campbell SM. Increasing prevalence of overweight among U.S. adults. Journal of American Medical Association 1994; 272: 205-11

- **3-**De-Onis M, Blossner M. Prevalence and trends of overweight among preschool children in developing countries. American Journal of Clinical Nutrition 2000; 72: 1032-9
- 4-World Health Organization. Obesity epidemic puts millions at risk from related diseases. Press Release WHO/46 (online), June 12 1997; www.who.int/inf-prp 1997/en/pr97-46.html
- **5-** Pishdad GR. Overweight and obesity in adults aged 20-74 in southern Iran. Internal Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders 1996; 20: 963-5

عزیزی فریدون، اسماعیلزاده احمد، میرمیران پروین.
 ارتباط چاقی با عوامل خطرساز بیماریهای قلبی - عروقی: یک مطالعه اپیدمیولوژیک در تهران، مجله غدد درونریز و متابولیسم ایران، ۱۳۸۲، ۴، ۳۷۹-۳۷۹

- 7- World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation on obesity, 3-5 June 1997, WHO/NUT/NCD/98.1. WHO;Geneva; 1997
- **8-** Stevens J, Cai J, Pamuk ER, Williamson DF, Thun MJ, Wood JL. The effect of age on the association between body mass index and mortality. New England Journal of Medicine 1998; 338: 1-7
- 9- Wei M, Gaskill SP, Haffner SM, Stern MP. Waist circumference as the best predictor of non-insulin dependent diabetes mellitus compared to BMI, WHR over other anthropometric measurements in Mexican Americans: a 7-year prospective study. Obesity Research 1997; 5: 16-23
- **10-** Folsom AR, Kaye SA, Sellers TA, et al. Body fat distribution and 5-year risk of death in old women. Journal of American Medical Association 1993; 269: 483-7
- 11- Pi-Sunyer FX. Obesity: criteria and classification. Proceedings of Nutrition Society 2000; 59: 505-9

12-Seidell J, Han T, Feskens E, Lean M. Narrow hips and broad waist circumferences independently contribute to increased risk of non-insulin dependent diabetes mellitus. Journal of Internal Medicine 1997; 242: 401-6

**13-**Beegom R, Beegom R, Niaz MA, Singh RB. Diet, central obesity and prevalence of hypertension in urban population of south India. International Journal of Cardiology 1995; 51: 183-91

**14-** Dipietro L, Katz LD, Nadel ER. Excess abdominal adiposity remains correlated with altered lipid concentrations in healthy older women. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders 1999; 23: 432-6

**15-** Pouliot MC, Despres JP, Lemieux S, Moorjani S, Bouchard C, Tremblay A. Waist circumference and abdominal sagittal diameter: best simple anthropometric indexes of abdominal visceral adipose tissue accumulation and related cardiovascular risk in men and women. American Journal of Cardiology 1994; 73: 460-8

16- Ledoux M, Lambert J, Reeder BA, Despres JP. A comparative analysis of weight to height and waist to hip circumference indices an indicators of the presence of cardiovascular disease risk factors. Canadian Heart Health Surveys Research Group. Canadian Medical Association Journal 1997; 157: S 32-8

17-Dobbelsteyn CJ, Joffres MR, Mac Lean DR, Flowerdew G. A comparative evaluation of waist circumference, waist-to-hip ratio and body mass index as indicators of cardiovascular risk factors: The Canadian Heart Health Surveys. International Journal of Obesity 2001; 25: 652-61

**18-**Seidell JC, Cigolini M, Charzewska J, Ellsingen BM, di-Biase G. Fat distribution in European women: a comparison of anthropometric measurements in relation to cardiovascular risk factors. International Journal of Epidemiology 1990; 19: 303-8

19-Molarius A, Seidell JC. Selection of anthropometric indicators for classification of abdominal fatness-a critical review. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders 1998; 22: 719-27

**20**-Gallagher D, Visser M, Sepulueda D, Pierson RN, Harris T, Heymsfield SB. How useful is body mass index for comparison of body fatness across



- age, sex and ethnic groups. American Journal of Epidemiology 1996; 143: 228-39
- **21-**Azizi F, Rahmani M, Emami H, Majid M. Tehran Lipid and Glucose Study: rationale and design. CVD Prevention 2000; 3: 242-7
- 22-The sixth report of the Joint National Committee on prevention, detection, evaluation and treatment of high blood pressure. Archives of Internal Medicine 1997; 157: 2413-46
- 23-Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1997; 20: 1183-87
- 24-Summary of the second report of the National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Journal of American Medical Association 1993; 269: 3015-23
- **25**-Ross R, Shaw KD, Martel Y, de Guise J, Avruch L. Adipose tissue distribution measured by magnetic resonance imaging in obese women. American Journal of Clinical Nutrition 1993; 67: 470-5
- **26-**Larsson B, Svardsudd K, Welin L, Wilhelmsen L, Bjorntorp P, Tibblin G. Abdominal adipose tissue distribution, obesity and risk of cardiovascular disease and death: 13 year follow up of participants in the study of men born in 1913. British Medical Journal 1984; 288:1401-4
- 27-Schmidt MI, Watson RL, Duncan BB, Metcalf P, Brancati FL, Sharrett AR. Clustering of dyslipidemia, hyperuricemia, diabetes and hypertension and its association with fasting insulin and central and overall obesity in a general population- Atherosclerosis Risk in Communities Study Investigators. Metabolism 1996; 45:699-706
- **28-**Zhu S, Wang Z, Heshka S, Heo M, Faith MS, Heymsfield SB. Waist circumference and obesity-associated risk factors among whites in the third National Health and Nutrition Examination Survey: clinical action thresholds. American Journal of Clinical Nutrition 2002; 76:743-9
- **29-**Pelt REV, Evans EM, Schechtman KB, Ehsani AA, Kohrt WM.Waist circumference vs body mass index for prediction of disease risk in postmenopausal women. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders 2001; 25:1183-8

- **30-** Foucan L, Hanley J, Deloumeaux J, Suissa S. Body mass index and waist circumference as screening tools for cardiovascular risk factors in Guadeloupean women. Journal of Clinical Epidemiology 2002; 55: 990-6
- **31-**Lin WY, Lee LT, Chen CY, Lo H, Hsia HH, Liu IL. Optimal cut-off values for obesity: using simple anthropometric indices to predict cardiovascular risk factors in Taiwan. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders 2002; 26:1232-8
- **32-** Hsieh SD, Yoshinaga H. Waist/height ratio as a simple and useful predictor of coronary heart disease risk factors in women. Journal of Internal Medicine 1995; 34:1147-52
- **33-**Ito H, Nakasuga K, Ohshima A, Maruyama T, Kaji Y, Harada M. Detection of cardiovascular risk factors by indices of obesity obtained from anthropometry and dual-energy X-ray absorptiometry in Japanese individuals. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders 2003; 27:232-7
- **34-**Kortelainen ML, Sarkioja T. Coronary atherosclerosis and myocardial hypertrophy in relation to body fat distribution in healthy women: an autopsy study on 33 violent deaths. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders 1997; 21: 43-9
- **35**-Shetterly SM, Marshall JA, Baxter J, Hamman RF. Waist-hip ratio measurement location influences associations with measures of glucose and lipid metabolism. The San Luis Valley Diabetes Study. Annals of Epidemiology 1993; 3: 295-9
- **36-**Lear SA, Chen MM, Frohlich JJ, Birmingham CL. The relationship between waist circumference and metabolic risk factors: cohorts of European and Chinese descent. Metabolism 2002; 51:1427-32
- **37-**Daniel M, Marion SA, Sheps SB, Hertzman C, Gamble D. Variation by body mass index and age in waist-to-hip ratio associations with glycemic status in an aboriginal population at risk for type 2 diabetes in British Columbia, Canada. American Journal of Clinical Nutrition 1999; 69: 455-60
- **38-**Allison DB, Paultre F, Goran MI, Poelman ET, Heymsfield SB. Statistical considerations regarding the use of ratios to adjust data. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders 1995; 19:644-52



- **39-**Derpres JP. The insulin resistance- dyslipidemic syndrome of visceral obesity: effect on patients' risk. Obesity Research 1998; 6: 85-175
- **40**-Edwards KL, Austin MA, Newman B, Mayer E, Krauss RM, Selby JV. Multivariate analysis of the insulin resistance syndrome in women. Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology1994; 14:1940-5
- **41-**Den Tonkelaar I, Seidell JC, Collette HJA. Body fat distribution in relation to breast cancer in women participating in the DOM-project. Breast Cancer Research Treatment 1995; 34: 55-61
- **42-**World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic-report of a WHO consultation on obesity. WHO: Geneva, 1997
- 43-Chumlea NC, Kuczmarski RJ. Using a bony landmark to measure waist circumference. Journal of American Dietetic Association 1995; 95:12-18 44-National Institute of Health/National Heart, Lung and Blood Institute. Clinical guidelines on the identification, evaluation and treatment of overweight and obesity in adults: the evidence report. Obesity Research 1998; 6: 51-20