ارزیابی مردم شهر تهران از وضعیت سلامتی خود برحسب جنسیت، تحصیلات و منطقه مسکونی: یک مطالعه جمعیتی

دكتر آزيتا گشتاسبي: * استاديار پژوهش، گروه بهداشت خانواده، پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي دکتر علی منتظری: دانشیار پژوهش، گروه پزشکی اجتماعی، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی مریم سادات وحدانی نیا: کارشناس، گروه بهداشت خانواده، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی دکتر عباس رحیمی فروشانی: استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران دكتر كاظم محمد: استاد، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران

فصلنامه پایش سال دوم شماره سوم تابستان ۱۳۸۲ صص ۱۸۹–۱۸۳ تاریخ پذیرش مقاله:۱۳۸۲/۲/۲

چکیده

نابرابـری بهداشـتی همـواره در بهداشـت عمومـی مقولهای مطرح و مورد توجه بوده و در این زمینه تاکنون مطالعات متعددی انجـام شـده اسـت. براساس نتایج مطالعات عوامل اقتصادی- اجتماعی از مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابریهای بهداشتی در جوامع هـستند. مطالعـه حاضر بر آن است تا به بررسی ارتباط بین جنس، تحصیلات و منطقه محل سکونت با میزان سلامت در جمعیت بالاتـر از ۱۵ سـال شهر تهران بپردازد. مطالعه از نوع مقطعی بوده و نمونه حاضر که شامل ۴۱۶۳ نفر از افراد بالای ۱۵ سال ساکن مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بود به روش خوشهای تصادفی چند مرحلهای انتخاب شده است. میزان سلامت با استفاده از پرسشنامه استاندارد (Short Form 36(SF-36 و سایر اطلاعات مربوط به مشخصات جمعیتی در مصاحبه حضوری افراد سنین بالاتر از ۱۵ سال جمع آوری شد.

میانگین سنی نمونه مورد مطالعه ۵/۱ (SD=۱۶) و میانگین سالهای تحصیل رسمی ۱۰ (SD=۴/۵) بهدست آمد. بر اساس نـتایج مطالعـه بانـوان بـهطـور کلـی سطح سلامت خود را نسبت به مردان به میزان پایینتری برآورد کردند (P<٠/٠٠١). ۴-۶-(χ²=۶۰، P<-/٠٠٠). همچنین بین سطح تحصیلات و منطقه محل سکونت در برآورد از سطح سلامتی نمونه مورد مطالعه ارتباط معنی داری به دست آمد ($P<\cdot/\cdot\cdot$ ۱). به این مفهوم که افراد در سطوح بالاتر تحصیلی نسبت به سطوح پایین تر تحصیلی سطح بالاتری از سلامتی راگزارش کردهاند. سکونت در مناطق مختلف جغرافیایی شهر تهران نیز بر ارزیابی افراد از سطح سلامتشان اثر گذار بوده است

بـهطـور کلـی یافـتههای مطالعه حاضر نشان دهنده آن است که ارزیابی سطح سلامتی در جمعیت به میزان زیادی تحت تأثیر عوامل جمعیتی و اقتصادی- اجتماعی قرار می گیرد.

كليدواژهها: سطح سلامتي، بهداشت عمومي، مطالعه جمعيتي، ايران

تلفن: ۶۴۸۰۸۰۴، ۸-۶۴۸۰۸۰۴

E-mail: agoshtasebi@ihsr.ac.ir

تويسنده اصلى: تهران، خيابان انقلاب اسلامي، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد وحيد نظري، پلاک ۵۱ نمابر: ۶۴۸۰۸۰۵

مقدمه

نابرابری بهداشتی واژهای شناخته شده در بهداشت عمومی است. علی رغم ارتقای سطح سلامت و بهبود کلی شاخصهای بهداشتی - درمانی جامعه و حتی کوچکتر شدن اندازه گروههای محروم، نابرابری بهداشتی در طی دهههای گذشته در سطوح ملی و بین المللی افزایش یافته است [۳-۱].

مطالعات نابرابری بهداشتی همگی نشان دهنده تأثیر موقعیت اقتصادی- اجتماعی بر روی سلامتی هستند[۷-۴]. این ارتباط در همه جوامع حتی غنی ترین آنها و همه طبقات اجتماعی مشاهده می شود [۸].

گروههای محروم از نظر اقتصادی- اجتماعی به صورت واضح میزانهای مرگ و میر بیشتری دارند، به احتمال بیشتر دارای رفتارهای پر خطر هستند و سلامت روانی و تعامل اجتماعی کمتری را نیز تجربه می کنند[۳، ۴، ۵ و ۱۹]. افزون بر این تعلق به یک طبقه اجتماعی خاص در استفاده از خدمات بهداشتی- درمانی مؤثر است. مردم با تحصیلات بیشتر شانس بیشتری برای مشاوره با متخصص، دندانپزشک یا فیزیوتراپیست دارند و احتمالاً بیشتر در بیمارستان بستری می شوند[۱۲-۱۰]. محل سکونت افراد نیز بر تفاوتهای مشاهده شده در سلامت آنها مؤثر است[۱۵-۱۳].

اندازه نابرابری بهداشتی برای مردان، نسبتاً بزرگ و برای زنان کوچکتر است[۱۴-۱۳]. همچنین اندازه نابرابری در کشورهای مختلف فرق می کند، اما حتی کشورهای با رفاه دموکراتیک مانند کشورهای اسکاندیناوی هم نتوانستهاند آن را از بین ببرند[۱۷ و ۱۸].

بهرغه اثبات ارتباط سلامتی و بیولوژی با عوامل اقتصادی – اجتماعی، مکانیزم این ارتباط بهخوبی روشن نیست $[\Lambda, \, \rho, \, \rho]$ و نظریات مختلفی نیز در این مورد ارایه شده است $[\Psi, \, \rho]$.

با دقت در سطور فوق به خوبی روشن است که مطالعات نابرابری بهداشتی تا به حال روی اندازه های ابتلا و مرگ و میر تمرکز داشته اند[۲۴–۲۲]، اما مطالعات جدید شاخصهای دیگری نظیر امید به زندگی و ارزیابی افراد از سلامتی خود را ملاک بررسی نابرابری بهداشتی قرار داده اند[۵، ۱۱، ۱۶، ۲۳ و ۲۵].

پرسشنامههای وضعیت سلامتی (Health Status) که نظر فرد را در مورد سلامتی خود می سنجند و به طور گسترده ای در کارآزمایی های بالینی و پایش سلامتی به کار می روند [۲۸-۲۶] نیز در این زمینه استفاده شده اند [۱۳، ۲۹ و ۳۰].

تحقیق حاضر با هدف بررسی نابرابری بهداشتی در شهر تهران انجام شده است و شاید اولین مطالعه در این زمینه در ایران باشد.

مواد و *ر*وش کا*ر*

ایس مطالعه یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بوده و به روش مقطعی انجام شد. داده های مقاله حاضر بخش کوچکی از اطلاعات یک مطالعه بزرگ بررسی کیفیت زندگی در جمعیت عمومی شهر تهران است و با هدف بررسی ارتباط میان طبقه اجتماعی و سلامتی افراد انجام شده است. یک نمونه تصادفی ۱۹۳۹ نفری از افراد سالم بالای ۱۵ سال ساکن مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از طریق نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شده و داده های آنها از طریق یک پرسشنامه خودساخته برای متغیرهای مستقل به روش مصاحبه حضوری جمع آوری گردید. طبقه اجتماعی افراد نیز بهوسیله میزان تحصیلات و منطقه محل سکونت بررسی شد.

وضعیت سلامتی با استفاده از پرسش اول پرسشنامه وضعیت سلامتی با استفاده از پرسش اول پرسشنامه (Short form 36 item-SF-36) که به صورت یک سؤال نظر مصاحبه شونده را در مورد سلامتی وی میپرسد و دارای ۵ گزینه از عالی تا بد است اندازه گیری شد.

همچنین متغیر تحصیلات توسط یک سؤال خام به صورت تعداد سالهای تحصیلی بررسی و در سه گروه: ۱- بیسواد و ابتدایی (۵-۰ سال تحصیلی)، ۲- سواد متوسطه (۱۲-۶ سال تحصیلی) و ۳- تحصیلات عالی (بیشتر از ۱۲سال تحصیلی) طبقه بندی شد. متغیر محل سکونت فرد نیز در یکی از مناطق طبقه بندی شد. متغیر محل سکونت فرد نیز در یکی از مناطق از نظر ۲۲ گانه شهرداری تهران تعیین شد و این مناطق از نظر نزدیکی جغرافیایی و شباهت فرهنگی و نیز برای سهولت در مقایسه یافته ها در چهار گروه: شمال، مناطق: ۱تا۳، غرب، مناطق: ۵، ۶، ۹، ۱۱،۱۰، ۲ و ۲۲، شرق، مناطق: ۴، ۸، ۱۳ و مناطق: ۵ و جنوب، مناطق: ۱۵ تا ۲۰ تقسیم شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه نرم افزاری SPSS استفاده گردید.



يافتهها

جدول شماره ۱ مشخصات جمعیتی نمونه مورد مطالعه را نشان می دهد. ۵۲ درصد مصاحبه شوندگان زن و اکثریت آنها ΔA درصد) متأهل بودند. میانگین سن مصاحبه شوندگان ΔA سال (ΔB) و ۷۵ درصد آنها ۴۶ ساله و کمتر بودند.

میانگین سالهای تحصیلات برای جمعیت مطالعه شده نیز ۱۰ سال ($SD = f/\Delta$) بود و تقریباً ۲۵ درصد افراد تحصیلات دانشگاهی داشتند. ضمن آن که میانگین سالهای تحصیل در زنان کمتر از مردان بود (P<-1).

جدول شماره ۱- مشخصات جمعیتی نمونه مورد مطالعه (n=۴۱۶۳)

	تعداد	درصد
گروه سنی (سال)		
12-74	147.	44
7D-44	1814	٣٩
40-84	٨٨٢	۲۱
بالاتر از ۶۵	747	۶
وضعيت اشتغال		
بی کار	4.1	1.
خانه دار	1770	٣٠
محصل - دانشجو	۸۰۱	١٩
شاغل	1417	٣۵
بازنشسته	747	۶
وضعيت تأهل		
مجرد	18.1	41
متاهل	74.0	۵۸
مطلقه	۱۵۷	۴
تحصيلات (سال)		
•-۵	٧۵۵	١٨
8-17	7090	87
<17	AIT	۲٠
منطقه محل سكونت		
شمال	१९१	١٧
جنوب	1779	٣٣
شرق	1.91	78
غرب	997	74
وضعيت سلامتي		
عالى	۶۰۳	14
بسيار خوب	۸۴۷	۲٠
خوب	14.0	74
متوسط	1119	77
بد	١٨٩	۵

اکثریت افراد مطالعه شده سلامتی خود را خوب گزارش کردهاند (۳۳/۷ درصد) در حالی که زنان در کل سلامتی خود را بدتر از مردان گزارش نمودهاند(P<0/001) (جدول شماره ۲).

با افزایش سطح تحصیلات تعداد افرادی که سلامتی خود را عالی و خوب گزارش کردهاند بیشتر و تعداد افرادی که سلامتی خود را متوسط گزارش کردهاند کمتر شده است.

جدول شماره ۴ وضعیت سلامتی افراد را بر حسب منطقه محل سکونت نشان می دهد. زندگی در مناطق مختلف شهر تهران در ارزیابی افراد از سلامتی شان مؤثر بود (P<-(-1)). اگر چه این ارتباط خطی نبود اما اختلاف بین گروه ها از نظر آماری معنی دار بود. همچنین هر چه از شمال به سمت مناطق جنوبی می رویم تعداد افرادی که سلامتی خود را بد و یا عالی گزارش کر ده اند بیشتر شده است.

جدول شماره ۲- فراوانی افراد مطالعه شده بر حسب وضعیت سلامتی و به تفکیک جنس (n=۴۱۶۳)

	زن (۶۶	(n=٢)	مرد (n=۱۹۹۷)			
	تعداد	درصد	تعداد	درصد		
عالى	707	11	۳۵۰	17		
بسيار خوب	794	١٨	۴۵۳	77		
خوب	٧۵٠	۳۵	۶۵۵	44		
متوسط	888	٣١	408	۲۳		
بد	1.8	۵	۸۳	۴		

جدول شماره ۳- فراوانی افراد مطالعه شده بر حسب وضعیت سلامتی و به تفکیک میزان تحصیلات (n=۴۱۶۳)

>17	۱۲–۶ سال	۵- سال		
تعداد درصد	تعداد درصد	درصد	تعداد	_
۱۵ ۱۱۹	17 44.	۶	44	عالى
77 777	۲۲ ۵۷۵	۶	40	بسيار خوب
XP7 Y9A	۲۳ ۸۶۱	٣٢	745	خوب
۱۸ ۱۵۱	70 844	۴۳	474	متوسط
۲	٣ ٧۶	١٣	988	بد

جدول شماره ۴- فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب وضعیت سلامتی به تفکیک منطقه محل سکونت (n=۴۱۶۳)

	شمال		جنوب		شرق		غرب	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
عالى	٨٣	17	749	١٨	179	17	147	14
بسيار خوب	149	۲۱	٣٠٩	77	۲۰۳	١٩	۱۸۶	۱۹
خوب	74.	74	418	٣.	۳۸۶	۳۵	٣۶٣	38
متوسط	۲۰۶	٣٠	٣٣٣	74	٣٢٠	79	78.	78
بد	١٨	٣	٧٢	۵	۵۳	۵	48	۵

بحث و نتیجهگیری

نتایج این مطالعه نشان می دهد که در مجموع، اکثریت افراد (۳۳/۷ درصد) سلامتی خود را در حد خوب ارزیابی کردهاند. در حالی که از گروه مورد مطالعه تنها ۱۴/۵ درصد سلامتی خود را عالی گزارش نمودهاند که بیشتر آنها در گروههای سنی جوان قرار دارند و بدیهی است که با افزایش سن علاوه بر مشکلات جسمی ناشی از سن، فشار های روانی - اجتماعی و اقتصادی هم تأثیر سوء خود را بر سلامتی بروز می دهند.

این مطالعه از دو ملاک تحصیلات و منطقه محل سکونت بهعنوان شاخصهای وضعیت اقتصادی- اجتماعی استفاده کرده است. هر چه سطح تحصیلات بالاتر می رود ارزیابی افراد از سلامتی خود بهتر می شود و این با یافتههای سایر مطالعات کاملاً منطبق است[۱۰-۸، ۱۱ و ۱۲]. یعنی سطوح پایین اقتصادی- اجتماعی با وضعیت پایین تر سلامتی مرتبط است. اگر چه هیچ آستانهای برای حفظ فرد از مشکلات مربوط به سلامتی وجود ندارد، اما ارتباط بین سلامتی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی یک ارتباط خطی است. همچنین نابرابری مشاهده شده در سطح سلامتی برای مردان (بر حسب طبقات مشاهده شده در سطح سلامتی برای مردان (بر حسب طبقات اقتصادی- اجتماعی) بزرگتر از زنان است علی رغم این که اقتصادی- اجتماعی) بزرگتر از زنان است علی رغم این که وضعیت سلامتی زنان بدتر از مردان است.

از طرفی مقایسه وضعیت سلامتی در مناطق مختلف تهران یک ارتباط خطی را نشان نمی دهد. متأسفانه هیچ گزارشی در مورد میزان های ابتلا و مرگ و میر در سازمان های وابسته به نظام بهداشتی کشور به دست نیامد تا امکان مقایسه با داده های

مطالعه حاضر فراهم شود و مشخص گردد که آیا گزارش افراد از سلامتی خود با میزانهای ابتلا و مرگ و میر نیز تطابق دارد یا خیر؟

اکثریت افراد در همه مناطق و در هر دو جنس سلامتی خود را در حد خوب گزارش کردهاند و متغیر از عالی به بعد یک روند خطی را در مناطق مختلف تهران نداشت. برخلاف انتظار ساکنین مناطق جنوبی شهر تهران که از پرجمعیت ترین و فقیرترین مناطق شهر هستند، احساس سلامتی بهتری را نسبت به ساکنین سایر مناطق گزارش کردند. علت این مشاهده می تواند به عوامل دیگر مؤثر بر سلامتی مانند ساختار خانواده و تأثیر زندگی خانوادگی [۳۱] و نیز عوامل روانی و اجتماعی در ارزیابی افراد از سلامتی خود مربوط باشد [۴ و ۲۱].

نکته دیگری که در یافتههای این مطالعه مشاهده می شود پایین تر بودن سطح سلامت زنان نسبت به مردان است و این یافته در سطوح مختلف تحصیلات و مناطق مختلف سکونت افراد همچنان پابرجاست، اگر چه اندازه نابرابری بهداشتی برای مردان بزرگتر از زنان است. یعنی تفاوت بین طبقات مختلف اجتماعی از نظر وضعیت سلامتی برای مردان بیشتر از زنان است. شاید به این دلیل که طبقه اقتصادی - اجتماعی زنان فقط بهوسیله عوامل شخصی آنها مثل تحصیلات یا شغل مشخص نمی شود و تحت تأثیر عوامل مربوط به همسر یا خانواده وی نیز قرار می گیرد[۱۱]. اما این که چرا زنان در کل سلامتی خود را بدتر از مردان گزارش کردهاند بیانگر وجود نابرابری بهداشتی بدتر از مردان گزارش کردهاند بیانگر وجود نابرابری بهداشتی

استفاده کرده است که یک شاخص جدید در ادبیات نابرابری بهداشتی محسوب می شود. اما برای کاربرد وسیعتر آن در مطالعات آتی شاید ضروری باشد نحوه استفاده از محل سکونت (مثلاً تقسیم بندی محل سکونت افراد، سطح زیر بنای مسکن و (۰۰۰) بهعنوان شاخص نابرابری بهداشتی تغییر کند. در این مطالعه از متغیر شغل بهعنوان یک شاخص وضعیت اقتصادی-اجتماعی استفاده نشد، چرا که هیچ اطلاعاتی که بتواند بهدرستی و بهطور علمی مشاغل موجود را رتبه بندی کند در دسترس نبود و لذا همکاری صاحبنظران علوم اجتماعی و بهداشتی برای تدوین چنین شاخصهایی توصیه می شود.

در انتها نگارندگان امیدوارند تحقیقاتی از این دست بتواند سیاستگذاران و متولیان امر سلامت را بر اهمیت محرومیت مادی و اجتماعی و تأثیر آن بر سلامت واقف سازد و راهبردهای ملی برای ارتقای سلامت با عنایت به این امر تدوین شوند.

از طرف دیگر نتایج مطالعه حاضر مؤید مطالعات سایر نقاط دنیاست[۱۲ و ۲۷]. یعنی زندگی در طبقات مختلف اقتصادی- اجتماعی بر روی سلامتی افراد موثر است. از آنجا که رسالت اصلی بهداشت و درمان بهبود سلامتی در همه جمعیت است و بهبود سلامتی گروههای محروم حداقل از نظر تئوریک می تواند منافع بهداشتی بزرگی را برای جامعه و دولت بیافریند، بنابراین توجه به سلامت این گروهها، ساخت شاخصهای مناسب برای بررسی وضعیت سلامت در طبقات مختلف اجتماعی و تغییرات آن در طی زمان و نیز توجه به سایر عواملی که بهطور مستقیم روی سلامتی گروههای محروم جامعه اثر یا غیر مستقیم روی سلامتی گروههای محروم جامعه اثر می گذارند را می توان نیازهای رو به رشد بخش سلامت دانست و تمرکز روی کاهش نابرابری در سلامت بهوسیله بهینه سازی شاخصهای زیر بنایی سلامت توصیه می شود. این مطالعه برای ولین بار در ایران از محل سکونت افراد به عنوان ملاک طبقه برای بیندی اقتصادی- اجتماعی برای بررسی نابرابری در سلامت

منابع

- 1- Cardano M, Costa G, Demaria M, Merler E, Biggeri A. Inequalities in mortality in the Italian longitudinal studies. Epidemiology & Prevention 1999; 23:141-152
- **2-** Anitun C, Esnaola S. Changes in social inequalities in health in the Basque country. Journal of Epidemiology & Community Health 2000; 54: 437-43
- **3-** Fein O. The influence of social class on health status: American and British research on health inequalities. Journal of General Internal Medicine 1995; 10: 577-586
- **4-** Geyor S, Peter R. Income, occupational, qualification and health inequalities: competing risks? (comparing indicators of social health). Journal of Epidemiology and Public Health 2000; 54: 299-305
- 5- Marmot M. Social determinants of health: from observation to policy. Medical Journal of Australia 2000; 172: 379-382
- **6-** Eachus J, Chan P, Pearson N, Propper C, Davey SG. An additional dimension to health inequalities: disease severity and socioeconomic position.

- Journal of Epidemiology and Community Health 1999; 53: 603-11
- 7- Power C, Mattew S. Origins of health inequalities in national population sample. Lancet 1997; 350: 1584-1589
- **8-** Charton BG, White M. Living on the margin: a salutogenic model for socioeconomic differentials in health. Public Health 1995; 109: 235-43
- 9- Turreu G, Mathers S. Socioeconomic status and health in Australia. Medical Journal of Australia 2000; 172:434-438
- **10-** Alberts JF, Sanderman R, Eimers JM, van den heuvel WJ. Socioeconomic inequality in health care: a study of services utilization in curacao. Social Sciences and Medicine 1997; 45: 213-220
- 11- Rahkonen O, Arber S, Labelma E. Health inequalities in early adulthood: a comparison of young men and women in Britain and Finland. Social Sciences and Medicine 1995; 41: 163-171
- 12- Lahelma E, Manderbacka K, Rahkonen O, Karisto A. Comparisons of inequalities in health: evidence from national surveys in Finland, Norwey and Sweden. Social Sciences and Medicine 1994; 38: 517-527



- 13- Bowling A, Bond M, Jenkinson C, Lamping OL. Short from 36 (SF-36) Health Survey Questionnaire: which normative data should be used? Comparisons between the norms provided by the omnibus survey in Britain, the health survey for England and the Oxford healthy life survey. Journal of Public Health Medicine 1999; 21: 255-270
- **14-** Cattell V. Poor people, Poor places and poor health: the mediating role of social networks and social capital. Social Sciences and Medicine 2001; 52: 1501-1516
- **15-** Caughy MO, O,campo PJ, Paterson J. A brief observational measure for orban neighborhood. Health and place 2001; 7: 225-36
- **16-** Matthews S, Manor O, Power C. Social inequalities in health. are there gender differences? Social Sciences and Medicine 1999; 48: 49-60
- 17- Cavelaars AE, Kunst AE, Geurts JJ, et al. Differences in self reported Morbidity by educational level: A comparison of 11 western European countries. Journal of Epidemilogy and Public Health 1998; 52: 219-227
- **18-** Dahl E, Brikelund GE. Health inequalities in later life in a social demographic welfare state. Social Sciences and Medicine 1997; 44: 871-881
- **19-** Bronner E. Stress and the biology of inequality. British Medical Journal 1997; 314: 1472-76
- **20-** Dixon JM, Douglas RM, Eckersley RM. Making a difference to socioeconomic determinants of health in Australia: a research and development strategy. Medical Journal of Australia 2000; 172: 541-44
- 21- Lynch JW, Koplan GA, Salonen JT. Why do poor people behave poorly? Variation in adult health behaviors and psychosocial characteristics by stages of the socioeconomic life course. Social Sciences and Medicine 1997; 44: 809-819
- 22- Mackenbach JP. Socioeconomic health differences in the Netherlands: a review of recent

- epirical finding. Social Sciences and Medicine 1992; 34: 213-26
- 23- Sihvonen AP, Kunst AE, Laholma E, Valkonen T, Mackenbach JP. Socioeconomic inequalities in health expectancy in Finland and Norway in the late 1980 s. Social Sciences and Medicine 1998; 47: 303-313
- **24-** Judge K, Benzeval M. Health inequalities: new concerns about the children of single mothers. British Medical Journal 1993; 306: 677-80
- **25-** Power C, Matthew S, Manor O. Inequalities in self rated health in the 1958 birth cohort life time social circumstances or social morbidity? British Medical Journal 1996; 313: 449-53
- **26-** Ziebland S. The Short form 36 Health state questionnaire: clues from the oxford regions normative data about its usefulness in measuring health gain in population surveys. Journal of Epidemiology and Community Health 1995; 49: 102-105
- 27- Read PJ, Moore DD. SF 36 as a prediction of health status. Value in Health 2000; 3: 202-207
- **28-** Li l, Wang HM, Shen Y. Chinese SF 36 Health survey: Translation, cultural adaptation, validation and normalization. Journal of Epidemilogy and Community Health 2003; 57: 259-263
- **29-** Thumboo J, Fong KY, Machin D, Chan SP, Soh CH, Leong KH, et al. Quality of life in an urban Asian population: the impact of ethnicity and socioeconomic status. Social Sciences and Medicine 2003; 56: 1761-1772
- **30-** Brazier J, Roberts J, Devevill M. The estimation of a preferenc based measure of health from the SF36. Journal of Health Economics 2002; 21: 271-292
- **31-** Sweeting H, West P. Family life and health in adolescence: a role for culture in the health inequalities debate. Social Sciences & Medicine 1995; 40: 163-75